

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان استرس شغلی پرستاری شاغل در مراکز توانبخشی شهرستانهای ری، تهران و شهرستانات در سال ۱۳۸۲

* شادی رضایی (کارشناس ارشد)، دکتر محمدعلی حسینی**، دکتر مسعود فلاحتی خشکناب**

* مدیریت پرستاری، مرکز آموزشی و درمانی چشمپزشکی فارابی

** عضو هیئت علمی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

زمینه و هدف: استرس شغلی امروزه به مستلزمات شایع و پرهزینه در محیط‌های کاری تبدیل شده است. بطوریکه اغلب پژوهش‌های ۳۰ دهه اخیر به این مستلزم اختصاص یافته‌اند. گزارشات مختلف حاکی از آنست که شغل‌هایی مانند پرستاری که از حواسه‌های روانی بالا و دامنه تصمیم‌گیری کم برخوردارند، استرس شغلی بالانی دارند. این پدیده می‌تواند برای پرستاران اثرات محرّب فیزیولوژیکی و روانشناختی داشته و بر سلامتی آنان اثرات سو بگذارد از سوی دیگر استرس شغلی با افزایش حوادث کاری تاخیر و غیبت از کار و نیز کاهش بهره‌وری سازمانی به افت کیفیت مراقبت از بیماران منجر می‌گردد. مطالعات متعددی مهارت‌های ارتباطی را نوعی مهارت‌های تعابقی بر شمرده اند که میتواند استرس شغلی را تعدیل کند. تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان استرس شغلی پرستل پرستاری شاغل در مراکز توانبخشی شهرستانهای ری، تهران و شهرستانات در سال ۱۳۸۲ انجام گرفت.

روش پژوهشی: این تحقیق به روش نیمه تجربی انجام شد. آزمودنی‌های پژوهش ۴۸ نفر (۲۱ نفر گروه آزمون، ۲۷ نفر گروه کنترل) بودند. نظیم کردن نمونه‌ها در دو گروه کنترل و آزمون بطور تصادفی انجام شد. هر دو گروه فرم اطلاعات دموگرافیک، پرستنامه محترمای شغلی کارآزاد و سنجش مهارتهای ارتباطی را در دو مرحله (قبل و یک ماه بعد از آموزش) نکمل کردند. آموزش مهارت‌های ارتباطی به شکل کارگاه آموزشی همراه با بحث گروهی در یک روز به مدت ۷ ساعت برای گروه آزمون ارائه شد.

یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق حاکی از آنست که ۱) دو گروه کنترل و آزمون قبل از مداخله در سطح متوسطی از مهارت‌های ارتباطی و استرس شغلی فرار داشتند. ۲) بعد از مداخله مهارت‌های ارتباطی گروه آزمون بطور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته و برای بک ماه حفظ شده است. ۳) بعد از مداخله سطح استرس شغلی گروه آزمون بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و برای مدت بک ماه حفظ شده است پس می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای ارتباطی بر استرس شغلی پرستل پرستاری تأثیر گذار بوده و موجب کاهش آن می‌شود.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش پیشنهاد می‌شود آموزش مهارتهای ارتباطی برای پرستل پرستاری شاغل در مراکز توانبخشی به اجراء درآید تا آنان از این مهارتها برای مقابله با استرس شغلی استفاده کرده تا بدین ترتیب کیفیت مراقبت از مددجویان افزایش یابد.

کلید واژه‌ها: مهارتهای ارتباطی، استرس شغلی، پرستاری، توانبخشی

زمینه و هدف

مهمنترين عوامل تنش زاي حرفه اي برای پرستاران عبارتند از: حجم کاري زياد، سروکار داشتن با مرگ و مير بيماران، ارتباطات ضعيف با همکاران، ماهيّت غير قابل پيش بیني بودن شغل، کار شيفتي، آمادگي ناکافी، فقدان حمایت روانی، تقادر با پزشكان، ابهام در ميزان اختبار، افزایش روز افزوون بروکراسی (۵). اين پدیده می تواند برای پرستاران اثرات مخرب فيزيولوژيکي و روانشناختي داشته و بر سلامتی آنان اثرات سوئي بگذارد از سوي ديگر استرس شغلی با افزایش حوادث کاري، تأخير و غيّت از کار و نيز کاهش بهره‌وری و تعهد سازمانی به افت كيفيت مراقبت از بيماران منحصر می گردد. شورای بین المللی پرستاری اعلام می‌کند کارکنانی که تحت استرس شغلی بالائی قرار دارند، ۳۰ درصد بيشتر، دچار حوادث کاري می‌شوند هر کدام از اين عوارض و پيامدها بطور مستقيم و غير مستقيم هزينه‌های را برای فرد و سازمان در بردارند ناگفته روش است که اين هزينه‌ها در درجه اول متوجه سازمان می‌باشد.

طبق گزارش شورای بین المللی پرستاری^۱ در سال ۲۰۰۲ استرس شغلی برای کشور آمریکا سالانه حدود ۲۰۰-۳۰۰ بليون دلار هزينه در بر دارد (۶). محققین بسياری از جمله فاربر^۲ (۲۰۰۰) مهارت‌های ارتباطی^۳ را نوعی مهارت‌های تطبقي بر شمرده‌اند که می تواند استرس شغلی را تعدیل کند (۷). مهارت‌های ارتباطی به رفتارهایي اطلاق می شود که به فرد کمک می کند عواطف و نيازهای خود را بدرستی بيان کند و به اهداف بين فردی دست يابد (۸). می وارد^۴ می‌توسد. مهارت‌های ارتباطي پايه‌اي که تحت فشار کاري شديد در پرستاري اغلب لطمه خورده و فراموش می‌شوند، باعث ايجاد حسن مشترك بين اعضائي گروه کاري، همکاران، بيماران و خانواده آنان شده و استرس شغلی را در کارکنان پرستاري کاهش می‌دهد (۹).

بنابراین می توان چنین استنباط کرد که پرورش مهارت‌های ارتباطی در واقع نوعی راهبرد و مداخله به منظور مقابله با استرس شغلی شمرده می‌شود. محقق در نظر دارد اين


استرس شغلی^۱ امروزه به مسئله‌ای شایع و پرهزینه در محبيط‌های کاري تبدیل شده است و تعداد كمی از افراد هستند که با آن روبرو شده‌اند. در تحقيق انجام گرفته بوسيله انجمن تحقيقات پريستون^۲ در سال ۱۹۹۷ مشخص شده است: سه چهارم مستخدمين معتقد هستند که نسبت به نسل گذشته بيشتر دچار استرس شغلی شده‌اند (۱).

استرس ناشی از شغل، استرسی است که فرد معين بر سر شغل معنی دستخوش آن می‌شود. در این تعريف هم ويزگيهای فردی و هم عوامل شغلی دخیل دانسته می‌شوند. از آنجا که فرد و محبيط تأثيری مقابل بر هم دارند، در واقع میتوان گفت که فرآيند استرس شغلی نيز در چنین بافت بر هم كشنی پدید می‌آيد. پس میتوان گفت که كشن مقابل میان شرایط کار و ويزگيهای فردی شاغل چنان است که خواسته‌های محبيط کار بيش از آن است که فرد بتواند از پس آن بروآيد (۲). در سال ۱۹۷۹ کارازاک^۳ تئوري معروف کنترل- تقاضا را ارائه نمود. بر اساس اين تئوري استرس شغلی وقتی رخ می دهد که ميزان تقاضای روانی کار زياد و ميزان دامنه تصميم گيري، يا همان کنترل بر روی کار، کم باشد. بدین ترتيب، برخني شغل‌ها دارای استرس بيشتر و برخني كمتر هستند وی كلبه مشاغل و افراد را به ۴ گروه تقسيم نمود (۳).

شكل ۱-۱. شغل‌هایي مانند

پرستاري که از خواسته‌های روانی بالا و دامنه تصميم گيري کم برخوردارند، استرس شغلی بالاي دارند (۴).

شكل ۱-۱- مدل استرس شغلی کارازاک



4 International council of nursing

5 Farber

6 Communication skills

7 Seaward

1 Job stress

2 Princeton survey research institute

3 Karsek

استاد دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. پایابی پرسشنامه‌ها از طریق اجرا روی ۸ آزمودنی در مورد پرسشنامه استرس شغلی ۰/۷۳۲ و در مورد پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی با ضرب پایابی ۰/۸۶۸ بدست آمد.

پرسشنامه‌ها در دو مرحله قبل و بک ماه بعد از آموزش توسط کلیه نمونه‌ها در دو گروه تکمیل شدند. روش آموزش بدین صورت بود که مهارت‌های ارتباطی طی ۷ ساعت آموزش کارگاهی در یک روز (صبح و عصر)، با روش کار گروهی و بحث جهت گروه آزمون ارائه شد، برای استخراج اطلاعات پرسشنامه و نجزیه و تحلیل داده‌ها و داده پردازی از برنامه نرم افزاری spss 11.1 استفاده شده است.

یافته‌ها

تعداد نمونه‌ها ۴۸ نفر (۲۷ نفر گروه کنترل، ۲۱ نفر گروه آزمون) بوده است که تمامی آنها زن بودند. اکثریت نمونه‌ها در دو گروه را متأهلین (۴۰/۷۰) درصد در گروه کنترل و ۸۱ درصد در گروه آزمون) و بهیاران (۴/۷۰) درصد در گروه کنترل و ۶۶/۷ درصد گروه آزمون) تشکیل دادند. اکثریت نمونه‌ها در دو گروه دارای تحصیلات دبیلم (۶۳ درصد در گروه کنترل و ۶۶/۷ درصد در گروه آزمون) و نوبت کاری ثابت (۹۶ درصد در گروه کنترل و ۹۰/۴۸ درصد در گروه آزمون) بودند. دو گروه با کمک آزمون مجدوله خسی از نظر این متغیرها با یکدیگر مقایسه شدند که اختلاف معنا داری بین دو گروه دیده نشد و دو گروه از نظر این متغیرها با هم همان بودند. میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش در گروه کنترل ۴۰/۹۲ سال و در گروه آزمون ۴۱/۴۳ سال و میانگین سابقه کار در گروه کنترل ۱۸/۴۸ سال و در گروه آزمون ۱۷ سال و میانگین میزان کار در شباهه روز در گروه کنترل ۹/۲۲ ساعت و در گروه آزمون ۱۰/۹۵ ساعت بود. مقایسه این میانگین‌ها با کمک آزمون آماری تی اختلاف معنا داری را بین دو گروه تشان نداد بنابراین دو گروه از نظر متغیرهای سنی و سابقه کار و میزان کار در شباهه روز همسان بودند.

آزمون های آماری نشان دادند که مقایسه میانگین نمرات نهايی استرس شغلی در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معناداری نداشته است ($p-value = 0/222$)

مهارت‌ها را به پرسنل پرستاری مراکز توانبخشی شهرستانهای تهران، شمیرانات آموزش داده و ناشی آموزش مهارت‌های ارتباطی را بر استرس شغلی آنان بررسی و تعیین نماید. لازم به ذکر است مطالعات متعددی در ایران بصورت توصیفی به بررسی استرس شغلی پرداخته ولي تاکنون تحقیقات مداخله ای به منظور کاهش استرس شغلی پرستاران شاغل در مراکز توانبخشی انجام نگرفته است که این امر ضرورت انجام این تحقیق را روشنتر می سازد.

روش بررسی

این تحقیق از نوع مطالعات نیمه تجربی^۸ است. تعداد ۹۰ نفر پرسنل پرستاری شاغل در مراکز خدمات بهزیستی و توانبخشی روزانه، شبانه و فنی حرفه ای شهرستانهای تهران، ری و شمیرانات به روش سرشماری انتخاب شده و سپس بطور تصادفی، به دو گروه ۴۵ نفری کنترل و آزمون تقسیم شدند. تعداد ۱۸ نفر از افراد گروه کنترل در مرحله اول و دوم نکمل پرسشنامه، حاضر به همکاری نشدند و تنها ۲۱ نفر از افراد گروه آزمون در کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی شرکت کردند. و در نهایت، ۲۱ نفر گروه آزمون و ۲۷ نفر گروه کنترل را تشکیل دادند.

ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش مهارت‌های ارتباطی و پرسشنامه استرس شغلی است. جهت گردآوری داده‌های استرس شغلی از پرسشنامه محتوای شغلی کارازاک، استفاده پرسشنامه محتوای شغلی کارازاک انتخاب شدند. هر سوال براساس مقیاس لیکرت چهار درجه ای امتیاز بندی شده بود. این پرسشنامه میزان استرس شغلی را در ۵ مقیاس (دامنه تصمیم گیری یا کنترل بر روی کار، تفاضلی روانی کار، عدم امتیت شغلی، تاراحتی از شرایط کاری پر خطر، حمایت اجتماعی کمی سنجید. پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی نیز توسط محقق تهیه و تنظیم گردید. این پرسشنامه هم حاوی ۳۴ سوال بود. پاسخ هر سوال از ۰ (قریبا هرگز) تا ۴ (همیشه) درجه بندی شد. روایی یا اعتبار علمی پرسشنامه‌ها توسط تعدادی از

جدول شماره ۳- مقایسه میانگین نمرات مهارت‌های ارتباطی و انحراف معیار گروه‌های کنترل و آزمون قبل و بعد از آموزش

زمان	شاخص آماری		میانگین	انحراف سطح
	معنی داری	معیار		
قبل از آموزش	کنترل	آزمون	۷۹/۱۱	۱۵/۰۸
بعد از آموزش	کنترل	آزمون	۷۲/۵۵	۱۳/۷۶
			۹۹/۸۱	۱۰/۲۰

جدول شماره ۴- مقایسه میانگین نمرات استرس شغلی و انحراف معیار گروه‌های کنترل و آزمون قبل و بعد از آموزش

زمان	شاخص آماری		میانگین	انحراف سطح
	معنی داری	معیار		
قبل از آموزش	کنترل	آزمون	۱۲/۱۲	۱۲/۱۲
بعد از آموزش	کنترل	آزمون	۶۵/۶۶	۸/۲۳
			۹۰/۸۵	۱۳/۹۸
			۹۰/۸۶	۱۳/۹۸

بحث

در تحقیق انجام شده مشخص گردید که میزان استرس شغلی و مهارت‌های ارتباطی اکثریت واحدهای مورد برداشته قبیل و بعد از آموزش در حد متوسط است. لی و کراکت^۱ (۱۹۹۴) در تحقیقی که بررسی روانپرستاران انجام دادند، استرس شغلی را در حد بالا و مهارت‌های ارتباطی قاطعیت را در حد پایین بیان کردند (۱۰). یعقوبیان و جتنی (۱۳۷۸) در تحقیقی که بر روی پرستاران شاغل در بیمارستانهای استان مازندران انجام دادند میزان استرس شغلی را در حد متوسط بیان نمودند (۱۱).

پیامی (۱۳۷۴) نیز میزان استرس شغلی پرستاران بخش‌های مرافت و پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران را متوسط گواش کرده است (۱۲).

همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آنست که بعد از آموزش، میزان مهارت‌های ارتباطی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش یافته و برای مدت ۴ هفته نیز حفظ شده

در حالیکه مقایسه میانگین این نمرات در گروه آزمون اختلاف معنی داری را نشان داد. (p-value=۰/۰۰۵) (جدول ۱) همچنین بین دو گروه کنترل و آزمون هم، اختلاف معنی داری در میزان استرس شغلی و مهارت‌های ارتباطی بعد از آموزش مشاهده گردید (جدول های ۲ و ۳ و ۴).

علاوه بر این بین دو گروه کنترل و آزمون قبل از آموزش در هیچیک از مقابله‌های استرس شغلی اختلاف معناداری وجود نداشت در صورتیکه بعد از آموزش اختلاف معناداری در خصوص مقیاس ناراحتی از شرایط کاری پرخطر بدست آمد (p-value=۰/۰۰۲).

ولی در خصوص مقیاسهای دائمی تصمیم‌گیری، خواسته های روانی کار، عدم امنیت شغلی و حمایت اجتماعی اختلاف معنی داری بین دو گروه کنترل و آزمون بعد از آموزش دیده نشد.

جدول شماره ۱- مقایسه میانگین نمرات استرس شغلی و انحراف معیار گروه‌های کنترل (قبل و بعد از آموزش) و آزمون (قبل و بعد از آموزش)

گروه	شاخص آماری		میانگین	انحراف معیار سطح
	معنی داری	معیار		
کنترل	پیش آزمون	۱۲/۱۲	۶۵/۶۶	۱۲/۱۲
	پس آزمون	۱۳/۹۸	۶۷/۵۸	۱/۲۲۲
آزمون	قبل از آموزش	۸/۷۸	۶۶/۹۰	۰/۰۰۵
	بعد از آموزش	۸/۲۳	۶۰/۸۶	۰/۰۰۵

جدول شماره ۲- مقایسه میانگین نمرات مهارت‌های ارتباطی و انحراف معیار گروه‌های کنترل (قبل و بعد از آموزش) و آزمون (قبل و بعد از آموزش)

گروه	شاخص آماری		میانگین	انحراف معیار سطح
	معنی داری	معیار		
کنترل	پیش آزمون	۱۲/۱۲	۷۹/۱۱	۱۵/۰۸
	پس آزمون	۱۱/۶۹	۷۲/۵۵	۰/۰۰۱
آزمون	قبل از آموزش	۱۳/۷۶	۷۹/۹۵	۱۳/۷۶
	بعد از آموزش	۱۰/۲۰	۹۹/۸۱	۰/۰۰۰

کار بوجود آورند و به این ترتیب استرسورهای محیط کار را تعدیل کنند (۷). با در نظر گرفتن این مطلب و نتایج پژوهش حاضر می‌توان به لزوم ارتقای مهارت‌های ارتباطی در محیط‌های کار پرستاری پس برده و از این روشن به منظور کاهش میزان استرس شغلی پرستاران بهره برد و بدین وسیله از نتایج سو ناشی از استرس شغلی، جلوگیری بعمل آورد و در نهایت از صرف هزینه‌های ناشی از عوارض آن (افزایش هزینه‌های درمانی کارکنان، غیبت از کار، کاهش کیفیت خدمات بهداشتی، درمانی) پیشگیری شود.

یافته‌های این تحقیق به نوبه خود می‌تواند راهگشای تلاشهای مفیدی در جهت آموزش، مددبریت و برنامه‌ریزی جهت برطرف نمودن استرس شغلی پرستاران باشد. پرستاران توانبخشی می‌توانند با انکا به نتایج این تحقیق از مهارت‌های ارتباطی بعنوان یکی از شیوه‌های سازگاری با استرس شغلی بهره ببرند.

با توجه به اینکه استرس شغلی باعث کاهش بهره‌وری و تعهد سازمانی می‌شود و اینکه آموزش مهارت‌های ارتباطی استرس شغلی را کاهش می‌دهد. مدیران و مسئولان پرستاری می‌توانند تسبیت به برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطی در محیط‌های کاری اقدام نموده و به این طریق نه تنها استرس پرستاران را کاهش دهند بلکه با جلوگیری از نتایج سو آن و افزایش بهره‌وری، کیفیت خدمات پرستاری و رضایت مددجویان را افزایش دهند. همچنین آنها می‌توانند با برقراری کلاس‌های آموزشی ضمن خدمت در خصوص مهارت‌های ارتباطی برای پرستاران بخصوص در بد و استخدام مهارت‌های آنان را در برقراری ارتباط بین فردی ارتباطی تقویت کنند به گونه‌ای که بتوانند با شرایط مختلف در محیط کار روبرو شده و کمتر دچار استرس شوند.

است. کارسون و دیگران^{۱۰} (۱۹۹۹) هم در تحقیق خود نشان دادند که آموزش ارتباطات اثربخش موجب افزایش میزان مهارت‌های ارتباطی می‌شود (۱۲). در ایران هم مسیب مرادی در تحقیقی بر روی پرستاران نشان داد آموزش ارتباط اثربخش باعث افزایش ارتباط قاطعانه می‌شود (۱۴). نتیجه دیگری که از یافته‌های این تحقیق می‌توان گرفت اینست که بعد از آموزش میزان استرس شغلی در گروه آزمون بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و برای مدت ۴ هفته نیز حفظ شده است.

لی و کراکت^{۱۱} (۱۹۹۴) هم در تحقیق خود نشان دادند که آموزش مهارت‌های ارتباطی قاطعیت میزان استرس پرستاران را بطور معنی داری کاهش می‌دهد (۱۰). در حالیکه راسل^{۱۲} (۱۹۹۱) اختلاف معنی داری را در میزان اضطراب دانشجویان پرستاری بین دو گروه آزمون و کنترل بعد از آموزش روش‌های پیشگیری از استرس و قاطعیت مشاهده نکرد (۱۵). کارسون و دیگران (۱۹۹۹) هم در تحقیق خود اختلاف معنی داری را بین گروه کنترل و آزمون بعد از آموزش ارتباطات اثربخش از نظر فرسودگی شغلی ندیدند (۱۳). نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش در جهت تایید فرضیه پژوهش بوده و نشانگر آنست که آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاری شاغل در مراکز توانبخشی شهرستانهای ری، نهران و شهریاران تاثیر گذار بوده و آن را کاهش می‌دهد. فاربر (۲۰۰۰) هم مهارت‌های ارتباطی را نوعی مهارت‌های نطاپقی می‌داند که می‌تواند استرس شغلی را تعدیل نماید او معتقد است ما از طریق آموزش مهارت‌های ارتباطی به کارکنان کمک می‌کیم تا ۱) انتظارات خود از دیگران را روشن کرده و سپس آنرا سازگار نمایند ۲) بر جنبه‌های مثبت زندگی کاری تمرکز داشته باشند و ۳) شبکه‌های اجتماعی قوی را در محیط

REFERENCES

1. sauter, S. Lawrence M. Michael C. et al. Stress at work,1999; DHHS (Nłosh) publication No. 99-101,http://www.cdc.gov/niosh.
2. راس، آر، رندال، آنماری، ام، البرابت، باستر س. شغلی، ترجمه غلامرضا خواجه پور، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۷۷، صفحه ۱۷۷.
۳. بزدی، سیده منور، بررسی تبدیلی شغلی در آتشنشانان مرد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران در سال ۱۳۷۹، مجله دانشکده پزشکی، شماره ۶، ۱۳۸۰، صفحه های ۷۳ تا ۷۷.
4. Karasek RA. Job decision latitude and mental strain implications for job redesign. *Adm. sci. Q.* 1979; 24: 285- 308.
5. Taylor ,P. A. and Ellison, R. N. sources of stress and psychological well being in high dependency nursing, *J.O.A.N* 1994; 19: 469-476.
6. Kingama , M. on occupational stress and worker health. (ICN) *Nursing Matters* 2002; Page 2.
7. Farber, B. A. Understanding and treating burnout in a changing culture. *jclp / in session: psychotherapy in practice*; 2000; 56 (5): 589-594.
۸. کیوانی، سعیدر، بررسی مهارتهای ارتباطی و تعاملی در بیماران روان پرش بالای ۱۸ سال، پایان نامه کارشناسی ارشد کاردرومانی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی، ۱۳۸۰، صفحه های ۱۰۹.
9. Seaward, L. B. managing stress in emergency medical services .London: jones and Bartlett publishers' company; 2000: page 42, www. StressLessEMS. com.
10. Lee S , Crockett MS. Effect of assertiveness training on levels of stress and assertiveness experienced by nurses in Taiwan. *Issues in Mental Health Nursing*.1994; 15: 419- 32. (Medline).
۱۱. بیقریان، محبویه، جنتی یسفانه، بررسی وضعیت تبدیلی شغلی در بیماران شاغل در بیمارستانهای استان مازندران در سال ۱۳۷۸، مجله علمی دانشکده پرستاری مامایی همدان، شماره ۱۹، سال دهم، تابستان ۱۳۸۰، صفحه ۱ تا ۷.
۱۲. پیامی پوخاری، میرزا، بررسی وضعیت حمایت‌های اجتماعی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی بیماران مراقبهای ویژه، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۴.
13. Carson j, Cavagin j, Bunclark j, et al. Effective communication in mental health nurses; did social support save the psychiatric nurse? *NT Research* 1999; 4: 31 – 42.
۱۴. مسیب مرادی، حمیله، بررسی میزان آگاهی بیماران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه تهران از ارتباط، پایان نامه کارشناسی ارشد روانپرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، استیتو روپرشنکی تهران، ۱۳۶۷.
15. Russler M. F. Multidimensional stress management in nursing education. *J Nurs Educ* 1991; 30:341-6. (Medline).