

اتیولوژی و سرنوشت End Stage Renal Disease در

کودکان تحت همودیالیز

مرکز طبی کودکان، ۱۳۶۸-۸۱

دکتر عباس مدنی، دکتر مرجان شکیبا، دکتر نعمت‌الله عطایی، دکتر سید طاهر اصفهانی، دکتر پروین محسنی

چکیده

مقدمه: ESRD به جهت مرگ و میر بالا، عوارض بیماری و کیفیت پایین زندگی و مشکلات درمان اعم از دیالیز و پیوند، از معضلات طب اطفال می‌باشد. در این مطالعه اتیولوژی و outcome در کودکان مبتلا به ESRD تحت همودیالیز در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها: ۲۱۶ بیمار طی مدت ۱۴ سال (از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۸۱) در این مرکز تحت بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نسبت ابتلا مذکور به مونث $\frac{1}{14}$ بود و پیک شیوع سنی ۱۰ سال بود. در 30% بیماران علت ESRD اختلالات اورولوژیک مادرزادی بود که از این گروه 21% مبتلا به VUR و $8/5\%$ دچار اوروباتیهای انسدادی مادرزادی بودند. در 20% بیماران گلومرولوپاتیها علت ESRD بودند. $14/3\%$ به علت نفروپاتیهای ارشی دچار ESRD شدند و 7% مبتلا به بیماریهای مولتی سیستمیک بودند. در $16/2\%$ موارد علت ESRD مشخص نشد. از ۲۱۶ بیمار 203 بیمار در این مرکز تحت پیگیری قرار گرفتند که از این تعداد در 145 نفر ($71/4\%$) همودیالیز ادامه یافت، 28 نفر ($13/8\%$) پیوند ناموفق و 15 نفر ($17/4\%$) پیوند موفق داشتند. Mortality rate در این مطالعه $7/4\%$ بود.

جامعه و امکانات ناکافی سیستم‌های درمانی هنوز management این بیماران به صورت مطلوب انجام نمی‌شود (۱-۳). اتیولوژی ESRD در کودکان با بزرگسالان تفاوت دارد و شناخت این علل و مشخص ساختن سهم آنها در ایجاد ESRD راهنمایی برای کاهش بروز ESRD یا به تاخیر انداختن آن است (۲-۸).

با توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و نقش عوامل زننده و فاکتورهای محیطی در علل ایجاد کننده ESRD و تفاوت در

مقدمه

ESRD به جهت مرگ و میر بالا، عوارض بیماری و کیفیت پایین زندگی و مشکلات درمان اعم از دیالیز و پیوند، از معضلات طب اطفال می‌باشد. اگر چه پرونده در کودکان با انجام دیالیز و پیوند کلیه بهبود قابل توجهی یافته است؛ در کشورهای در حال توسعه من جمله کشور ما به علت هزینه‌های بالای درمان و مشکلات موجود در سطح

اطلاعات و مشخصات لازم جهت ورود به مطالعه اتیولوژی و outcome موجود نبود.

سن و جنس

در بررسی انجام شده در بیماران تحت همودیالیز ۱۱۸ نفر، (۰.۵۳/۴) مذکور و ۱۰۳ نفر (۰.۴۶/۶) مومنت بودند. نسبت ابتلاء مذکور به مومنت $\frac{1}{14}$ بود. پیک بروز ESRD ۱۰ سال (۸-۱۲) سال بود. ۹۶ بیمار (۰.۴۶/۳) بیماران در محدوده سنی ۱۰-۱۰ سال، ۷۹٪ (۷۹ بیمار) در محدوده سنی ۱۱-۱۵ سال و ۹.۷٪ در سنین ۱-۵ سال و ۰.۴٪ (۱۰ بیمار) پس از ۱۵ سال و ۲ بیمار (۰.۱٪) قبل از یکسال دچار ESRD شده بودند.

پیک بروز ESRD در گلومرولوپاتیها ۶-۱۰ سال در مalfورماتیونهای اورولوژیک مادرزادی ۶-۱۰ سال (برای VUR ۶-۱۰ سال و برای PUV کمتر از ۶ سال)، برای نفروپاتیهای ارثی و بیماریهای مولتی سیستمیک ۶-۱۰ سال و برای نفرولیتیازیس ۱۱-۱۵ سال بود.

اتیولوژی

علل ESRD در کودکان در جدول شماره (۱) نشان داده شده است.

Congenital urological malformation (۰.۳۰٪) علت ESRD بود. شایعترین اختلال مادرزادی اورولوژیک Vesicoureteral Reflux (VUR) بود که در ۴۶ بیمار (۰.۲۱٪) وجود داشت از این تعداد ۲۵ نفر VUR اولیه داشتند و در ۲۱ بیمار VUR ثانویه به Neurogenic bladder بود. ۱۹ بیمار (۰.۰۸/۵٪) مبتلا به اوروپاتیهای انسدادی مادرزادی Posterior Urethral Valve (PUV) بودند. تنها در ۱ مورد هیپوپلازی کلیه گزارش شد.

گلومرولوپاتیها در ۴۳ بیمار (۰.۲۰٪) علت بروز ESRD بود. در این گروه ۳۳ بیمار ۱۵٪ دچار سندرم نفروتیک بودند که در ۱۷ بیمار پاتولوژی Focal segmental Glomerulosclerosis (FSGS) و در ۱۱ بیمار Mesangial Proliferative Glomerulonephritis (MPGN) بود و در ۵ بیمار بیوپسی انجام نشده بود. ۸ بیمار دچار Rapid progressive Gomerulonephritis Diffuse Glomerular (RPGN) و یک مورد مبتلا به

شیوه تشخیص و درمان بیماریها در مناطق مختلف، هر کشوری نیاز به مراکر ثبت بیماریها و آمار مربوط به خود دارد (۹). در ایران متاسفانه چنین مراکزی وجود ندارند لذا اطلاعات ما محدود به مطالعات انجام شده در مراکر مرجع به صورت مجزا می‌باشد. مرکز طبی کودکان یکی از بزرگترین این مراکر در ایران می‌باشد که تعداد زیادی از بیماران مبتلا به بیماریهای کلیوی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مواد و روش‌ها

مطالعه به صورت، رتروسپکتیو بر روی بیمارانی انجام شد که به علت ESRD (GFR کمتر از 10 ml/min/m^2 طبیعی برای سن و جنس) (۹) در این مرکز تحت بررسی و همودیالیز قرار گرفتند. مطالعه از زمان تاسیس بخش همودیالیز در سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۸۱ انجام شد.

اطلاعات از پرونده بیماران استخراج شد و در مورد هر بیمار، شامل سن، جنس، زمان بروز علائم بیماری کلیوی و زمان بروز ESRD و شروع دیالیز، علامت اولیه بیماری کلیوی می‌باشد.

از ۲۲۱ بیمار مراجعه کرده به این مرکز به علت محدودیت اطلاعات ثبت شده در پرونده ۲۱۶ بیمار از نظر اتیولوژی مورد بررسی قرار گرفتند و با توجه به ارجاع سریع برخی از بیماران به مراکز دیگر جهت پیگیری ۲۰۳ بیمار از نظر outcome بررسی شدند. ضمناً مطالعه اتیولوژیک در دو دوره مجزای ۷ ساله نیز به منظور بررسی اثرات تغییرات بارز در درمان و ارزیابی UTI و غربالگری این بیماران از نظر اختلالات زمینه‌ای سیستم ادراری انجام شد و نتایج این دو دوره با هم مقایسه شد.

یافته‌ها

۲۲۱ بیمار طی مدت ۱۴ سال در این مرکز تحت همودیالیز قرار گرفتند. که از این تعداد ۲۱۶ بیمار از نظر اتیولوژی و ۲۰۳ بیمار از نظر outcome قابل بررسی بودند. در سایرین

۳/۳	۷	Other's	IgA nephropathy (DGS) و یک مورد مبتلا به
۲/۳	۷	Chronic interstitial nephritis	بود.
۱/۵	۳	Chronic pyelonephritis	
۱/۵	۳	Wilm's tumor + nephrectomy	
۰/۵	۱	GM, gangliosidoses	
۱۶/۲	۳۵	Etiology uncertain	
٪۱۰۰	۲۱۶	نتیجه	جدول شماره ۱-علل ESRD در کودکان مراجعه کننده
درصد	تعداد		
۲۰	۴۳	گلومرولوپاتی	
۱۵/۳	۳۳	سندرم نفروتیک	
۷/۹	۱۷	FSGS	
۵/۱	۱۱	MPGN	
۲/۳	۵	Unclassified	
۰/۵	۱	Chronic diffuse glomerular sclerosis (DGS)	
۳/۷	۸	RPGN	
۰/۹	۲	PSGN	
۲/۸	۶	دیگران	
۰/۵	۱	IgA Nephropathies	
۱۴/۳	۳۱	Hereditary nephropathies	
۳/۳	۷	Alport syn.	
۴/۶	۱۰	Cystinosis	
۰/۹	۲	Congenital nephritic syn.	
۰/۹	۲	Laurence-moon-biedl syn.	
۰/۵	۱	Polycystic kidney dis	
۳/۷	۸	نفرونپاتی	
۳۰	۶۵	Congenital urological malformation	
۲۱	۴۶	Vesicoureteral reflux	
۹/۴	۲۱	With associated neurogenic bladder	
۱۱/۶	۲۵	Without associated neurogenic bladder	
۸/۵	۱۹	Congenital obstructive uropathy	
۵/۹	۱۱	Posterior ureteral valve	
۱/۰	۲	Ureteropelvic junction obstruction	
۰/۹	۳	Ureterovesical junction obstruction	
۰/۹	۳	Bilateral ureteral stenosis	
۰/۵	۱	Hypoplastic/dysplastic/aplastic kidneys	
۷	۱۵	Multisystem diseases	
۳/۳	۷	HUS (hemolytic uremic syn.)	
۲/۸	۶	SLE (Systemic lupus erythematosus)	
۰/۹	۲	PAN (polyarthritis nodosa)	
۱۲/۵	۲۷	Other renal disorders	
۷/۲	۱۳	Nephrolithiasis	
۲/۹	۶	hyperoxaluria	

نفرونپاتی‌های ارشی در ۱۴/۳٪ موارد علت ESRD بود که سندرم آپورت با ۳/۳٪ و سیستینوزیس با ۴/۶٪ و نفرونوفیتیازیس با ۳/۷٪ شایعترین موارد بودند. بیماری‌های مولتی سیستمیک در ۷٪ موارد و نفرولیتیازیس در ۶/۲٪ موارد علت ESRD بود. در ۲/۹٪ هیراگزالوری علت نفرولیتیازیس و ESRD بود. در ۳۵ بیمار (۱۶/۲٪) علی‌رغم بررسی علت ESRD مشخص نشد.

در بررسی انجام شده اتیولوژی‌های شایع ESRD در کودکان ۵ سال و کمتر، گلومرولوپاتی و مalfورماتیون اورولوژیک مادرزادی با ۳۲٪، نفرونپاتی‌های ارشی با ۱۸٪ بود. در این سنین PUV ۱۸/۲٪ و VUR ۱۲/۵٪ موارد را شامل می‌شود.

در سنین ۶-۱۰ سال مalfورماتیون‌های اورولوژیک مادرزادی با ۳۵٪ (VUR ۰/۲۵٪) و اورونپاتی‌های انسدادی مادرزادی (۰/۸/۷۵٪) شایعترین علت بود. سایر علل به ترتیب گلومرولوپاتیها با ۲۱/۵٪ نفرونپاتی‌های ارشی با ۱۷/۵٪ و بیماری‌های مولتی سیستم با ۷/۵٪ و نفرولیتیازیس با ۶/۲۵٪ بود.

در سنین ۱۱-۱۵ سال مalfورماتیون‌های اورولوژیک مادرزادی ۳۸٪ موارد را تشکیل می‌داد که ۰/۹٪ آن را VUR و ۰/۷/۱٪ آن را اورونپاتی‌های انسدادی مادرزادی شامل می‌شد. سایر موارد گلومرولوپاتیها با ۲/۲۳٪ و نفرونپاتی‌های ارشی با ۱۷/۴٪ و بیماری‌های مولتی سیستم با ۰/۹٪ و نفرولیتیازیس با ۰/۶٪ بود.

در بررسی مقایسه‌ای دو دوره ۷ ساله از ساله ۱۳۷۴-۱۳۶۸ و ۱۳۷۵-۱۳۸۱ هیچ تغییری در ترتیب شیوع اتیولوژیک بیماری مشاهده نشد. نتایج بررسی در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول شماره ۲- شیوع اتیولوژیک در کودکان مراجعه کننده

مورد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
گلومرولوپاتی	۲۶	۲۰/۳	۱۷	۱۹/۴
Hereditary nephropathy	۱۵	۱۱/۸	۱۶	۱۸/۲
Congenital urologic malformation	۴۰	۳۱/۲	۲۵	۲۸/۴
VUR	۲۶	۲۰/۳	۲۰	۲۲/۷
With neurogenic bladder	۸	۶	۱۳	۱۴/۷
With out neurogenic bladder	۱۸	۱۴/۳	۷	۸
Congenital obstructive uropathy	۱۳	۱۰/۲	۵	۵/۷
Multisystem disease	۹	۷	۶	۷/۸
Etiology uncertain	۲۳	۱۷/۹	۱۲	۱۳/۶
Other's	۱۵	۱۱/۸	۱۲	۱۳/۶
نتیجه	۱۲۸	۱۰۰	۸۸	۱۰۰

دختران، به عنوان علت ثبت موارد بیشتری از بیماران مذکور و افزایش نسبت ابتلا مذکور به مونث ذکر شده است. (۱۵) به هر حال در مطالعه ما و در مطالعه دیگری که در بیمارستان علی اصغر انجام شده است تفاوت بارزی در جنس مبتلایان مشاهده نشد (۳). شایعترین علت بروز ESRD مalfورماتیون‌های اورولوژیک مادرزادی (۰/۳۰٪) بود که شامل VUR (۶ بیمار) و اوروپاتی انسدادی (۱۹ بیمار) و یک مورد هیپوپلازی بود. از ۴۶ مورد مبتلا به VUR، ۲۱ بیمار در زمینه مثانه نوروزنیک و ۲۵ بیمار به صورت اولیه دچار بیماری بودند. شایعترین علت مثانه نوروزنیک در کودکان نقص تکامل لوله عصی ذکر شده است. در مطالعه ما یک مورد در زمینه منتگوسل چهار مثانه نوروزنیک بود. در حالی که مطالعات قبلی در ایران بروز NTDS (Neural Tube Defect Syn) را ۱/۸٪ در هر ۱۰۰۰ تولد، ذکر کرده است (۱۰، ۱۱).

مسلم است که درمان پیشگیرانه با فولیک اسید در زمان بارداری می‌تواند نقش مهمی در کاهش موارد بروز NTDS در کشور ما خصوصاً با توجه به تغذیه نامناسب زنان باردار داشته باشد که کاهش موارد اختلال عملکرد سیستم ادراری و ESRD را به دنبال خواهد داشت. مصرف پیشگیرانه فولیک اسید در زنان باردار طی دهه اخیر در ایران از استقبال زیادی برخوردار بوده است (۱۳).

Out come

از ۲۰۳ بیماری که پیگیری شدند در ۱۴۵ بیمار (۰/۷۱/۴٪) همودیالیز ادامه یافت ۲۸ نفر (۱۳/۸٪) پیوند ناموفق و ۱۵ نفر (۴/۷٪) پیوند موفق داشتند. فاصله زمانی از انجام پیوند تا رد پیوند ۲۴ ساعت تا ۵ سال بود. اکثر موارد رد پیوند در سال اول پس از انجام آن اتفاق افتاد. در ۳ بیمار مبتلا به FSGS تحت پیوند قرار گرفتن عود بیماری در کلیه پیوندی گزارش شد.

بحث

این مطالعه یکی از چند مطالعه‌ای است که در ایران و در مراکز بزرگ مرجع بر روی موارد CRF و ESRD انجام شده است. نتایج دقیق‌تر نیاز به وجود مراکز ثبت و جمع‌آوری برای کلیه بررسی‌های انجام شده در مراکز مختلف دارد. در مطالعه‌ایی که در این مرکز انجام شده است نسبت ابتلا مذکور به مونث $\frac{۱/۱۴}{۱}$ می‌باشد که ارجحیت موارد بروز ESRD در پسران را که مطالعات دیگر انجام شده در کشورهای شرقی و آسیای میانه گزارش کرده‌اند، تایید نمی‌کند. در این مطالعات ترجیح والدین یا اطباء برای درمان جدی‌تر در پسران نسبت به

جدول شماره ۳- مقایسه نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در مراکز مختلف

تونس	هنگ	هنگ	ترکیه	سوئد	آلمان	NAPRTCS	Ali asghar Hos.	Our data	نوع مطالعه
۵	۶	۱۴	۴	۸	۱۲	—	—	—	فرانس
۹۰	۴۸	۴۵۹	۱۴۶	۶۲۳	۱۷۲۵	۱۶۶	۲۱۶	۱۱/۶	نتیجه مورد ESRD CRF یا اتیولوژی درصد
۴/۴	۲۰/۸	۲۷/۵	۰	۳/۹	۲/۷	۱۶۳	۱۱/۶	۹/۶	Primary VUR
۳/۴	۴/۲	۵	۲/۵	۱/۹	N/A	۹/۶	۹/۴	۹/۴	VUR with neurogenic bladder

جدول شماره ۴- ادامه مقایسه نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در مراکز مختلف

تازه‌نیا	هنگ	هنگ	کویت	سوئد	آلمان	USRDS	NAPRTCS	پیمانستان علی‌اصغر	Our data	مطالعه
۵	۱۳	۲	۱	۱۷	۷	۱۲	۳	—	—	فرانس
۹۰	۴۵۹	۳۰	۵۰	۹۲۵۰	۵۴۳۱	۱۷۲۵	۱۶۶	۲۱۶	۱۱/۶	نتیجه مورد ESRD CRF یا اتیولوژی درصد
ESRD	CRF	ESRD	ESRD	ESRD	ESRD	CRF	CRF	ESRD	۹/۴	Cystinosis
۱	۰	۰	۰	۳/۵	۰/۷	۱/۵	۶/۶	۴/۶	۹/۴	Primary hyperoxaluria
۱۳/۳	۰/۲	۳/۳	۲	۱/۶	۰/۴	۰/۱	۲/۴	۲/۹	۹/۴	ESRD CRF یا اتیولوژی درصد

موارد ناشی از اوروپاتیهای انسدادی کاهش نشان داد. میزان موارد مبتلا به مثانه نوروثنیک افزایش نشان داد که ناشی از تشخیص بیشتر این موارد بود. موارد با اتیولوژی نامشخص از ۱۷/۹٪ به ۱۳/۶٪ کاهش یافت. البته ما امیدواریم و احتمال می‌دهیم که با توجه روزافزون مشاهده شده طی سالهای اخیر نسبت به غربالگری اختلالات آناتومیک مادرزادی سیستم ادراری در مطالعاتی که در آینده صورت می‌گیرد شاهد کاهش این موارد قابل پیشگیری و درمان باشیم.

موارد اندک هیپوپلازی، آپلازی و دیسپلازی در مطالعه ناشی از انتخاب گروه مطالعه می‌باشد زیرا اکثر این موارد در سنین پایین دچار ESRD شده و توسط والدین قطع درمان شده یا به علت سن پایین تحت دیالیز صفاتی قرار می‌گیرند. فراوانی گلومرولوپاتی به عنوان اتیولوژی ESRD در مطالعه ما ۲۰٪ بود که نسبت به مطالعه دیگر انجام شده در ایران در بیمارستان علی‌اصغر افزایش و نسبت به سایر مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه که آماری بیش از ۳۵٪ گزارش کرده‌اند کاهش نشان می‌دهد (۱۶، ۹، ۱۲، ۱۷..).

مالفورماسیوهای اورولوژیک مادرزادی من جمله VUR در ایران شیوع بیشتری نسبت به کشورهای اروپائی و آمریکایی دارد و شیوع آن معادل کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و کشورهای هم‌جوار می‌باشد (۱۴، ۱۲، ۱۴). لذا به نظر می‌رسد که درمان صحیح کودکان مبتلا به UTI و بررسی این موارد و سایر موارد مشکوک به آنومالیهای سیستم ادراری از نظر وجود این مالفورماسیون‌ها و درمان مناسب اختلالات آنامومیک قابل اصلاح بتواند نقش مهمی در کاهش بروز موارد ESRD داشته باشد (۱۵، ۱۴، ۳). ما در این مطالعه کودکان را در دو دوره ۷ ساله ۱۳۷۴-۱۳۸۱ و ۱۳۷۵-۱۳۸۱ از نظر اتیولوژی مورد مطالعه و مقایسه قرار دادیم. انتظار داشتیم نظر به افزایش توجه سیستم پزشکی به درمان صحیح UTI و غربالگری بیماران از نظر وجود عامل زمینه‌ساز طی دو دهه اخیر از شیوع مالفورماسیونهای اورولوژیک به عنوان علت ESRD کاسته شده باشد که با توجه به نتایج به دست آمده فراوانی مالفورماسیون اورولوژیک مادرزادی از ۳۱/۲٪ به ۴/۲۸٪ و فراوانی VUR از ۳٪ به ۷/۲۲٪ رسید که تغییر بارزی را نشان نداد. میزان

جدول شماره ۵- ادامه مقایسه نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در مراکز مختلف

متالعه	Our data	بیمارستان	NAPRTCS	USRD	کانادا	آلمان	سوئد	کویت	هنگ	تanzania	علی‌اصغر
											رفرانس
نتیجه مورد CRF	۲۱۶	۵۴۳۱	۱۷۲۵	۶۲۵	۶۲۳	۱۴۶	۵۰	۴۸	۹۰	۴	۱
Etiology of CRF (%)	ESRD	ESRD	CRF	ESRD	ESRD	CRF	ESRD	ESRD	ESRD	ESRD	ESRD
گلومروپاتیک	۲۰	۱۰	۳۷/۶	۱۹	۲۳/۵	۱۹/۱	۱۴/۵	۴۴	۳۷/۵	۱۹	۵
نفروپاتیک	۱۴/۳	۲۱	۲۴/۴	۴۱/۵	۲۲/۲	۳۱/۸	۲۵	۶	۹/۳	۲۹	۹

بیماران ایرانی به علت هزینه بالای درمان و عدم دسترسی به دهنده مناسب برای پیوند، تحت همودیالیز باقی می‌مانند. در مطالعه دیگری در ایران که ۲۶ مورد پیوند در کودکان را گزارش نموده، نتایجی مشابه مطالعات اروپایی و آمریکا (USA) را نشان می‌دهد (۱۹,۲۰). در حالی که در مطالعه ما

نتایج با ۶۵٪ شکست در مورد پیوند و در مقایسه با مطالعه دیگری که در کویت انجام شده و میزان بقای پیوند را در مورد دهنده، زنده $76 \pm 8\%$ و برای موارد پیوند از جسد $66 \pm 2\%$ گزارش کرده نامطلوب به نظر می‌رسد (۱).

در نهایت management برای CRF و ESRD در ایران هنوز یک مفصل بزرگ است. فراوانی بالای مالفورماتیون‌های اورولوژیک مادرزادی قابل اصلاح در تمام سنین به عنوان ایتوولوژی ESRD مشاهده می‌شود که با تشخیص زودرس و درمان و پیگیری صحیح قابل اصلاح بوده و می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه در بروز موارد ESRD شود. نفروپاتیهای ارشی را با دادن آگاهی به افراد جامعه در مورد اجتناب از ازدواج‌های فamilی می‌توان کاهش داد. نهایتاً برنامه Renal Replacement therapy (RRT) شامل پیوند کلیه باید هدف نهایی درمان باشد. افزایش مراکز تحقیقاتی و درمانی نفرولوژی در پیوند کلیه، دقت در انتخاب دهنده مناسب، کاهش هزینه‌های درمان و افزایش امکانات و توجه به بهبود درمانهای پیشگیرانه از رد پیوند می‌تواند در آینده outcome کودکان دچار ESRD را بهبود بخشد.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از خانم سیده راضیه ذریت خواه که در جمع آوری اطلاعات این مقاله ما را یاری دادند تشکر می‌کنیم.

میزان فراوانی نفروپاتیهای ارشی در مطالعه ما ۱۴/۳٪ بود که در مقایسه با مطالعات اروپایی درصد کمتری از موارد ESRD را تشکیل می‌دهد. در مطالعه دیگری در ایران، فراوانی این گروه ۲۱٪ گزارش شده است. [۱۲ و ۹ و ۸ و ۷ و ۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۱].

به نظر می‌رسد کاهش نقش نفروپاتیهای ارشی در بروز ESRD در کشور ما بیشتر ناشی از شیوع بالای سایر علل است تا کم بودن موارد نفروپاتیهای ارشی، زیرا در کشور ما با توجه به میزان بالای ازدواج‌های فamilی این بیماریها شیوع بالایی دارند. کما این که فراوانی سیستینوز و هیپرآگرالوری در مطالعات ما فراوانی بیشتری را نسبت کشورهای اروپایی نشان می‌دهد (۱۲,۱۴, ۳-۶).

در بررسی انجام شده در این مرکز از ۲۰۳ بیمار در ۱۴۵ نفر بدون اقدام برای پیوند دیالیز ادامه یافت. ۴۳ بیمار پیوند دریافت کردند که از این تعداد ۲۸ مورد ناموفق و ۱۵ مورد تا زمان پایان مطالعه موفق بود. میزان شکست پیوند ۶۵٪ بود که مقدار قابل توجهی است. نفرولوژی کودکان در ایران طب جوانی است. در بیشتر مناطق ایران همودیالیز بیش از سایر روشها (پیوند و دیالیز صفاقی) در دسترس بیماران قرار دارد. دیالیز صفاقی در ایران به صورت گسترده انجام نمی‌شود. برخلاف سایر ملل که میزان استفاده از این روش بالا یا رو به افزایش است (۱۸). یکی از علل عدم مقبولیت آن میزان بالای عوارضی مانند عفونت است که به علت عدم کمپلیانس و امکانات مناسب بیماران می‌باشد. اگر چه با توجه به مزایای این روش تلاش جهت جایگزین ساختن دیالیز صفاقی به جای همودیالیز و رفع مشکلات ادامه دارد. تعداد زیادی از

منابع

1. EL Reshaid K, Madan MK, Naryanan Nampoory MR, EL-Reshaid W, Johny KV. Pediatric dialysis and renal transplantation in Kuwait over the past 11 years. *Pediatr Nephrol* 1999; 13: 259-264.
2. Ehlayel MS, AKIKF. Childhood chronic renal failure in Qatar. *Br J Clin Pract* 1992; 46: 19-20.
3. Madani K, Otoukesh H, Rastegar A, Why SV. Chronic renal failure in Iranian children. *Pediatr Nephrol* 2001; 16: 140-144.
4. Esbjorner E, Berg U, Hansson S. Epidemiology of chronic renal failure in children: a report from Sweden. *Pediatr Nephrol* 1986-1994; 11: 438-442.
5. Kamoun Lakhua R. ESRD of the Tunisian child: epidemiology, etiology and outcome. *Pediatr Nephrol* 1996; 10: 479-482.
6. Gulatis Mittals, Sharma RK, Gupta A. Etiology and outcome of chronic renal failure in Indian children. *Pediatr Nephrol* 1999.
7. United States Renal Data System 1999 Annual Data Report. US Department of Health and Human Services, Public Health Service. National Institute of Health, Bethesda, Maryland 1999; p. 113-129.
8. Pistor K, Scharer K, Olbing H, Tamminen-Mobius T. Children with children with chronic renal failure in the federal republic of Germany. II. Primary renal diseases, age and interval from early renal failure to renal death. *Clin Nephrol* 1989; 23: 278-283.
9. T Martin Barratt, Ellis D, Avener William E, Harmon. *Pediatric Nephrology*, 4th edition 1999; p. 1151-1157, 1183-1194, 1267-1283.
10. Naderi S. Congenital abnormalities in newborns of consanguineous and non consanguineous parents. *Obstet Gynecol* 1979; 53: 195-198.
11. Farhud DD, Walizadeh GR, Sharif Kamali M. Congenital malformations and genetic diseases in Iranian infants. *Hum Genet* 1986; 74: 382-385.
12. Fivush BA, Jabs K, Neu AM, Sullivan K, Feld L, Kohaut E, Fine R. Chronic renal insufficiency in children and adolescents: the 1996 report of NAPRTCS. *Pediatr Nephrol* 1998; 12: 328-337.
13. Abramsky L, Botting B, Chappie J, Stone D. Has advice on periconceptional folate supplementation reduced neural-tube defects? *Lancet* 1999; 354: 998-999.
14. Sirin A, Sevinc E, Alpay H, Nayir A, Bilge I, Tanman F. Etiology of chronic renal failure in Turkish children. *Pediatr Nephrol* 1995; 9: 549-552.
15. Vallee JP, Vallee MPD, Greenfield SP, Wan J, Springate J. Contemporary incidence of Morbidity related to vesicoureteral reflux. *Pediatr* 1999; 53: 812-815.
16. Amir Jalal Al-Mosawi. The etiology of chronic renal failure in 54 Iraq children. *Pediatr Nephrol* 2002; 17: 463-464.
17. Loirat C, Ehrlich JH, Geeling W, Jones EH, Landais P, Mattick NP, Margreiter R, Raine AE, Salmela K, Selwood NH, Tufveson G, Vaderrabano E. Report on management of renal failure in children in Europe XXIII 1992. *Nephrol Dial Transplant* 1994; 9(suppl 1): 26-40.
18. Gusmano R, Perfumo F. World wide demographic aspects of chronic renal failure in children. *Kidney Int* 1993; 43(suppl 41): s31-s35.
19. Broumand B. Living donors: the Iran experience. *Nephrol Dial Transplant* 1997; 12: 1830-1831.
20. Ahmad E, Malek Hossein SA, Nezadatgo N, Salahi H, Fallah-Zadeh MH, Javid R, Gharmani N. A report of 26 cases of renal transplantation in children. *Transplant Proc* 1995; 27: 2570.