

اندکس پائی/ بازوئی به عنوان یک تست پیش گوئی کننده بیماریهای عروق کرونر در بیماران دیابتی

دکتر منصور رفیعی (استادیار)، دکتر سید محمد صدر بافقی (دانشیار)، دکتر محمد افخمی اردکانی (استادیار)**، دکتر سیده مهدیه نماینده (پژوهش عمومی)، دکتر امیر محمد عرفان (پژوهش عمومی)، مهندس محمد حسین احمدیه (استادیار)**، دکتر حمیدرضا دهقان (پژوهش عمومی)، دکتر رضا رفیعی (پژوهش عمومی)، دکتر مسعود رحمانیان (پژوهش عمومی)* دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق ** دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، فوق تخصص بیماریهای غدد داخلی *** علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مشاور آمار

چکیده

مقدمه: بیماری قلبی و عروقی علت اصلی مرگ ناشی از دیابت است و در بیماران مبتلا به دیابت ۲-۴ برابر شایعتر از جمعیت عمومی میباشد. بیماریهای عروق محیطی نیز در بیماران دیابتی ۴ برابر شایعتر است. مطالعات متعددی همراهی بیماری عروق محیطی را با درگیری عروق کرونر و حتی کاروتید به اثبات رسانیده‌اند. انداکس ABI (Ankle/Brachial Index) یک تست حساس و اختصاصی (حساسیت ۹۵٪ و ویژگی ۹۹٪) جهت سنجش بیماری‌های عروق محیطی میباشد. هدف این مطالعه ارزیابی قدرت پیشگویی کننده انداکس ABI در تشخیص بیماری‌های ایسکمیک عروق کرونر در بیماران دیابتی می‌باشد.

مواد و روشها: در این مطالعه تعداد ۹۴۸ بیماران دیابتی که ۲ سال یا بیشتر از تشخیص دیابت آنها می‌گذشت و جهت مراقبت دیابت به مرکز تحقیقات دیابت مراجعه کردند در طول یکسال وارد مطالعه شدند. انداکس ABI برای تعامی بیماران محاسبه گردید و مشخصات دموگرافی و ریسک فاکتورهای بیماران ثبت گردید. کلیه افرادی که ABI آنها کمتر از ۱/۱ یا بیشتر از ۱/۴ بود (۱۷۲ نفر) تست ورزش شدند ۱۰۵ نفر هم از نفرات باقی مانده بعنوان کنترل جمیعاً تعداد ۲۷۹ نفر با پروتکل Bruce تست ورزش شدند. نتایج تست ورزش با نتایج انداکس ABI مقایسه شدند.

یافته‌ها: از تعداد ۹۴۸ بیمار ۴۹۷ نفر (۵۲٪) زن و ۴۵۱ نفر (۴۷٪) مرد بودند. میانگین سنی 55 ± 25 سال. میانگین مدت ابلاست دیابت $11/2 \pm 8/84$ سال بود. ۵۶٪ فشار خون بالا داشتند. ۱۰٪ بیماران <1 ABI داشتند. ABI در گروه سنی >60 سال کاهش معنی داری نشان میداد ($P=0.02$) بیماران در سه گروه تقسیم شدند. گروه I با $1.1 \leq ABI < 1.4$ نفر (۲۵٪)، گروه II با $1.4 \leq ABI < 1.6$ نفر (۶۵٪) و گروه III با $ABI \geq 1.6$ نفر (۹٪) بودند. بیماران در گروه I و II ۶۰٪ بیماران در گروه III نیز در گروه III تست ورزش مثبت داشتند ($P=0.05$). در مجموع ۱۰۸ بیماران در گروه III نتست ورزش مثبت داشتند که اکثر آنها در گروه I و III بودند. ۷۲٪ در گروه I و ۵۲٪ در گروه II فشار خون بالا داشتند ($P=0.00$). ۶۶٪ از افراد هیپرتنسیو گروه I و ۸۰٪ از افراد هیپرتنسیو گروه III نتست ورزش مثبت داشتند در مقابل ۳۷٪ از افراد هیپرتنسیو گروه II که تست ورزش مثبت داشتند. ۵۵٪ از زنان و ۲۴٪ از مردان فشار خون بالا داشتند (OR=2.28 - CI = 1.68<OR<3.10).

نتیجه گیری و توصیه ها: انداکس پائی بازوئی میتواند یک انداکس معنیبر و مستقل برای سنجش بیماری عروق کرونر در بیماران دیابتی، خصوصاً مبتلا به فشار خون بایشد. این در حالیست که اکثرب این بیماران با بدون علامت هستند یا هنوز حوادث حاد کرونری در ایشان اتفاق نیافتدند است.

(۱۴،۱۵) تری گلیسیرید بالا (۱۶،۱۷)، کلسترول بالا (۱۲،۱۸) در مقایسه با افراد غیر دیابتی می‌باشد.

وجود بیماری عروق محیطی سبب افزایش میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی می‌شود بطوریکه $ABI < 0.9$ سبب افزایش مرگ و میر ۲-۳ برابر افراد با $ABI > 0.9$ میگردد (۱۹،۲۰) و در ضمن حوادث حاد عروق کرونری نیز در این افراد بیشتر از سایر افراد است (۷) و با شدت درگیری عروق کرونر ارتباط مستقیم دارد (۲۲،۲۱) بنابراین شناسانی بیماری عروق محیطی در بیماران دیابتی به وسیله اندکس ABI نه تنها قبل از علامت دار شدن آنها بیماری عروق محیطی را در آنها کشف میکند بلکه با توجه به همراهی بیماری عروق محیطی و عروق کرونر می‌توان در صدد تشخیص زودرس بیماری عروق کرونر در بیماران دیابتی برآمد و این بیماران را قبل از عارضه دار شدن تحت برنامه‌های تشخیصی و درمانی قرار دارد.

مطالعه حاضر با دو هدف کلی انجام گرفت یکی یافتن PAD در جمعیت بیماران دیابتی‌های که با استفاده از معیار ABI انجام می‌شد و دیگر یافتن میزان همراهی PAD و CHD با انجام تست ورزش در همین جمعیت و جستجوی موارد مثبت آن و مقایسه با انداختهای گوناگون. انداختهای آن و مقایسه با انداختهای گوناگون Cut off point ضمناً ما در این مطالعه بر آن شدیدم تا بهترین Cut off point اندکس ABI را در تشخیص بیماری‌های عروق کرونر در بیماران دیابتی بیاییم. لازم به ذکر است که Cut off point مناسب برای تشخیص PAD برابر با ۰.۹ می‌باشد ولی تا کنون این مقدار برای تشخیص بیماری‌های عروق کرونر مشخص نشده است.

مقدمه

بیماری دیابت یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماریهای متابولیکی در جهان می‌باشد که به واسطه کاهش میزان انسولین یا مقاومت به آن مشخص می‌شود و به علت سیر مزمن و بروز عوارض عدیده‌ای مانند رینوفیاتی، نفropاتی، نرپاتی و بیماریهای قلبی-عروقی و اختلالات متابولیکی یکی از مشکلات عمدۀ طب داخلی در قرن حاضر می‌باشد (۱).

همچنین بیماری قلبی-عروقی به عنوان مهم‌ترین عامل مرگ و میر در افراد پیر و بیماران دیابتی جایگاه ویژه‌ای دارد (۲). بیماری شریانی محیطی Peripheral arterial Disease (PAD) یک نشانگر و ریسک فاکتور قوی برای حوادث قلبی-عروقی محسوب می‌شود زیرا غالباً با آترواسکلروز کرونر و عروق مغز همراه است و اکثرآ کمتر از بیماریهای کرونر تشخیص داده و درمان می‌شود.

در اکثر مطالعات اپیدمیولوژیک اندکس غیر تهاجمی پائی-بازوی (Ankle / brachial Index)ABI را برای تشخیص ارتباط نزدیکی با بیماری عروق کرونر و کاروتید دارد، لذا تشخیص زود هنگام بیماری عروق محیطی می‌تواند کلید تشخیصی مهمی برای پیش‌بینی مشکلات قلبی-عروقی باشد. آترواسکلروز از مهم‌ترین علل بیماری عروق محیطی است که اندام تحتانی را وسیع تر و سریع‌تر از اندام فوقانی درگیر می‌نماید (۴) از آنجا که پاتوزن بیماری عروق محیطی و عروق کرونر یکسان است عوامل خطرساز یکسانی نیز روند ایجاد آنها تسریع می‌نماید (۵) بیماری عروق محیطی در افراد دیابتی ۴ برابر افراد غیر دیابتی است. همچنین بیماری قلبی عروقی نیز در دیابت بیشتر است (۶،۷،۸). علت بالاتر بودن شیوع بیماری عروق محیطی ممکن است بدلیل عوامل خطرسازی است که دارای سطح بالاتری در بیماران دیابتی هستند مثل سیگار (۱۱،۱۰،۱۲،۱۳)، فشار خون،

مواد و روش‌ها

انتخاب نمونه‌ها

افراد مورد مطالعه بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت در طی یکسال بودند که جهت مراقبت‌های دیابت مراجعه نموده بودند و بیش از ۲ سال از تشخیص دیابت آنها گذشته بود.

تست ورزش ثبت با مقادیر ABI در دو گروه هیپرتنسیو و نرموتنسیو بطور مجزا سنجیده شد. حساسیت به ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی با فواصلی ABI بین ۰/۰۵ و ۰/۱ محاسبه گردید.

تست Roc curve در خصوص ABI در مقایسه با تست ورزش رسم شد و مهمترین Cutoff point تست ABI در تعیین تست ورزش مثبت سنجیده شد. نتایج بصورت میانگین و رنج حداقل و حداکثر، میزان ریسک با فاصله اطمینان ۹۵٪ سنجیده شد و $P \text{ value} = <0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در این تحقیق کل بیماران دیابتی مورد مطالعه ۹۴۸ نفر بودند که از این تعداد ۴۰۱ نفر (۴۷/۶٪) مرد و ۴۹۷ نفر (۵۲/۴٪) زن بودند.

میانگین ABI بر حسب سن و جنس در جامعه مورد بررسی

بیماران مورد مطالعه بر اساس سن به سه گروه تقسیم یندی شدنده گروه اول سنی ۲۸۱ نفر بودند که در محدوده سنی ۲۲-۴۹ سال قرار داشتند و میانگین ABI در آنها $1/212 \pm 0/10$ بود، گروه دوم سنی شامل ۳۱۰ نفر بود که در محدوده سنی $50-59$ سال قرار داشتند که میانگین ABI آنها $1/206 \pm 0/04$ بود و در محدوده $50-59$ قرار داشت، گروه سوم سنی ۳۵۷ نفر بود که در محدوده سنی ۶۰-۸۴ سال قرار داشتند و میانگین ABI آنها $1/173 \pm 0/022$ بود و در محدوده $50-59$ قرار داشت تفlot میانگین های ABI در سه گروه سنی توسط Anova test آزمون گردید که با $P = 0.03$ تفاوت معنی دار گردید (نمودار شماره ۱). میانگین ABI بر حسب جنس به ترتیب در مردان $1/22 \pm 0/01$ و در زنان $1/164 \pm 0/008$ محاسبه گردید، تفاوت میانگین های ABI در گروه زنان و مردان توسط آنالیز واریانس آزمون گردید که با $P=0.00$ تفاوت معنی دار گردید.

تعداد ۹۴۸ بیمار با تمایل خود وارد مطالعه شدند و پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، مدت بیماری، نوع دیابت)، ریسک فاکتورهای بیماریهای ایسکمیک قلب برای هر بیمار تکمیل می گردید. اندکس ABI برای تمام بیماران اندازه گیری شد.

محاسبه اندکس پائی بازویی

بعد از ده دقیقه استراحت در حالت نشسته اندکس پائی بازویی برای بیمار به صورت زیر محاسبه شد: فشار سیستولیک هر دو دست را با قرار دادن گوشی دابلر دستی مدل: B - 505 (Hiyashi- Denici company) روی محل شریان براکیال و فشار سیستولیک هر دو پارا با قرار دادن گوشی دابلر دستی روی شریان دور سالیس پدیس با تیبیالیس پوستربور اندازه گیری شد.

جهت محاسبه اندکس پائی بازویی بیشترین فشار سیستولیک بین شریانهای دور سالیس پدیس یا تیبیالیس پوستربور: به بیشترین فشار سیستولیک دو دست تقسیم گردید. محاسبه این میزان برای هر دو سمت بدن انجام گرفت (۲۴).

انجام تست ورزش

تمامی بیماران جهت تست ورزش معرفی شدند. تست ورزش و به روش Bruce انجام شد. اندیکاسیون قطع تست به صورت تغییرات ایسکمیک ECG آریتمی، درد حین فعالیت و تنگی نفس حین فعالیت، افزایش فشار خون $>250/120$ یا کاهش بیشتر از ۱۰mmHg و عدم افزایش فشار خون بود. در صورت نداشتن علامت، تست ورزش تا رسیدن ضربان قلب به ۹۰ حداقل ضربان برای سن ادامه می یافت.

در نهایت ۱۲۷ نفر از ۲۳۸ نفر با $\text{ABI} = <1.1$ و ۴۷ نفر از ۸۵ بیمار با $\text{ABI} = >1.4$ و ۱۰۵ نفر از ۶۲۵ نفر با $\text{ABI} = >1.4$ جهت انجام تست ورزش مراجعه نمودند.

آنالیز آماری

اختلاف بین گروهها با استفاده از آزمون Chi-square و Fisher exact در متغیرهای کیفی و در متغیرهای کمی با استفاده از student T Test سنجیده شد.

بود تفاوت بین دو گروه آزمون گردید که تفاوت معنی دار شد $P=0.002$ (نمودار شماره ۲). وقتی توزیع فراوانی هیپر تانسیون بر حسب مقادیر مختلف ABI بررسی گردید نشان داده شد که از ۳۱۶ بیمار با $ABI < 1.1$ ، ۸۸ نفر (۲۷/۸٪) فشار خون نرمال و ۲۲۸ نفر (۷۲/۲٪) فشار خون بالا داشتند. در گروه $1.1 \leq ABI < 1.4$ ، ۱۱۷ نفر (۴۷/۵٪) فشار خون نرمال، ۵۲/۵٪ فشار خون بالا داشتند. از ۱۶۷ بیمار با $1.4 \leq ABI < 1.7$ ، ۵۹/۳٪ فشار خون نرمال و ۴۰/۷٪ فشار خون بالا داشتند. وجود فشار خون بالا در بین گروه های سه گانه ABI توسط آنالیز واریانس آزمون گردید که با ($P<0.01$) این تفاوت معنی دار شد. به عبارت دیگر در کسانی که ABI غیر طبیعی داشتند فشار خون بالا شایعتر بود (جدول شماره ۱). خطر ابتلاء به PAD با کритریای $ABI = 0.9$ در افراد هیپر تانسیو ۲/۵ برابر بیشتر از افراد نرموتانسیو است ($Odd\ ratio = 2.66$, $CI : 1.97-3.56$)

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی فشار خون بالا بر اساس ABI

ABI	جمع	فشار خون بالا	فشار خون نرمال
$\leq 1/1$	۹۲	۲۳۳	۳۲۵
%	۷/۲۸٪	۷/۷۱٪	۷/۱۰۰
$1/1 < ABI < 1/4$	۲۱۷	۲۳۹	۴۵۶
%	۷/۴۷٪	۷/۵۲٪	۷/۱۰۰
$> 1/4$	۹۹	۷۸	۱۶۷
%	۷/۰۹٪	۷/۴۰٪	۷/۱۰۰
جمع	۴۰۸	۵۴۰	۹۴۸
%	۷/۴۳	۷/۵۷	۷/۱۰۰


۵۶٪ بیماران دیابتی با اکریت گروه I و II فشار خون بالا داشتند.
($P value = 0.000$)

توزیع فراوانی تتابع تست ورزش بر حسب ABI مختلف (کمتر از $1/1$ - بین $1/1-1/4$ و بیشتر از $1/4$) تمامی بیماران گروه I و III و تعدادی از گروه II بعنوان گروه کنترل جهت تست ورزش معرفی شدند. ولی ۱۲۵ نفر از ۳۲۵ نفر گروه I، ۱۰۷ نفر از ۴۵۶ نفر گروه II و ۴۷ نفر از ۱۶۷ نفر گروه III مراجعه نمودند. از مجموع ۱۲۵ بیمار با $ABI < 1.1$ که تست ورزش شدند ۶۶ بیمار (۵۲/۸٪) تست

غمودار شماره ۱- ارتباط سن بیماران دیابتی و مقادیر

اندکس پایی/ بازویی

■ ۲۲-۴۹ □ ۵۰-۵۹ ■ ۶۰-۸۴



فرابانی اندکس پایی/ بازویی کمتر از $1/1$ و بیشتر از $1/4$ بطور قابل توجیهی در بیماران بالای ۶۰ سال بیشتر می باشد ($P \approx 0.000$)

میانگین ABI در مردان با $9/5$ ٪ اطمینان در محدوده $1/2083-1/2514$ و میانگین ABI در زنان با همین درصد اطمینان در محدوده $1/1489-1/1807$ قرار داشت. تفاوت میانگین بر حسب جنس ربطی به گروه سنی نداشت ($p = 0.305$)


میانگین اندکس پائی بازویی (ABI) بر حسب طول مدت ابتلاء به دیابت

از این لحاظ بیماران به سه گروه تقسیم شدند گروه اول شامل ۲۹۰ نفر مدت ۲-۴ سال، گروه دوم ۲۸۲ نفر که ۵-۹ سال از بیماریشان می گذشت و گروه سوم ۱۰ سال یا بیشتر از زمان تشخیص دیابت در آنها می گذشت. میانگین ABI در این سه گروه به ترتیب $1/194 \pm 0/011$ و $1/188 \pm 0/011$ و $1/2 \pm 0/011$ بود تفاوت میانگین های ABI در میان سه گروه بر حسب مدت ابتلاء به دیابت توسط آنالیز واریانس آزمون گردید که با $P=0.76$ تفاوت معنی دار نگردید.

میانگین اندکس های پائی بازویی بر حسب هیپر تانسیون در جامعه مورد بررسی در میان بیماران تحت بررسی $40/8$ نفر (۷/۴۳٪) دارای فشار خون نرمال بودند که میانگین ABI در آنها $1/25 \pm 0/11$ و $54/0$ نفر دارای فشار خون سیستولیک بالا بودند که میانگین ABI در آنها $1/10 \pm 0/08$

ممکن است بعلت شیوع فشار خون بالای بیشتر در این جمعیت باشد. ۵۵٪ از زنان و ۲۴٪ از مردان فشار خون بالا داشتند ($P\text{-value}=0.00$). ریسک ابتلاء به فشار خون در زنان ۲/۳ برابر بیشتر از مردان است (نودار شماره ۲- فشار خون بالا و جنس در بیماران دیابتی نودار شماره ۲-OR=2.28- CI 1.68<OR<3.10).

نودار شماره ۲- فشار خون بالا و جنس در بیماران دیابتی



فشار خون بالا در بیماران دیابتی در زنان بیشتر مشاهده می گردد ($p=0.002$)

میانگین سنی بیماران در این مطالعه 55.2 ± 10 سال با رنج (۲۲-۸۴) سال بوده و سن بالای ۶۰ سال بطور معنی داری ABI کمتری داشتند (میانگین $\text{ABI} = 0.902 \pm 0.173$).

مطالعات مشابه نیز نتایج مشابهی را نشان داده اند بطوریکه $0.9 < \text{ABI}$ بالای ۷۰ سال 20% در مقابل 5% در گروه $50 < \text{سن} < 60$ سال وجود داشت (۲۱،۳۰). در گروه سنی $50-59$ سال نسبت به گروه سنی $60-69$ سال $1/7$ برابر احتمال (OR = 1.7) وجود داشت $\text{AB I} < 1.1$ $1.09 < \text{OR} < 2.64$.

این میزان در گروه سنی $60-69$ سال نسبت به گروه سنی $49-59$ سال برابر با 3 بود ($OR = 3.00 - CI = 1.98 < \text{OR} < 4.54$). از نظر طول مدت دیابت که در این مطالعه بصورت سه گروه $2-4$ سال، $5-9$ سال و >10 سال

ورزش مثبت و 59 بیمار ($47/2$) تست ورزش منفی داشتند. از مجموع 107 بیمار با $\text{ABI} < 1.1$ که تست ورزش شدند 21 نفر ($19/6$) تست ورزش مثبت و 86 نفر ($80/4$) تست ورزش منفی داشتند. از مجموع 47 بیمار با $\text{ABI} > 1.4$ که تست ورزش شدند 21 نفر ($44/7$) تست ورزش مثبت و 26 نفر ($55/3$) تست ورزش منفی داشتند نتایج تست ورزش با ABI مختلف توسط آزمون chi-square آنالیز آزمون گردید که با $P=0.00$ این تفاوت معنی دار شد. تفاوت نسبت مثبت شدن تست ورزش در دو گروه $\text{ABI} > 1.4$ و $\text{P-Value} > Z\text{-Test}$ آزمون گردید که با 0.05 تفاوت معنی دار نبود (جدول شماره ۲).

جدول شماره ۲- نوزیغ فراوانی نتایج تست ورزش بر اساس مقادیر انداخت

	پائی بازویی									
	ABI	$\text{ABI} < 1.1$	$1.1 < \text{ABI} < 1.4$	$\text{ABI} > 1.4$	NO	%	NO	%	NO	%
Exercise test										
Positive	66	52.8	21	19.6	21	44.7				
Negative	59	47.2	86	80.4	26	55.3				
Total	125	100	107	100	47	100				

در گروه I $19/6$ در گروه II $44/7$ و $7.52/8$ در گروه III تست ورزش مثبت داشتند.


($P\text{ value I}, \text{II} \leq 0.00$, $P\text{ value II}, \text{III} = 0.05$.)

بحث

شیوع PAD در جمعیت های مختلف متفاوت است، بطوریکه در جمعیت >50 سال در یک مطالعه در هلند حدود $16/9$ ٪ (۱۶/۹ در مردان و $20/5$ ٪ در زنان) محاسبه شده است (۲۵). در مطالعه دیگر شیوع PAD با معیار ABI $0.9 < \text{ABI} < 1.1$ در افراد زیر 50 سال 5% و بالای 70 سال 20% گزارش شده است (۲۱). در مطالعه حاضر $1/72$ ٪ به ترتیب دارای $0.9 < \text{ABI} < 1.1$ و $0.9 < \text{ABI} < 1.4$ داشتند که زنان درصد بیشتری را تشکیل می دادند ($P\text{-value} = 0.00$).

با توجه به اینکه اکثر مطالعات PAD را بطور کلی بیشتر در مردان گزارش کرده اند شیوع بیشتر آن در زنان دیابتی

نمودار شماره ۳- نتایج مثبت حقیقی با فواصل ۰/۱



بهترین cutoff point اندکس پانی/بازویی در تعیین تست ورزش مثبت برابر با ۰/۱ می‌باشد، که در این مقدار حساسیت و ویژگی آن به ترتیب ۰/۸۰۵۶ و ۰/۴۹۷۱ و ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی آن به ترتیب ۰/۰۲۹ و ۰/۰۱۹ می‌باشد.

جهت رسیدن به اندکس با حساسیت بیشتر برای تشخیص CAD ما در این مطالعه حساسیت، ویژگی اندکس ABI را با فواصل ۰/۱ و ۰/۰۵ محاسبه نمودیم (جدول شماره ۳).

تقسیم بندی شده بود میانگین ABI در میان سه گروه به

ترتیب مساوی:

۱/۲ ± ۰/۰۱۱، ۱/۱۸۸ ± ۰/۰۱۱، ۱/۱۹۴ ± ۰/۰۱۱

بود. میانگین طول مدت ابتلا در کل جامعه مورد مطالعه ۰/۸۴ ± ۰/۰۱۱ سال بود. تفاوت میانگین ABI در این سه گروه معنی دار نبود. این در حالیست که عامل سن ارتباط غیر مستقیم با ABI داشته و با افزایش سن میانگین ABI بطور معنی داری کاهش می‌یابد ($P < 0.01$). با توجه به این مسئله میتوان دریافت که عامل سن نقش تعیین کننده تری نسبت به طول مدت ابتلا به دیابت در تصمیم گیری برای انجام تست ABI در بیماران دیابتی دارد.

در مطالعات دیگر ≤ 0.9 ABI بعنوان پیشگویی کننده CAD در نظر گرفته شده است (۲۸، ۲۹) ما در این مطالعه مشاهده کردیم که حساسیت و ویژگی اندکس ABI با Cut point کمتر و مساوی ۰/۹ برای تست ورزش مثبت به ترتیب مساوی ۰/۲۵/۹۳، ۰/۸۳/۷۳ و ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی آن به ترتیب ۰/۰۳/۴۲ و ۰/۰۷/۵ می‌باشد (نمودار شماره ۳).

جدول شماره ۳- حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی در تمام مقادیر cutoff Point اندکی پانی/بازویی با فواصل ۰/۱ و ۰/۰۵ در

تعیین بیماریهای عروق کروز (تست ورزش مثبت)

ABI CUTPOINT	TP	FP	FN	TN	حساسیت %	ویژگی %	PPV %	NPV %
۰/۰	۲۲	۲۶	۸۶	۱۴۰	۲۰/۳۷	۸۴/۸	۸۷/۴۵	۶۲/۷۷
۰/۱	۲۳	۲۶	۸۵	۱۴۰	۲۱/۳	۸۴/۸	۴۷/۹۴	۶۳/۰۴
۰/۲	۲۳	۲۶	۸۵	۱۴۰	۲۱/۳	۸۴/۸	۴۷/۹۴	۶۳/۰۴
۰/۳	۲۵	۲۶	۸۳	۱۴۰	۲۲/۱۰	۸۴/۸	۴۹/۰۲	۶۳/۰۶
۰/۴	۲۸	۲۸	۸۰	۱۴۳	۲۵/۹۳	۸۲/۶۳	۵۰	۶۴/۱۳
۰/۵	۳۹	۳۴	۷۹	۱۲۷	۳۷/۱۱	۸۰/۱۲	۵۳/۴۲	۶۷/۵
۰/۶	۵۸	۴۷	۵۰	۱۲۴	۵۳/۷	۷۲/۰۱	۵۰/۲۴	۷۱/۲۶
۰/۷	۶۷	۵۶	۴۱	۱۱۵	۶۲/۰۴	۷۷/۲۰	۵۶/۴۷	۷۳/۷۲
۰/۸	۸۷	۸۶	۲۱	۸۰	۸۰/۰۶	۴۹/۷۱	۵۰/۲۹	۸۰/۱۹
۰/۹	۹۲	۱۲۲	۱۹	۶۹	۸۲/۸۸	۲۸/۷۵	۴۲/۹۹	۷۲/۰۶
۱/۰	۹۷	۱۴۲	۱۱	۲۹	۸۹/۸۱	۱۶/۹۶	۴۰/۰۹	۷۲/۰
۱/۱	۱۰۶	۱۶۵	۲	۷	۹۸/۱۰	۲/۰۱	۳۶/۱۱	۷۰


بهترین cutoff Point اندکس پانی/بازویی در تعیین تست ورزش مثبت برابر با ۰/۱ می‌باشد که در این مقدار حساسیت و ویژگی آن به ترتیب ۰/۸۰۵۶ و ۰/۴۹۷۱ و ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی آن به ترتیب ۰/۰۲۹ و ۰/۰۱۹ می‌باشد.

1.1 (گروه I)، بین ۱/۱ و ۱/۴ (گروه II) و بیشتر و مساوی ABI = 1.4 (گروه III) تقسیم نمودیم. مشاهده شد که ۵۲/۸٪ بیماران گروه I، ۱۹/۶٪ بیماران گروه II (P = 0.00) تست مثبت داشتند.

مشاهده شد که $ABI <= 1.1$ با حساسیت بهتر ۷۸/۰/۶٪ ویژگی قابل قبول ۴۹/۷٪ می باشد. از طرف دیگر ممکن است یک افزایش کاذب در ABI در بیماران دیابتی تیپ II بعلت کلیسیفیکاسیون عروق مشاهده شود که می تواند ABI را پیشاند. به همین جهت بیماران را در سه گروه $ABI <= 1.1$ ، $1.1 < ABI \leq 1.4$ و $ABI > 1.4$ تقسیم نمودیم. مشاهده شد که ۵۲/۸٪ بیماران گروه I، ۱۹/۶٪ بیماران گروه II (P = 0.00) تست مثبت داشتند.

غودار شماره ۴- غودار Roc برای اندکس پایی / بازویی در تشخیص بیماری های ایسکمیک قلب در بیماران دیابتی

SENSITIVIT:1 - SPECIFICITY



Cut off point 4: ABI= 1.1

ما مشاهده کردیم $ABI <= 1.1$ یک Cut point خوب جهت تعیین بیماری های عروق کرونر در بیماران دیابتی می باشد. از طرف دیگر در این مطالعه دو گروه با $ABI > 1.4$ تعداد قابل توجهی تست ورزش مثبت داشتند و می توان $ABI > 1.4$ را نیز Cut point مناسبی جهت تشخیص CAD در بیماران دیابتی در نظر گرفت.

نمودار شماره ۴ نشان می دهد که $ABI <= 1.1$ یک ABI تست تشخیصی خوب جهت تعیین CAD در بیماران دیابتی است. (Roc curve). در این مطالعه بیماران با $ABI > 1.4$ نیز تست ورزش شدند که ۴۴/۷٪ آنها در مقایسه با ۱۹/۶٪ گروه II تست ورزش مثبت داشتند (P = 0.05) (نمودار شماره ۵).

در نتیجه فشار خون می تواند بعنوان یک عامل خطر برای PAD (۲/۵ برابر) و همچنین بیماری عروق کرونر (۲ برابر) مطرح باشد. مطالعات دیگر نیز این مسئله را تأثیر کردند. Fabitz RR و همکارانش نشان دادند که فشار خون بالا ارتباط مستقیم و قوی با PAD دارد (۲۲). همچنین Haffnersm که دارای فشار خون بالا می باشند همگی به بیماری جدی قلبی - عروقی مبتلا می باشند (۲).


نتیجه‌گیری

حدود ۱۰٪ بیماران دیابتی دچار PAD میباشند و به طور همزمان ۳۸٪ دارای تست ورزش مثبت هستند، در نتیجه بیماران دیابتی در ریسک بالای آترواسکلروز متشر می باشند. همچنین اندکس پانی - بازوئی که به عنوان یک معیار حساس و اختصاصی، ارزان و بدون عارضه جهت تشخیص آترواسکلروز متشر (عروق محیطی، درگیری کرونر و کاروتید) شناخته شده است و در بیماران دیابتی خصوصاً بیمارانی که همزمان مبتلا به هیپرتانسیون هستند به عنوان یک تست پیشگوئی کننده آترواسکلروز کرونر می باشد. این مسئله خصوصاً در افراد > ۶۰ سال باید مد نظر باشد. در این مطالعه مقادیر اندکس پانی / بازوئی $1.1 \leqslant$ و < 1.4 بعنوان point مناسب جهت تعیین CAD در بیماران دیابتی شناخته شد که: معیارهای خوبی برای تصمیم گیری جهت انجام کارهای تشخیصی بیشتر در زمینه تشخیص بیماری عروق کرونر در بیماران دیابتی می باشند، و از این طریق میتوان موارد بیشتری از CHD را در این بیماران به این وسیله بیماریابی نمود.

پیشنهادات

با توجه به اینکه مهمترین عامل مرگ و میر در بیماران دیابتی مشکلات قلبی - عروقی است (۳۰٪ موارد در بیماران دیابتی به صورت Silent میباشد) اندکس پانی بازوئی با حساسیت بالا و ویژگی قابل قبول و سادگی آن به عنوان یک تست غریب‌الگری در بیماران دیابتی که ۲ سال از تشخیص آنها

غودار شماره ۵- نتایج تست ورزش براساس اندکس ABI



توزیع فراوانی درصد مثبت شدن تست ورزش براساس اندکس پانی / بازوئی

($P \approx 0.00$ in $ABI \leqslant 1.1$ and $1.1 < ABI < 1.4$)

($P \approx 0.05$ in $ABI \geqslant 1.4$ and $1.1 < ABI < 1.4$)

مطالعه حاضر ارتباط معنی دار فشار خون با بیماری عروق کرونر و عروق محیطی را در بیماران دیابتی نشان می دهد. بطوریکه احتمال مثبت شدن تست ورزش در بیماران دیابتی مبتلا به فشار خون در گروه I ($ABI \leqslant 1.1$) حدود ۲ برابر افراد نرموتنسیو (با فشار خون نرمال) است (OR = 2.06 - CI = 0.84 - 5.12)

در ضمن احتمال ابتلا به ^۱PAD با معیار $0.9 < ABI$ در بیماران هیپرتانسیو نسبت به بیماران نرموتنسیو حدود ۲/۵ برابر است با (Odd ratio = 2.66 - CI = 1.97 - 3.56) (۷۷/۲٪ نفر) از افراد گروه I ($ABI \leqslant 1.1$) و ۷/۴٪ افراد گروه II ($1.4 < ABI < 1.1$) ($P = 0.00$) افراد گروه III ($ABI \geqslant 1.4$) هیپرتانسیو بودند ($P = 0.02$). احتمال مثبت شدن تست ورزش در گروه I و III در افراد هیپرتانسیو و نرموتنسیو بیشتر از گروه II است. $P = 0.003$. در نرموتنسیو و $P = 0.001$ در هیپرتانسیو و این نشان دهنده این مطلب است که فشار خون و ABI بطور مستقل از هم با CAD در ارتباط است.

¹ Peripheral arterial disease

این تست با فواصل معینی جهت تشخیص زودرس آترواسکلروز کرونر در بیماران دیابتی استفاده نمود.

تقدیر و تشکر:

در نهایت با تشکر از خانم فاطمه فروزانی، خانم رفیه آتشکوه و خانم صدیقه باقری به جهت ورود اطلاعات به کامپیوتر و تابع مقاله و با سپاس از خانم دهقان و خانم مریم باتو رنجبر به خاطر انجام تست ABI و تقدیر از بیمارانمان به خاطر همکاری خوبشان سلامت، موقتیت و پیروزی آنها را آرزومندیم.

می‌گذرد در تشخیص زودرس آترواسکلروز متشر در آنها استفاده کرد.

ریسک فاکتورهای سن (سن بالای ۶۰ سال)، جنس (جنس زن) و فشار خون بالا میتواند در انتخاب افراد دیابتی جهت انجام این تست تعیین کننده باشد.

طالعات بیشتری لازم است تا بهترین فاصله زمانی بین انجام تستهای متوالی ABI را در بیماران بررسی نماید تا از

منابع

8. Jarrett RJ, Fowkes FGR , Ed. Berlin ; Diabetes mellitus. In Epidemiology of Peripheral Vascular Disease. Springer- Verlage, 1991; 187-193.

9. Nilsson SV , Nilsson JE , Frostber N , Emilsson T : The Kristianstad survey II. Studies in a representative adult diabetic population with special reference to comparison with an adequate control group. *Acta Med Scand* 1967; Supp 1469: 1-42.

10. Kannel WB , McGee DL: Diabetes and cardiovascular disease. *JAMA* 1979; 241: 2035-2038.

11. Bell DSH : Reviewin depth : diabetes mellitus and coronary artery disease.
J Cardiovasc Risk 1997 ; 4 : 83 – 90

12. Uusitupa MIJ, Niskanen LK, Siitonen O et al: 5-year incidence of atherosclerotic vascular disease in relation to general risk factors , insulin level , and abnormalities in lipoprotein composition in non-insulin dependent diabetic and nondiabetic subjects. *Circulation* 1990; 82: 27-36.

13. Paisey RB, Arredondo G, Villalobos A, Lozano O, Guevara L,Kelly S: Association of differing dietary, metabolic and clinical risk factors with macrovascular complications of diabetes : a prevalence study of 503 Mexican type II diabetic subjects. *Diabetes Care* 1984; 7: 421 – 427.

14. Mehler PS , Jeffers WJ , Estacio R , Schrier RW : Associations of hypertension and complications in non - insulin - dependent

1. Davidsone MB, Diabetes Mellitus Diagnosis and treatment. Philadelphia.Saunders Company , 4th ed. 1998 ; pages: 1- 15.

2. Haffner SM, Prevention of cardiovascular disease in diabetes. Presented at the 60 th Scientific Sessions of American Diabetes Association, 2000 ; June 11; San Antonio , texas.

3. Howell MA, Colgan MP , Seeger RW , Ramsey DE , Sumner DS. Relationship of severity of lower limb peripheral vascular disease to mortality and morbidity: a six-year follow-up study. *J Vasc Surg* 1989 May; 9 (5): 691-6; discussion 696– 7.

4. Whitehose Station. Peripheral vascular diseases. NJ USA. 1995 – 2000; Merk & Co. Inc.

5. Federman DG, Trent JT, Froelich CW, Demirovic, Kirsner RS: Epidemiology of peripheral vascular disease : a predictor of systemic vascular disease. *Ostomy Wound Manage* 1998 ; 44 (5) : 58 – 62.

6. Kannel WB, McGee DE, Diabetes and glucose tolerance as risk factors for cardiovascular disease: the Framingham study. *Diabetes Care* 1979 ; 2: 120 – 6.

7. Savage PJ. Treatment of diabetes mellitus to reduce its chronic cardiovascular complications. *Cun Opin Cardiol* 199; 13: 131– 8.

- Strong Heart Study. Am J Epidemiol. 1999 Feb 15; 149 (4). p 330-8.
24. Bird CG, Criqui MH, Fronkek A, et al: Quantitative and qualitative progression of peripheral arterial disease by non - invasive testing. Vasc Med 1999; 4 (1): 15-21.
25. Vogt MT , McKenna M, Anderson SJ, et al. The relationship between ankle – arm index and mortality in older men and women. Am Geriatr Soc 1993;41:523-30.
26. Michael R.Jaff, DO, Anthony J. Comerota, MD, 73rd Scientific Sessions of the American Heart Association New Orleans , Louisiana.Periphery TM is published by Adelphi Inc. ISSN # 1529-9481. New York , NY 1003.Copyright 2000 by Adelphi Inc .page: 16-20.
27. FG Fowkes, E Housley, RA Riemersma et al. Smoking , lipids , glucose intolerance , and blood pressure as risk factors for peripheral atherosclerosis compared with ischemic heart disease in the Edinburgh Artery Study. American Journal of Epidemiology , 1992; 135 , 4331-340
28. Papamichael CM, Lekakis JP, Stamatopoulos KS, et al. Ankle-brachial index as a predictor of the extent of coronary atherosclerosis and cardiovascular events in patients with coronary artery disease. Am J Cardiol 2000 Sep 15;86(6):615 8.
29. Zheng ZJ, Sharrett AR, Chambless LE, Rosamond WD, Nieto FJ, Sheps DS, et al. Associations of ankle-brachial index with clinical coronary heart disease , stroke and preclinical carotid and popliteal atherosclerosis: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)Study. Atherosclerosis 1997 May;131(1):115-25.
30. J David grub; Kamal Masaki; Beatriz Let al. Peripheral Arterial and Cardiovascular Risk Factors in the elderly. Atherosclerosis and Vascular Biology. 1996; 16: 1495-1500.
- diabetes mellitus. Am J Hyper 1997; 10: 152-161.
15. Al Zahrani AH, Al Bar HMS, Bahnassi A, Abdulaal AA: The distribution of peripheral arterial disease in a defined population of elderly high-risk Saudi patients . Int. Angiol 1997; 16 : 123-128.
16. Kreines K , Johnson E , Albrink M et al : The course of peripheral vascular disease in non – insulin – dependent diabetes Care 1985 ; 8 : 235 – 243.
17. Andrew S , Mac G , Jacqueline F : Role of systolic blood pressure and plasma triglyceride in diabetic peripheral arterial disease. Diabetes Care 1999 ; March .
18. Walters DE Gatling W, Mullee MA , Hill RD: The prevalence , detection and epidemiological correlates of peripheral vascular disease: a comparison of diabetic and non – diabetic subjects in an English community Diabet Med 1992; 9: 710 – 715.
19. Maser RE, Wolfson SK , Ellis D et al: Cardiovascular disease and arterial calcification in insulin-dependent diabetes mellitus: interrelation and risk factor profiles. Arterioscler Thromb 1991 ; 11 : 958 – 965 .
20. Birkmeyer JD , Quinton HB , Q'Connor NJ , et al , for the Northern New England Cardiovascular Disease Study group. The effect of peripheral vascular on long – term mortality after coronary artery bypass surgery. Arch sury 1996; 131 (3): 316-21.
21. Verhaeghe R: Epidemiology and prognosis of peripheral obliterative arteriopathy. Drugs 1998; 56: 1-10.
22. Tseng CH, Chong CK, Lin BJ, Chen CJ, Tai TY: Atherosclerotic risk factors for peripheral vascular disease in non-insulin-dependent diabetic patients. J Formos Med Assoc 1994; 93(8): 663 – 7.
23. Fabsitz, RR, Sidaway AN, Go O, Lee ET et al: prevalence of peripheral arterial disease and associated risk factors in American Indian : the