

تأثیر انحراف تیغه بینی بر روی فشار گوش میانی

(بیمارستان امیراعلم، ۱۳۷۸-۷۹)

دکتر مسعود متصلی زرندي (استاديار)*، دکتر مهرداد اميرآبادي (فلوشيب اتولوزي و نورولوزي)**، دکتر نسرین بزدانی (دستيار)*، دکتر مجتبی محمدی اردهالی (استاديار)* دکتر زهرا ترکاشوند
* گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: فضای گوش میانی توسط مجرای شبپور استاش با فضای نازوفارنکس ارتباط پیدا می‌کند. انسداد راه تنفسی فوقانی به هر دلیل ممکن است عملکرد شبپور استاش را مختلف سازد. انحراف تیغه بینی یکی از علل شایع انسداد راه تنفسی فوقانی است که می‌تواند بر روی عملکرد تهويه‌ای شبپور استاش تأثير بگذارد.

مواد و روشها: اين مطالعه از تابستان سال ۱۳۷۸ تا پيان بهار سال ۱۳۷۹ بر روی بيماران مبتلا به انسداد كامل يکطرفه بینی که به دليل انحراف شدید تیغه بینی در بيمارستان امیراعلم تحت عمل جراحی سپتوپلاستي قرار گرفتند انجام گردیده است. يافته‌ها: تعداد کل بيماران ۱۴۰ نفر بوده که از آن ميان ۳۴ نفر مونث (۲۴٪) و ۱۰۶ نفر مذکر (۷۵٪)، با ميانگين سنی ۲۲/۷ سال و ميانه سنی (mean) ۱۸ سال و نماي سنی (median) ۲۰ سال بوده‌اند. طيف سنی بيماران ۱۲ تا ۴۰ سال بوده است.

نتيجه گيري و توصيه ها: مقايسه ميانگين فشار گوش میانی قبل و بعد از عمل جراحی سپتوپلاستي در اين تعداد بيماران نشان مي‌دهد که ميانگين فوق تفاوت آشکار و قابل توجهی را از لحاظ آماری نشان نمي‌دهد ($P=0.798$).

آناتوميك یا فيزيولوژيك شبپور استاش اثبات شده است، هر فرآيندي که در باز شدن طبيعی انتهای پروکزيمال (نازوفارنزیال) شبپور استاش یا مکانيزم‌های پاک‌کنندگی موکوسیلیاري اختلال ايجاد نماید می‌تواند منجر به بروز فشار منفي در گوش میانی شود. تورم ناحيه حلق و التهاب ناشی از انکار است. ارتباط بعضی بيماريهای گوش میانی با تغييرات

مقدمه

نقش اساسی شبپور استاش در بوجود آوردن فضای گوش میانی طبيعی و سالم با تهويه و فشار هوای مناسب غير قابل انکار است. ارتباط بعضی بيماريهای گوش میانی با تغييرات

مواد و روش‌ها

این مطالعه برروی ۱۴۰ بیمار مبتلا به انحراف شدید تیغه بینی که بواسطه آن دچار گرفتگی شدید و علامت دار بینی شده بودند انجام گرفته است. میزان انحراف بینی در تمامی این بیماران شدید و همسراه با انسداد کامل یکطرفه بینی بود. آن دسته از بیمارانی که مبتلا به درجات خفیفتر انحراف تیغه بینی بودند در مطالعه شرکت داده نشده‌اند. نوع مطالعه آینده‌نگر و زمان آن از تابستان سال ۱۳۷۸ تا پایان بهار سال ۱۳۷۹ و مکان آن بیمارستان امیراعلم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است.

متغیر مستقل انحراف شدید تیغه بینی در حدی که انسداد کامل یکطرفه ایجاد کرده باشد و متغیر وابسته فشار منی گوش میانی و متغیرهای زمینه‌ای سن و جنس بوده است در این مطالعه، بیماران مبتلا به گرفتگی بینی ناشی از دلائل همراه دیگر مانند بزرگی لوزه سوم، انواع رایبیت‌ها، تورم کرنه‌ها، پولیپ بینی و مانند آن، همچنین بیمارانی که سیگاری بوده و کسانی که همزمان تحت عمل جراحی زیبایی بینی قرار می‌گرفتند و کسانی که مشکلات و بیماری‌های پیشرفتی گوش داشتند از مطالعه حذف گردیدند.

طیف سنی بیماران از ۱۲ تا ۴۰ سال بود که ۷۵/۷٪ مذکور و ۲۴/۳٪ موئنث بوده‌اند.

جهت بررسی فشار هوای گوش میانی، از دستگاه تمپانومتری استفاده گردید که فشار هوای فوق را قبل از انجام عمل سپتوپلاستی و سه ماه بعداز آن پس از بهبودی علامت گرفتگی بینی اندازه گرفته با یکدیگر مقایسه کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه spss تحت windows انجام گرفته و برای مقایسه آماری میانگین فشارهای قبل و بعد از عمل جراحی سپتوپلاستی از برنامه T test استفاده شده است.

عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی و آرژی می‌توانند هم بر روی حرکات موکوسیلیاری و هم بازشدن طبیعی شیبوراستاش اختلال ایجاد نمایند (۱، ۲). مشکلاتی که در دستگاه تنفسی فوقانی ایجاد می‌شود می‌تواند برروی شرایط نازوفارنکس و در نتیجه شیبور استاش اثر گذارده در بروز فشار هوای منفی در گوش میانی نقش ایفا کند (۳) یکی از این مشکلات که نسبتاً نیز شایع است انحراف تیغه بینی (Nasal septal deviation) می‌باشد. (۴) نقش درمان جراحی در این حالت و سایر مشکلات دستگاه تنفسی فوقانی، بر روی فشار گوش میانی هنوز مورد سوال است (۳). در حضور انحراف تیغه بینی چنانچه عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (URI) رخ دهد، بدنبال عطسه، عمل بلع یا پاک کردن بینی، ممکن است اختلاف فشاری میان فضای نازوفارنکس و گوش میانی بوجود آمده، باکتریهای موجود در نازوفارنکس با نیروی مکش زیادی از طریق شیبور استاش وارد گوش میانی شده سبب بروز مشکلات بعدی و بیماریهای گوش میانی گردد (۴).

یکی از وظایف اساسی شیبور استاش متعادل ساختن فشار هوای مابین بینی (فشار اتمسفریک) و گوش میانی است (۴). از آنجاییکه انحراف تیغه بینی (NSD) منجر به انسداد راه تنفسی فوقانی می‌شود می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای عملکرد لوله استاش را مختل نماید.

با توجه به نکات بالا به نظر می‌رسد که انحراف تیغه بینی و فشار هوای گوش میانی ارتباطی غیر مستقیم با یکدیگر داشته باشد.

در این مطالعه برآن شدیم که در بیمارانی که به دلیل انحراف شدید تیغه بینی همراه با انسداد کامل یکطرفه بینی ناشی از آن تحت عمل جراحی سپتوپلاستی قرار می‌گیرند مشخص نمانیم که انجام این عمل چه تأثیری بر فشار گوش میانی می‌گذارد تا پاسخی برای سؤالی که چندین ده مورد بحث و اختلاف نظر بوده است را بیاییم و بتوانیم در مورد انجام این عمل جراحی قبل از انجام آن دسته از اعمال جراحی گوش میانی که برای حصول نتایج بهتر نیازمند تهیه مناسب گوش میانی می‌باشند تصمیم‌گیری کنیم. در این مطالعه جهت اندازه‌گیری فشار گوش میانی از دستگاه تمپانومتری استفاده گردید.

فشار قبل از عمل جراحی (P_B) حداکثر +۵۵ و حداقل -۳۸ میلی متر آب.

فشار بعد از عمل جراحی (P_A) حداکثر +۱۰۰ و حداقل -۳۹ میلی متر آب.

میانگین فشارهای قبل از عمل (P_{mB}) -۳۷/۰/۷ میلی متر آب و میانگین فشارهای پس از عمل (P_{mA}) -۳۴/۴/۳ میلی متر آب. مقایسه میانگین فشار قبل و بعداز عمل جراحی که با T انجام گردیده است. در شکل زیر نمایش داده شده است.

یافته‌ها

یافته‌های پژوهشی در مورد متغیرهای زمینه‌ای بدنی شرح بوده‌اند:

میانگین سنی (mean) ۲۲/۷۴ سال، میانه سنی (median) ۲۰ سال و نمای سنی (mode) ۱۸ سال، حداقل سن بیماران ۱۲ سال و حداکثر آن ۴۰ سال. از لحاظ توضیع جنس، ۲۴/۳٪ بیماران (۳۴ بیمار) مومن و ۷۵/۷٪ (۱۰۶ بیمار) مذکور بوده‌اند. نتایج بدست آمده در مورد متغیرهای وابسته فشار گوش میانی نیز بدنی ترتیب بوده است.

Paired Samples Test

Pair I P_B-P_A	Paired differences					t -۷۲۵۷	df ۷۹	Sig (2-tailed) ۰/۷۹۸			
	Mean -۲/۷۴	s.Dev ۸۵/۹۴	s.Dev Error ۱۰/۲۸	95% Confidence Interval of the Diff							
				Lower -۲۳/۱۰	Upper ۱۷/۸۶						

طرح می‌شود آن است که انتی‌های ناشی از وجود فشار منفی در گوش میانی در سینین زیر یکسال و بالای ده سال شیوع کمتری دارد. از آنجا که تشدید مشکلات فرق بدنی انحراف تیغه بینی با بالا رفتن سن و رشد کودک آشکارتر می‌شود ارتباط واضحی میان فشار منفی گوش میانی و سن بروز انحراف تیغه بینی وجود ندارد، علاوه بر این با توجه به تغیرات احتمالی شکل بینی بدنی عمل جراحی تیغه بینی اکثر جراحان ترجیح می‌دهند عمل سپتوبلاستی را پس از رشد کامل بیمار (دخترها در حدود سن ۱۶ و پسرها حدود سن ۱۸ سالگی) انجام دهند که این خود فاکتور مهمی در تعبیر شیوع سنی بدست آمده می‌باشد.

در مورد انجام عمل جراحی بینی منجمله اصلاح تیغه بینی به عنوان درمان پیش‌نیاز برای برطرف ساختن مشکلات فشار منفی گوش میانی هنوز بحث و جدل زیاد است.

بحث

در این مطالعه برتری واضح جنس مذکور (۷۵/۷٪) در مقابل جنس مومن (۲۴/۳٪) دیده می‌شود. در سایر مطالعات مشابه برتری نسبی جنس مذکور نسبت به جنس مومن در ارتباط با وجود فشار منفی در گوش میانی دیده نشده است (۵). با توجه به اینکه تفاوت آشکاری از لحاظ آناتومی و فیزیولوژی میان دو جنس در ساختمان بینی و شیپور استاشن عنوان نشده است، به نظر می‌رسد علمت این تفاوت، بیشتر به خاطر مراجعته کمتر خانمه‌ها جهت انجام عمل جراحی بدليل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد.

از لحاظ شیوع سنی هنوز اثر سن بر روی فشار منفی در گوش میانی کاملاً مشخص نشده است (۵) اما آنچه که بیشتر

است اما در جراحی مجدد مخاط در ناحیه فوق کاملاً به حالت عادی برگشته بوده است بنابراین گروه مذکور، خود عمل جراحی بر روی گوش میانی را به تنهائی بهترین روش درمانی در برطرف نمودن عفونت و پاکیزه نمودن گوش در گوش‌های مبتلا به انسداد شیپور استاش دانسته‌اند (۸).

در این مطالعه با این تعداد بیمار، با انجام آزمون T مشخص گردید که در مقایسه، میان میانگین فشارهای هوای گوش میانی قبل و بعد از عمل جراحی سپتوپلاستی در بیماران دیده نمی‌شود ($P=0.798$) لذا به نظر نمی‌رسد که انجام این عمل جراحی در کل بر روی فشار منفی گوش میانی تأثیر مثبت و قابل توجهی داشته باشد بنابراین انجام آن قبل از اعمال جراحی گوش ضروری ندارد.

بعضی‌ها اعتقاد دارند که انجام اینگونه اعمال جراحی سبب کاهش تأثیرات سوء مشکلات بینی بر روی گوش خواهد شد (۶) در حالی که بعضی نیز اعتقاد دارند وجود عدم کارکرد صحیح شیپور استاش منعی جهت انجام اعمال جراحی گوش میانی خصوصاً تمپانوپلاستی نمی‌باشد لذا قبل از انجام اعمال جراحی گوش میانی حتی انجام تست‌های بررسی کارکرد شیپور استاش را نیز ضروری نمی‌دانند (۷).

اگرچه همین‌ها معتقدند که برقرارسازی تهويه خوب گوش میانی شناس و موققیت عمل جراحی گوش را بالا می‌برد. شاید یکی از دلائل این نظریه این باشد که بعضی جراحان گزارش نموده‌اند که بدنبال اعمال جراحی مجدد گوش (به دلائلی غیر از دلیل اولیه جراحی گوش مبتلا) متوجه شده‌اند که اگرچه در جراحی بار اول مخاط در ناحیه پروتمپان و اطراف شیپور استاش دچار التهاب شدید بوده تست‌های عملکردی شیپور استاش نیز نشانگر عدم کارکرد آن به شمار می‌آمده

منابع

1. Gungor A, Corey JP. Relationship between OME and allergy. Curr Opin. Otol H and N surg 1997; 5: 46-48.
2. Bernstein JM. Role of allergy in E.T blockage and OME: a review. Otol H and N Surg 1996; 114: 562-568.
3. Canalis RF, Lambert PR. The ear. Comprehensive otology, Lippincott Williams and Wilkins 2000; P: 392.
4. Brackman Shelton Arriaga. Otologic surgery 2nd et. WB Saunders Company 2001 P: 70.
5. Canalis RF, Lambert PR. The ear comprehensive otology. Lippincott Williams and Wilkins 2000; P: 385.
6. Wigand ME. Restutitional surgery of the ear and temporal bone. Thieme 2001; P: 132.
7. Sheehy JL. Testing E. T function. Ann Otol, Laryngol 1981; 90: 562-564.
8. Brackman, Shelton, Arriaga. Otologic surgery 2nd ed, WB Saunders 2001; P: 96.