

عوامل مؤثر بر علل جراحی مجدد دریچه‌های مصنوعی قلب و بقاء زودرس بعد عمل

بیمارستان امام (۱۳۷۰-۸۰)

دکتر علی کاظمی خالدی*

دکتر رضا رحمانی**
عضو هیأت علمی گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران

** عضو هیأت علمی گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

مقدمه: عمل مجدد دریچه‌های مصنوعی قلب با عوارض بیشتری نسبت به عمل اول همراه است. با شناخت عوامل مؤثر بر علل عمل مجدد و بقاء زودرس بعد عمل، می‌توان دریچه مصنوعی مناسب را هنگام تعویض دریچه انتخاب کرد و با انجام عمل جراحی در زمان مناسب، میزان خطر اعمال جراحی مجدد را کاهش داد.

مواد و روشها: ۲۰۰ بیمار که از مهر ۱۳۷۰ تا آبان ۱۳۸۰ تحت عمل جراحی دریچه مصنوعی قرار گرفته بودند وارد مطالعه شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: ۶۸ نفر از بیماران مرد و ۱۳۲ نفر زن و میانگین سنی بیماران $۴۲ \pm ۱۱/۸$ سال بود. شایع‌ترین علت تعویض دریچه‌های بیولوژیک نارسایی ساختمانی دریچه بدبست آمد (۹۳ درصد). ترومبوز علت شایع عمل جراحی دریچه مکانیکی بود (۲۲ درصد). سن کمتر از ۵۰ سال ($P=0/01$)، زمان بعد عمل اول بیشتر از ۱۰ سال ($P=0/05$) روی نارسایی ساختمانی دریچه بیولوژیک مؤثر بودند. سن بالا بویژه بیشتر از ۴۰ سال ($P<0/05$)، موقعیت میترال (۰/۰۱) و فیریلاسیون دهلیزی ($P<0/01$) روی ترومبوز دریچه مکانیکی اثر داشت. زمان بیشتر کلامپ آنورت ($P=0/005$)، نارسایی دریچه سه لختی ($P=0/001$), NYHA class IV ($P=0/005$) و عمل اورژانس ($P=0/001$) شاخص‌های مستقل مرگ و میر بیمارستانی بودند.

نتیجه گیری و توصیه ها: در نتیجه، در بیماران با طول عمر قابل انتظار بیشتر از ۱۰ سال و سن کمتر از ۵۰ سال می‌توان دریچه مکانیکی را در هنگام تعویض دریچه طبیعی انتخاب کرد. با انجام به موقع عمل جراحی قبل از رسیدن بیمار به یک وضعیت بحرانی بقاء بعد عمل ایده‌آل خواهد بود.

عوارض وابسته به دریچه بروز خواهد کرد و بیمار نیاز به عمل مجدد خواهد داشت. جراحی مجدد دریچه مصنوعی با خطرات بیشتری نسبت به جراحی دریچه طبیعی همراه است. هدف از این مطالعه این است که شاخص‌های مؤثر بر علل اعمال جراحی دریچه‌های مصنوعی و مرگ و میر بیمارستانی این اعمال بررسی

مقدمه

هیچیک از دریچه‌های مصنوعی قلب تمام ملاک‌های لازم برای یک دریچه ایده‌آل را دارا نیستند. با گذشت زمان بعضی

یافته ها

از بیماران مورد مطالعه، ۶۸ بیمار مرد و ۱۳۲ نفر زن بودند. دامنه سنی بیماران ۱۵ تا ۷۰ سال، میانگین سنی $42 \pm 11/8$ سال بود.

۱۶۹ مورد عمل جراحی میترال، ۲۹ مورد دریچه آنورت و ۲ مورد تریکوسپید انجام شده بود. در ۲ مورد پیوند عروق کرونر، در ۴۶ مورد تعویض دریچه طبیعی دیگر و در ۲ مورد پیوند کرونر و تعویض دریچه طبیعی بطور همزمان صورت پذیرفته بود.

جدول شماره ۱ - آنالیز تک متغیره دُزنسانس دریچه بیولوژیک

P-value	تعداد	درصد	متغیر
	دُزنسانس		
	فاصله بین دو عمل (سال):		
P<0.001	۵۸/۳	۱۲	≤۵
	۹۴/۳	۳۵	۶-۱۰
	۹۸	۵۲	۱۱-۱۵
	۱۰۰	۲۴	>۱۵
	سن اولین تعویض دریچه:		
P<0.005	۹۰	۶۳	≤۳۰
	۱۰۰	۳۰	۳۱-۴۰
	۱۰۰	۲۰	۴۱-۵۰
	۶۰	۱۰	>۵۰
	جنسیت:		
P=0.006	۸۱	۳۵	مرد
	۹۷	۸۸	زن
	صرف وارفارین:		
P=0.1	۹۲/۹	۷۱	ثبت
	۱۰۰	۵۲	منفی
	بیماری نارسایی کلیه:		
P=1	۱۰۰	۲	ثبت
	۹۵	۱۲۱	منفی
	موقعیت دریچه:		
P=1	۹۲/۲	۱۱۷	میترال
	۱۰۰	۷	آنورت

علت عمل در ۱۱۷ مورد (۵۸/۵ درصد) نارسایی ساختمانی دریچه، در ۲۲ مورد آندوکاردیت (۱۱ درصد)، در ۲۶ مورد نشت (۱۳ درصد) و در ۹ مورد تشکیل پانوس (۴/۵ درصد) بود. ۱۲۵

شوند. چنین اطلاعاتی در انتخاب صحیح نوع دریچه مصنوعی در عمل تعویض دریچه طبیعی و درمان به موقع عوارض وابسته به دریچه مصنوعی کمک کننده خواهد بود. بدین ترتیب میزان بروز عوارض وابسته به دریچه و مرگ و میر جراحی دریچه های مصنوعی معیوب کاهش می یابد.

مواد و روشها

انتخاب بیماران:

طی سالهای مهر ۱۳۷۰ لغایت آبان ۱۳۸۰ تعداد ۲۰۰ بیمار که در بیمارستان امام (ره) تهران تحت عمل جراحی دریچه مصنوعی قرار گرفته بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند.

آنالیز اطلاعات:

برای مشخص کردن شاخص های مؤثر بر علل عمل جراحی مجدد دریچه های مصنوعی ۱۱ متغیر مورد آزمایش قرار گرفت: فاصله زمانی بین عمل اول و مجدد، نوع دریچه، موقعیت دریچه، سن بیمار در عمل اول و مجدد، جنس، مصرف وارفارین، Pt، نارسایی کلیوی ($\text{Cr} > 1.5 \text{ mg/dl}$), فیبریلاسیون دهلیزی، بروز ده بطن چپ (LVEF).

برای تعیین شاخص های مؤثر بر مرگ و میر بیمارستانی ۱۳ متغیر آزمایش شدند: سن و جنس بیمار، LVEF، زمان کلامپ آنورت، وزن بیمار، نارسایی تریکوسپید (TR)، نیاز به انجام عمل اورژانس، NYHA class قبل از عمل، علت عمل، مرتبه عمل، موقعیت و نوع دریچه و نوع عمل همراه. اطلاعات بالینی از پروندهای بیمارستانی اخذ شد. مرگ و میر و عوارض بر اساس راهنمای گزارش عوارض و مرگ و میر بعد جراحی دریچه های قلب تعریف شد (۱).

آنالیز آماری:

داده ها بصورت درصد فراوانی نسبی و میانگین بیان شد، مقایسه متغیرهای طبقه بندی شده با تست کای دو و فیشر و متغیرهای پیوسته با تست غیر زوجی انجام شد. شاخص های خطیری که در آنالیز تک متغیره $P < 0.05$ داشتند وارد آنالیز چند متغیره شدند $P < 0.05$ معنی داری تلقی شد.

جدول شماره ۳ - آنالیز تک متغیره مرگ و میر بیمارستان

P-value	درصد مرگ	تعداد	متغير
			سن (سال):
	۲۷/۸	۱۱	۱۵-۳۰
۰/۰۰۶	۱۹/۰	۱۷	۳۱-۴۰
	۲۶/۲	۱۴	۴۱-۶۰
	۴۲/۹	۶	۶۱-۷۰
			جنس:
۰/۰۱۷	۲۰/۳	۱۴	ذکر
	۲۰/۸	۳۲	مانت
			LVEF
۰/۰۸۸	۳۳/۳	۴	<۵۰
	۳۳/۶	۴۲	≥۵۰
			زمان کلامه:
	۹/۱	۹	≤۱۰
	۲۲/۷	۱۹	۱۱-۲۰
	۶۲/۰	۲۰	>۲۰
			وزن (کیلوگرم):
۰/۰۴۳	۳۳/۳	۱۳	<۵۰
	۲۵/۲	۲۹	۵۰-۶۰
	۱۳	۶	>۶۰
			TR:
۰/۰۰۲	۲۸/۶	۲۴	مثبت
	۱۲/۵	۱۴	منفی
			عمل اورژانس:
۰/۰۰۵	۵۷/۰	۲۹	مثبت
	۱۳/۶	۱۴	منفی
			NYHA class
۰/۰۰۱	۱۴	۱۸	II-III
	۴۴	۲۰	IV
			عمل عمل:
۰/۰۹	۲۱/۳	۲۵	دز نرمانس
	۲۷/۳	۶	آندوکاردیت
	۲۳/۱	۶	تروموبوز
	۲۲/۱	۶	نشست
	۴۴	۴	پانوس
			موقعیت دریچه:
۰/۰۹	۲۶/۲	۱۱	میترال
	۲۴/۱	۷	آنورت
			مرتبه تعویض دریچه:
۰/۰۴	۲۰/۹	۲۵	۱
	۳۹/۱	۹	۲
	۰	۲	۳
	۰	۰	۴
	۱۰۰	۲	۵
			نوع دریچه:
۰/۰۴	۲۱/۲	۲۷	بیولوژیک
	۲۷/۷	۲۱	مکاتب
			عمل همراه:
۰/۰۴	۲۹	۱۲	مثبت
	۲۲/۷	۲۴	منفی

عمل روی دریچه بیولوژیک (۶۲/۵ درصد) و ۷۵ مورد روی دریچه مکانیکی (۳۷/۵ درصد) انجام شده بود. NYHA class قبل از عمل در ۲۰ بیمار II، در ۱۰۸ بیمار III و در ۶۸ بیمار IV بود. ۶۱ بیمار بطرور اورژانس عمل شدند (۳۰/۰ درصد). عمل جراحی دریچه های بیولوژیک عبارتند از: دز نرمانس (۹۳/۶ درصد)، آندوکاردیت (۳/۲ درصد)، ترومبوز (۱/۶ درصد) و نشت (۰/۶ درصد) مطابق جدول شماره ۱ متغیرهای فاصله بین دو عمل، سن بیمار هنگام اولین تعویض دریچه قلب، جنس مؤنث و مصرف وارفارین در آنالیز تک متغیره با دز نرمانس دریچه بیولوژیک رابطه داشت.

با افزایش فاصله بین دو عمل یا به عبارت دیگر طول عمر بیشتر بیمار، بعد عمل اول بویژه بیشتر از ۱۰ سال و یا کمتر بودن سن بیمار هنگام اولین عمل تعویض دریچه مصنوعی بیولوژیک بویژه کمتر از ۵۰ سال، دز نرمانس دریچه شایع تر است.

جدول شماره ۲ - آنالیز تک متغیره ترومبوز دریچه مکانیکی

متغير	تعداد	درصد ترومبوز	P-value
فاصله دو عمل (سال):	۲۷	۳۷	۰/۴۰۰
≤۱	۵۱		
>۱	۳۸	۳۷/۸	
AF			۰/۰۰۰۳
مثبت	۴۳	۵۱/۱	
منفی	۲۲	۷/۳	
من (سال):	۲۸	۱۴/۳	۰/۰۰۰
≤۳۰	۵۱		
>۳۰	۲۰	۲۳/۰	
۳۱-۴۰	۲۰	۶۰	
۴۱-۵۰	۱۰	۴۰	
>۵۰	۱۰		۰/۰۰۵
LVEF			
<۵۰	۷	۰	۰/۱۶۹
≥۵۰	۶۰	۳۷/۹	
نوع دریچه:			
Bi-leaflet	۴۱	۳۴/۱	۰/۳
Tilt-disk	۳۴	۲۳/۰	
موقعیت دریچه:			
میترال	۵۲	۴۷/۲	۰/۰۰۱
آنورت	۲۲	۰	

بويژه بيشتر از ۱۰ سال و سن كمتر بيمار در عمل اول تعبيه دريچه مصنوعى بخصوص كمتر از ۵۰ سال با شيعه بيشتر دئنرسانس دريچه بیولوژیك همراه بود. شایع ترين علت تعويض دريچه مکانيکي ترومبوز دريچه بود که با افزایش سن بيمار بويژه بيشتر از ۴۰ سال شایع تر است. با توجه به نتایج قابل قیاس فوق با مطالعه Hammermeister (۲) انتخاب دريچه مکانيکي در عمل اول تعبيه دريچه مصنوعى برای بيماران جوانتری (كمتر از ۵۰ سال) که طول عمر بيشتری (بيشتر از ۱۰ سال) برایشان متصوریم، منطقی است. ACC/AHA (۳) پیشنهاد می کند که در بيمار با طول عمر قابل انتظار طولانی (کلاس I)، در بيمار كمتر از ۶۵ سال برای تعويض دريچه آنورت و كمتر از ۷۰ سال برای تعويض میترال (کلاس IIa) از دريچه مکانيکي استفاده شود. در اين مطالعه شاخص های مستقلی که همراه با ترومبوز دريچه مکانيکي بودند شامل: سن، AF و موقعیت میترال بود. در بيماران با نسبت Pt بيشتر یا مساوی ۲ ترومبوز دريچه دیده نشد. لذا در گروه های خطر فوق حفظ Pt در نسبت ۲ منطقی است. ACC/AHA (۳) پیشنهاد می کند که در بيماران با ريسک بالاتر ترومبوز (مثل AF و موقعیت میترال) INR در حد ۲/۵ تا ۳/۵ حفظ می شود. در اين مطالعه در آنالیز چند متغیره، زمان کلامپ آنورت، TR، عمل اورژانس و NYHA class شاخص های مستقل مؤثر بر مرگ بيمارستانی بود. نتایج فوق در توافق با مطالعات ديگر بوده است نيز در اين مورد متفاوت بوده است (۴,۵,۶,۷,۸).

در اين مطالعه آندوكارديت دريچه مصنوعى با مرگ بيمارستانی عمل مجدد دريچه رابطه نداشت. نتایج مطالعات قبلی بطور خلاصه با مقایسه نتایج اين مطالعه با مطالعات ديگر (۴,۵,۶,۷,۸,۹) انجام عمل جراحی برای رفع اختلال عملکرد دريچه مصنوعى قبل از بحرانی شدن شرابط بالینی بيمار توصيه می شود. عدم تعويق بی دلیل جراحی در کاهش خطر عمل مجدد مؤثر است.

در آنالیز چند متغیره، سن ($P=0/01$) و فاصله دو عمل ($P=0/01$) شاخص های مستقل مؤثر بر دئنرسانس بودند. عمل جراحی دريچه های مکانيکي به ترتیب ترومبوز (۳۲ درصد)، نشت (۳۲ درصد)، آندوكارديت (۲۴ درصد) و تشکيل پانوس (۱۲ درصد) بود. فيريلاسيون دهليزي، سن و موقعیت میترال در آنالیز تک متغیره (جدول شماره ۲) با ترومبوز دريچه رابطه داشتند.

با ورود متغیرهای AF، سن، LVEF، و موقعیت دريچه در آنالیز چند متغیره، شاخص های مستقل مؤثر بر ترومبوز دريچه عبارت بود از: سن ($P<0/05$), AF ($P<0/01$), LVEF و موقعیت میترال ($P<0/01$) ميانگين نسبت Pt در بيماران با دريچه مکانيکي $1/06 \pm 0/32$ بود. درصد شيعه ترومبوز در نسبت Pt كمتر از $1/05$ و $2-2/5$ به ترتیب $37/4$ و $30/4$ و صفر درصد بود (به دليل عدم ثبت همگانی Pt بر حسب INR، از Pt ratio در آنالیز استفاده شد). مرگ و مير بيمارستانی ۲۴ درصد بود.

متغیرهایی که با مرگ و مير بيمارستانی در آنالیز تک متغیره رابطه داشتند عبارتند از: (جدول ۳): زمان کلامپ آنورت، وزن، وجود TR، اورژانس بودن عمل، NYHA class و مرتبه عمل. با ورود متغیرهای فوق در آنالیز چند متغیره، زمان کلامپ آنورت و درصد شيعه ترومبوز در نسبت Pt ($P<0/01$), اورژانس بودن عمل ($P<0/01$) و NYHA class ($P<0/01$) شاخص های مستقل مؤثر بر مرگ بيمارستانی بود.

بحث

علیرغم پيشرفت های اساسی در نتیجه جراحی های مجدد دريچه های مصنوعی قلب، چنین اعمالی هنوز از چالش های مدواومی در بين جراحان و متخصصین قلب برخوردار است. هدف اين مطالعه که اطلاع از عوامل مؤثر بر علل اختلال عملکرد دريچه های مصنوعی و نتيجه عمل جراحی چنین دريچه هایی است به ما در انتخاب صحيح نوع دريچه در عمل اول، مراقبت از بيمار دارای دريچه مصنوعی و درمان به موقع عوارض وابسته به دريچه کمک خواهد کرد. شایع ترين علت تعويض دريچه های بیولوژیك دئنرسانس دريچه بود. طول عمر بيشتر بعد از عمل اول

منابع

1. Edmunds LH Jr, Clark RE, Cohn LH, et al. Guidelines for reporting morbidity and mortality after cardiac valvular operations. Ann Thorac surg 1996; 62:932-935.
2. Hammermeister K, Sethi GK, Henderson WG, Grover FL, et al. Outcomes 15 years after valve replacement with a mechanical vs bioprosthetic valve: Final report of the VA randomized trial. J Am Coll cardiol. In press, October 2000.
3. Bonow RO, Carabello B, de Leon AC Jr, et al. ACC/AHA guide-lines for the management of patients with valvular heart disease: A report of the American college of Cardiology/American Heart Association Task Force on practical Guidelines (Committee on Management of patients with Valvular Heart Disease). J Am Coll Cardiol 1998; 32: 1486-1588.
4. Husebye DG, Pluth JR, Pieffier JM, et al. Reoperation on prosthetic -heart valves. An analysis of risk factors in 552 patients. J Thorac cardiovasc surg 1983; 86: 543-52.
5. Bosch X, Pomar JL, Pelletier LC. Early and late prognosis after reoperation for prosthetic valve replacement. J Thorac Cardiovasc surg 1984; 88:567-72.
6. Pansini S, Ottino G, Forsennati PG, et al. Reoperations on heart valve prostheses: an analysis of operative risks and late results. Ann Thorac surg 1990; 50:590-6.
7. Pichler JM, Blackstone EM, Bailey KR et al. Reoperation on prosthetic heart valves. Patient-specific estimates of in. hospital events. J Thorac Cardiovasc Surg 1995; 109: 30-48.
8. Kiyofurni Morishita et al. Re-Replacement for prosthetic valve dysfunction Analysis of long term results and risk factors. Arm thorac surg 1998, 65: 696-9.
9. Domini que Delay et al. Immediate and long term results of valve replaument for native and prosthetic valve endocarditis. Ann thorac surg 2000, 70: 1219-23.