

کم خونی میکروسیتیک در کودکان PKU در تهران

دکتر علی کشاورز - دانشیار واحد تغذیه و بیوشیمی - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر جلالی - استادیار واحد تغذیه بیوشیمی - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرانگیز ابراهیمی ممقانی - کارشناس ارشد تغذیه - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Microcytic Anemia in Children with Phenylketonuria in Tehran ABSTRACT

Sixty-nine children with phenylketonuria (PKU) under coverage of Tehran Genetic Research and Consultation Center, fed Lofenalac and Phenylfree were studied. The 24-hour dietary recall method was used to determine food intake and blood samples were analyzed for iron parameters. The results showed that over 7% of the children had a low intake of energy, protein and iron. In addition, hemoglobin and hematocrit were lower than normal in 3.1% of the children, while in 24.2% of them there was decreased serum transferrin saturation percent. There was a statistically significant relationship between length of diet therapy and iron parameters. The findings show that inadequate nutrient intakes may, over time, cause appearance of anemia signs in the children with PKU dependent on special formulations.

چکیده

ایجاد می‌گردد، ولی با تشخیص به موقع و رعایت رژیم غذایی محدود از فنیل آلانین می‌توان از صدمات مغزی آن پیشگیری نمود. درمان رژیمی این بیماری بر اساس محصولات نیمه سنتتیک می‌باشد که گرچه تکامل طبیعی روانی - حرکتی را در بیماران زود درمان شده فراهم می‌نماید، اما در رابطه با عوارض جانبی ناشی از کمبودهای تغذیه‌ای در این افراد گزارش‌هایی ارائه شده است (۱). Hanley و همکارانش (۲) عقب‌ماندگی رشد و کم‌خونی را در نوزادان PKU مشاهده نموده و Alexander (۳) به کمبود آهن و سایر عناصر اشاره کرده است. سایر محققین نیز شواهدی از اختلالات وضعیت آهن، مس، سلنیم و روی را در کودکان PKU ارائه نمودند (۹-۴). منبع اصلی آهن و سایر عناصر در رژیم غذایی کودکان طبیعی را غذاهای پروتئینی تشکیل می‌دهند که این قبیل عناصر در رژیم غذایی کودکان PKU محدود می‌گردد و از طریق فرمولهای سنتتیک حاوی اسیدهای آمینه بجز فنیل آلانین تأمین می‌شود. Agget, Davies (۸) اظهار داشتند که ممکن است دریافت ناکافی این عناصر وجود داشته باشد.

به منظور ارزیابی کم‌خونی میکروسیتیک در کودکان مبتلا به فنیل کتونوری، ۶۹ کودک تحت پوشش مرکز تحقیقات ژنتیک و مشاوره انسانی تهران که از فرمولاهای فنیل فری و لوفنالاک تغذیه می‌شدند مورد مطالعه قرار گرفتند. دریافت غذایی این کودکان در طی ۲۴ ساعت گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت از کلیه کودکان جهت اندازه‌گیریهای بیوشیمیایی و هماتولوژی نمونه خون گرفته شد. نتایج مطالعه کمبود دریافت انرژی، پروتئین و آهن را در بیش از ۷٪ کودکان نشان داد. همچنین ۲/۲۴٪ کودکان مورد مطالعه کاهش درصد اشباع ترانسفرین سرم را نشان دادند در حالیکه کمبود غلظت هموگلوبین و هماتوکریت در ۱/۳٪ کودکان وجود داشت. به علاوه همبستگی معنی‌داری میان طول مدت رژیم درمانی و شاخصهای آهن بدن مشاهده شد. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که عدم کفایت دریافت مواد مغذی ممکن است با گذشت زمان علائم کم‌خونی را در این کودکان که متکی بر فرمولاهای ویژه هستند سبب شود.

مقدمه

بیماری فنیل کتونوری (PKU) از اختلالات متابولیکی مادرزادی است که به دلیل نقص آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز

با توجه به بروز $\frac{1}{8000}$ بیماری فنیل کتونوری در ایران (۱۱-۱۰) و با توجه به محدودیت بررسی‌ها در زمینه وضعیت تغذیه‌ای

کودکان PKU بخصوص از نظر کم خونی ناشی از فقر آهن در جهان و نبود مطالعه‌ای در زمینه وضعیت تغذیه‌ای این کودکان در ایران مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت کم خونی میکروسیتیک در کودکان PKU انجام شد.

روش و مواد

۱- افراد مورد مطالعه

۶۹ کودک مبتلا به PKU با میانگین سنی $29/72 \pm 54/55$ ماه (محدوده سنی ۱-۱۲ سال) شامل ۴۱ دختر ($59/4\%$) و ۲۸ پسر ($40/6\%$) بطور تصادفی از مرکز تحقیقات ژنتیک و مشاوره انسانی تهران که طیف وسیعی از کودکان PKU ایران را تحت پوشش دارد برگزیده شدند. کودکان از گروه‌های مختلف اقتصادی - اجتماعی بوده و حداقل در طی چهار ماه اخیر از مکمل ویتامین و مواد معدنی استفاده نکرده بودند. همچنین افراد مورد مطالعه مبتلا به بیماری‌های مؤثر بر وضعیت آهن نظیر: خونریزیها و بیماری‌های عفونی و انگلی نبودند. کودکان تحت مطالعه حداقل بمدت ۶ ماه با فرمولاهای عاری یا محدود از فنیل آلانین (Phenylfree, Lofenalac) و یا هر دوی این فرمولها تغذیه می شدند و منبع اصلی پروتئین غذایی رژیمشان را تشکیل می داد.

۲- جمع آوری نمونه و اندازه گیریهای بیوشیمیایی

از کلیه افراد تحت مطالعه ۷ میلی لیتر خون وریدی توسط اسکالوین استریل یکبار مصرف عاری از آلودگی فلزی (23 gauge needles) جمع آوری گردید. بلافاصله ۲ میلی لیتر خون تام جهت آزمایش CBC به ویالهای حاوی ماده ضد انعقاد (EDTA) منتقل شده و مخلوط گردید و ۵ میلی لیتر باقیمانده در لوله‌های شیشه‌ای شسته شده با اسید کلریدریک 10% ریخته شده و سرلوله‌ها توسط پارافیلیم مسدود گردید. پس از یک ساعت نگهداری در دمای آزمایشگاه، با دور ۳۰۰۰ در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ گردید و سرم عاری از همولیز توسط پیپت اتوماتیک به لوله‌های شیشه‌ای اسیدواش انتقال یافت و تا زمان آنالیز نمونه‌ها در 18°C - نگهداری شدند. به منظور پیشگیری از آلودگیهای محیطی با آهن کلبه لوازم مورد استفاده با اسید کلریدریک 10% و آب دیونیزه دوبار نظیر شسته شده بود. جهت اندازه گیری آهن و TIBC سرم از کیت Biopharmaco و دستگاه اتوآنالیزر مدل RA-۱۰۰۰ استفاده شد و درصد اشباع ترانسفرین سرم (۱۵) از رابطه $100 \times \frac{\text{Fe}}{\text{TIBC}}$ برآورد گردید. سنجش فاکتورهای هماتولوژیک CBC (هموگلوبین، هماتوکریت، MCH، MCV،

۳- جمع آوری و آنالیز اطلاعات رژیم غذایی:


جهت ارزیابی انرژی و مواد مغذی دریافتی کودکان مورد مطالعه از روش ۲۴ ساعت یاد آمد خوراک (food recall 24 hour) استفاده گردیده و آنالیز انرژی و مواد مغذی رژیم غذایی با استفاده از نرم افزارهای FP II و N III صورت گرفت و با 75% مقدار توصیه شده (RDA) مقایسه گردید (۱۲). کلیه آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و به منظور رسم بار دیاگرام و خطوط رگرسیون از نرم افزار HG استفاده شد.

نتایج


میانگین دریافت انرژی $330/8 \pm 769/9$ کیلوکالری، پروتئین $5/5 \pm 9/1$ گرم و آهن $3/1 \pm 6/1$ میلی گرم بود. در مقایسه با 75% مقدار توصیه شده (RDA) بر اساس سن و جنس، کمبود انرژی در $88/2\%$ ، پروتئین در $89/7\%$ و آهن در $73/5\%$ کودکان وجود داشت. $37/4\%$ پروتئین و $29/5\%$ آهن دریافتی از طریق فرمولهای فنیل فری و لوفنالاک تأمین شده بود (نمودار ۱).

نمودار ۱- توزیع فراوانی نسبی کودکان مورد مطالعه بر اساس وضعیت

دریافت انرژی، پروتئین و آهن



نمودار ۳- توزیع فراوانی نسبی کودکان مورد مطالعه بر اساس پارامترهای بیوشیمیایی وضعیت آهن



میانگین پارامترهای هماتولوژیکی کودکان عبارت بودند از: هموگلوبین $12/23 \pm 1/17$ گرم در دسی‌لیتر، هماتوکریت $39/46 \pm 3/48$ درصد، $MCV 85/5 \pm 6/46$ میکرون معکب، $MCH 28/71 \pm 2/11$ پیکوگرم برای هر یاخته، $MCHC 33/46 \pm 0/95$ درصد و همچنین میانگین غلظت آهن سرم $86/71 \pm 32/98$ میکروگرم در دسی‌لیتر و اشباع ترانسفرین $26/85 \pm 9/45$ درصد بود (جدول ۱).


جدول ۱- میانگین و انحراف معیار فراسنجهای خونی در کودکان PKU

گروه	فراسنج‌خونی
$(n=69)$ PKU	
$X \pm Sd$	
$13/23 \pm 1/17$	هموگلوبین (g/dl)
$39/46 \pm 2/48$	هماتوکریت (%)
$85/56 \pm 6/46$	$MCV (\mu^3)$
$28/71 \pm 2/11$	MCH (Pg)
$33/46 \pm 0/95$	MCHC (%)
$86/71 \pm 32/98$	آهن سرم ($\mu g/dl$)
$229/24 \pm 41/84$	TIBC ($\mu g/dl$)
$26/85 \pm 9/45$	اشباع ترانسفرین (%)

بمنظور تعیین ارتباط احتمالی میان طول مدت رژیم و اثرات آن بر شاخص‌های کم‌خونی ناشی از فقر آهن، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معنی‌داری میان طول مدت رژیم درمانی با هموگلوبین ($r = 0/44$ و $P < 0/0001$) و هماتوکریت ($r = 0/53$ و $P < 0/005$)، MCV ($r = 0/39$ و $P < 0/001$)، آهن سرم ($r = 0/32$ و $P < 0/02$) و اشباع ترانسفرین ($r = 0/24$ و $P < 0/02$) وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت معنی‌داری نیز میان آهن دریافتی و آهن سرم ($r = 0/18$ و $P < 0/018$) مشاهده گردید.

در مقایسه با مقادیر طبیعی پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی بر اساس سن و جنس، $1/21$ % کودکان کمبود هموگلوبین و هماتوکریت $15/7$ %، کمبود MCV $17/2$ %، کمبود MCH $4/7$ % و کمبود $MCHC$ $9/7$ % و آهن سرم $24/2$ % کاهش درصد اشباع ترانسفرین سرم (کمتر از ۲۰ درصد) را نشان دادند (نمودار ۲ و ۳).

نمودار ۲- توزیع فراوانی کودکان مورد مطالعه بر اساس وضعیت پارامترهای هماتولوژیکی



بحث

کاهش درصد اشباع ترانسفرین و آهن سرم به عنوان شاخصهای حساس وضعیت آهن در مطالعه حاضر نشان داد که نسبت قابل توجهی از کودکان PKU تحت مطالعه از فقر آهن رنج می‌برند که احتمالاً عوارض آن پارامترهای هماتولوژیک نظیر MCV و MCH و هموگلوبین و هماتوکریت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر عدم کفایت دریافت انرژی، پروتئین، آهن و محدودیت‌های رژیمی در سبب شناسی کم‌خونی مشاهده شده دخیل هستند چراکه بیش از 70 % کودکان مورد مطالعه کمتر از 75 % مقدار توصیه شده مواد مغذی را دریافت نموده‌اند.

هرچند که در مطالعات $Acosta$ (۷)، $Reilly$ (۱۳)، $Gropper$ (۱۴) افزایش دریافت آهن نشان داده شده بود ولی وضعیت پائین آهن در مقایسه با استاندارد در تعدادی از کودکان PKU تحت درمان مشاهده گردید، (۷، ۱۳) در حالیکه در مطالعه

در مطالعه حاضر ۲۹/۵٪ آهن دریافتی از طریق فرمولاهای ویژه این کودکان تأمین شده است. آهن موجود در فرمولها به شکل سولفات فرو می‌باشد که زیست دسترسی بالایی را دارا است. چنانچه یافته‌های این مطالعه نیز نشان می‌دهد که با افزایش طول مدت رژیم درمانی، میزان هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH و آهن سرم افزایش می‌یابد. از آنجایی که آهن دریافتی کودکان مرکب از آهن فرمولا و آهن منابع غذایی عمدتاً با سبزیجات و میوه‌جات با زیست دسترسی پایین (آهن غیرهم) می‌باشد، احتمالاً پایین بودن نمایه‌های وضعیت آهن در کودکان مورد مطالعه را می‌توان به ترکیب رژیم غذایی مربوط دانست و بدیهی است با کاهش دریافت آهن از طریق فرمولا، وضعیت نمایه‌های آهن تحت تأثیر سوء قرار گیرد. با توجه به اینکه سهمیه دریافتی فرمولای این کودکان در طی ۲ سال اخیر کاهش یافته، احتمالاً عدم کفایت دریافت انرژی و مواد مغذی بدین دلیل بوده و زمان جهت تأثیر کمبود دریافت بر شاخصهای کم‌خونی هنوز کافی نباشد، لذا تصور می‌رود که با گذشت زمان علائم کم‌خونی بیشتر بروز نماید. با در نظر گرفتن لزوم ادامه رژیم درمانی تا بلوغ و حتی در دوران بارداری زنان (۱۹)، توجه به کفایت دریافت غذایی و وضعیت تغذیه‌ای این بیماران بدلیل طولانی بودن مدت رژیم درمانی خاص ضروری بنظر می‌رسد.

دیگر تفاوت معنی‌دار میان کودکان PKU و سالم از نظر نمایه‌های وضعیت آهن مشاهده نشد (۱۴). Scaglioni و همکارانش (۶) نشان دادند که میانگین غلظت Ferritin سرم کودکان PKU تحت درمان بطور معنی‌داری کمتر از کودکان سالم بوده ولی سایر نمایه‌های وضعیت آهن بین دو گروه تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. با توجه به وجود همبستگی معنی‌دار میان آهن دریافتی و آهن سرم در مطالعه حاضر احتمالاً کمبود دریافت آهن در کودکان تحت مطالعه می‌تواند سبب تشدید افت شاخص‌های وضعیت آهن شود. از آنجایی که وضعیت آهن یک فرد ناشی از مقدار دریافت آهن و اتلاف آن در طی هفته‌ها یا ماهها قبل می‌باشد و با تغییر روزانه آهن دریافتی، تغییر سریعی در وضعیت آهن ایجاد نمی‌شود و از سوی دیگر کودکان مورد مطالعه در سنین رشد قرار داشته و نیاز به مواد مغذی در آنها افزایش می‌یابد، ممکن است دریافت ناکافی انرژی، پروتئین و آهن در درازمدت اثر منفی بر وضعیت آهن این کودکان بگذارد. از سوی دیگر عوامل متعددی ممکن است زیست دسترسی آهن را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از این عوامل نظیر: فیبرها، فیتات‌ها، اگزالات‌ها و اسیدتانیک با آهن نمکهای غیرمحلول تشکیل داده و از جذب آهن می‌کاهد (۱۸-۱۵).

منابع

- Acosta, P.B., Wens, E. & Williamson, M.: Methods of dietary inception in infants with PKU. *J.Am.Diet. Assoc.* 72: 164-167, 1978.
- Hanley, W.B., Linson, L., Davidson, W. & Hoes, C.A.E.: Malnutrition with early treatment of phenylketonuria. *Pediatr. Res.* 4: 318-327, 1970.
- Alexander, F.W., Clayton, B.F. & Delves, H.T.: Mineral and trace-metal balances in children receiving normal and synthetic diets. *Q.J.Med.* 43: 89-111, 1974.
- Acosta, P.B., Wens, E. & Williamson, M.: Nutrient intake of treated infants with phenylketonuria. *Am.J.Clin.Nutr.* 30: 198-207, 1977.
- Longhi, R., Riva, E., Rolllj, A., Paccanelli, S., Butle, C., Valsasina, R.7 Ciovannini, M.: Nutritional control in PKU children on restricted diet: The trace elements. Abstracts of the Third International Symposium on Inborn Errors of Metabolism in Humans, Munich, Germany, 1984.
- Scaglioni, S., Zuccotti, G., Vedovello, M., Rottoli, A., Paccanelli, S., Longhi, R., Riva, E. & Giovannini, M.: Study of serum ferritin in 58 children with classic phenylketonuria and persist hyperphenylalaninomia. *J. Inherit. Metab. Dis.* 8: 160-166, 1985.
- Acosta P.B., Gropper, S.S., Clarke-Sheehan, N., Wens, E., Cheng, M., Anderson, K. & Koch, R.: Trace elements status of PKU children ingesting on elemental diet. *J.P.E.N.* 11: 287-292, 1987.
- Agget, P.J. & Davies, N.T.: Some nutritional aspects of trace metals. *J. Inherit. Metab. Dis.* 6 (Suppl 1): 22-30, 1983.
- Sievers, E., Odigs, H. D., Dorner, K. 7 Schaub, O.: Trace elements excess in PKU diets. *J. Inherit. Metab. Dis.* 14: 897-905, 1990.
- Farhud, D.D. 7 Kabiti, M.: Incidence of phenylketonuria (MPKU) in Iran. *Indian J. pediatr.* 49: 685-688, 1982.
- Kabiri, M.: A report on the incidence of phenylketonuria Tehran-Iran. *Acta. Medica. Iranica.* 24: 107-113, 1982.
- Anonymous: Tenth edition of the RDA. *Nutr. Rev.* 48: 28-30, 1990.
- Reily, C., Barrett, J.E., Patterson, C.M., Tinggi, v., Batham, S.L. & Marrinan, A.: Trace elements nutrition status and dietary intake of children with phenylketonuria. *Am. J.Clin. Nutr.* 52: 159-165, 1990.
- Gropper, S.S., Acosta, P.B. & Clrak-Sheehan, N.: Trace element status of PKU and normal children. *J.Am.Diet.Assoc.* 88: 459-465, 1988.
- Cook, J.D., Nable, N.L. & Morek, T.A.: Effect of fiber on nonheme iron absorption. *Gastroenterology* 85: 1354-1356, 1983.
- Disler, P.B., Lyneh, S.R., Charlton, R.W., Torrance, J.D., Bothwell, T.H., Waker, R.B., & Mayer, F.: The effect of tea on iron absorption. *Cut* 16: 193-197, 1975.
- De Maeyer, E.M.: Preventing and controlling iron deficiency anemia through primary health care. WHO., Geneva, pp: 11-12, 1989.
- Shills, M.E. & Young, V.R. (eds.): *Morden Nutrition in Health and Disease*, 7th ed. Lea and Febiger, Philadelphia, pp: 238-252, 1988, Molecular genetics of PKU