

بررسی کارائی ریشه‌کنی (100mci) ۳۶۶۰ مگابکرل-^{۱۳۱}I در درمان سرطانهای تیروئید

(در بخش یددرمانی مؤسسه تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)

دکتر عباس تکاور، دانشیار بخش فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

STUDY OF ABLATION EFFICACY OF 3660 MBq,¹³¹I IN TREATMENT OF THYROID CARCINOMA

(AT THE IODINE THERAPY UNIT OF NUCLEAR MEDICINE DEPARTMENT, UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES)

ABSTRACT

Althonough the basic question of ablative threshold dose for ablation of thyroid remnant after surgery yet remains unanswered, but radioiodine therapy is being used as a standard method of treatment.

In present research, Treatment responses for 100 patients with thyroid cancer treated with 3660 MBq of ¹³¹I were studied.

Significant response differences between female group (66%) and male group (34%) for T.S.H and Tg measurements and also for area of thyroid remnant were not observed.

Effects of prescribed activities were studied and for radiation protection as well as the patients socioeconomic status, prescription of low levels of ¹³¹I activities (<1110 MBq) for ablation of thyroid remnant is recommended.

چکیده

بافت باقیمانده تیروئید پس از جراحی سرطان تیروئید وجود ندارد با وجود این سالهای است که ۱۳۱-I برای ریشه‌کنی بافت باقیمانده تیروئید پس از جراحی بکار گرفته می‌شود. مقدار اکتیویته کاربردی برای ریشه‌کنی در مراکز مختلف از ۱۱۱۰ تا (۳۲۱) (۷۴۰) (۶۵۴) مگابکرل گزارش شده است حتی بر سر مقدار اکتیویتهای از ۱۳۱-I که برای اسکن تیروئید پیش از تجوییز دوز انهدامی باید بکار رود بیشترهادهای کاملاً متفاوتی وجود دارد (۸۷۲۱) در مراکز ید درمانی دانشکده پزشکی تهران در اکثر موارد (۹۰%) اکتیویته کاربردی برای ریشه‌کنی ۳۶۶۰ مگابکرل است.

چون برتری هیچیک از مقادیر اکتیویته برای ریشه‌کنی بافت باقیمانده به اثبات نرسیده است (۱۰۰، ۹۷، ۴) پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش پیش آهنگ بر روی بروند پکند بیمار مبتلا به سرطانهای تیروئید پس از جراحی از فروردین ماه ۱۳۷۱ تا فروردین ۱۳۷۴ با اکتیویته ۳۶۶۰ ید مگابکرل-۱۳۱-I درمان شده‌اند انجام پذیرفته است و هدف پژوهش بررسی تأثیر ریشه

اگر چه هنوز به سوالات اساسی مانند آستانه دوز ریشه‌کنی (ablative dose) در انهدام بافت باقیمانده تیروئید پس از جراحی سرطانهای تیروئید پاسخ مناسبی داده نشده است با وجود این رادیوییدرمانی به صورت استاندارد بکار می‌رود. در این پژوهش بررسی بر روی بروند پکند بیمار سرطانی که اکتیویته ۳۶۶۰ مگابکرل در آنها بکار گرفته شده است در پاسخ به درمان موردنظر بررسی قرار گرفته است. در این بررسیها تفاوت آماری معنی داری میان پاسخ به درمان در گروه زنان (۵۶%) و گروه مردان (۴۴%) از دید اندازه‌های Tg, T.S.H و سطح باقیمانده تیروئید مشاهده (۰/۰۵ < p < ۰/۰۵) نگردید تأثیر درمانی این مقدار اکتیویته بررسی گردید و پیشنهاد شد که تا پیدا شدن پاسخ سوالات اساسی و بخاطر مسائل ایمنی، اقتصادی و اجتماعی از اکتیویته کم (۱۱۱۰ > مگابکرل) جهت ریشه‌کنی بافت باقیمانده استفاده شود.


مقدمه

با اینکه نتیجه گیریهای دقیقی برای اثبات کارائی ریشه‌کنی

کنی اکتیویته یاد شده در بیماران نامبرده می باشد.

جدول شماره (۱) توزیع انواع سرطانهای تیروئید در بیماران مورد بررسی

مردان		زنان		نوع سرطان
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۷۰/۷۰	۲۵	۶۷/۵	۴۰	پاپیلر
۱۸/۱۸	۶	۱۸/۷۵	۱۲	فولیکولر
۶/۰۶	۲	۱۸/۷۵	۱۲	میکس
۱	۱	۲	۲	نامشخص
۷۱/۰	۲۴	۷۱/۰	۶۶	جمع



نمودار شماره (۱) توزیع انواع سرطانهای تیروئید در بیماران مورد بررسی

اندازه های T.S.H بدهت آمده با روش RIA پس از تجویز اکتیویته ریشه کنی در جدول (۲) و اندازه گیری مقادیر Tg پس از تجویز دوز ریشه کنی در جدول (۳) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲) اندازه های هورمونی T.S.H پس از ریشه کنی بافت باقیمانده تیروئید (اکتیویته ریشه کنی ۳۶۶-۱۳۱ MBq)

بیماران زن		T.S.H IU/ml	تعداد	درصد
۱۴/۷۵	<۰	۹	۴	۱۲/۹
۳/۳	۰-۱۰	۲	۱	۳/۲
۱/۶	۱۰-۲۰	۱	۲	۶/۶
۸/۲	۴۰-۲۰	۵	۲	۶/۶
۶/۶	۲۰-۲۰	۴	۸	۷/۷
۲۹/۰	۷۰-۵۰	۱۸	۴	۱۲/۹
۲۱/۳	۵۰-۱۰۰	۱۳	۱۰	۴۸/۱۵
۱۴/۷۵	>۱۰۰	۹	۵	۱۶/۰
۷۱/۰	جمع	۶۱	۲۱	۷۱/۰

ابزار و روش

بررسی بر روی پرونده یکصد بیمار که در بیمارستان شریعتی مورد جراحی تیروئید قرار گرفته و دوز انهدامی ۳۶۶۰ مگابکدل به آنها داده شده است انجام پذیرفت. از این تعداد بیمار ۶۷ نفر زن با سن متوسط ۴۲/۳ و دامنه سنی ۸ تا ۷۱ سال و ۳۳ مرد با سن متوسط ۴۵/۵ و دامنه سنی ۱۲ تا ۷۲ سال هستند. متوسط سن همه بیماران در این پژوهش ۴۳/۵ سال است. بررسیهای آزمایشگاهی با یکارگیری روش رادیو ایمونواسی (Radioimmuneassay) (RIA) برای آزمایشهای جذب ید و اسکن رادیو ایزوتوپی تیروئید به ترتیب اکتیویته های Tg و $T.S.H$ است. برای آزمایشهای جذب ید و اسکن رادیو ایزوتوپی ^{131}I ۳۷ MBq، ^{37}K ۰.۳۷ MBq تجویز شده است.


بررسی جذب ید در این بیماران بوسیله یک دستگاه جذب ید (Picker Cliniscaler) و برای مدت یک دقیقه و حداقل ۱۰۰۰۰ شماره و همه اسکنها مورد بررسی در این پژوهش با یک دستگاه اسکن خطی Picker Maynascanner 500/D با سرعت ۴۰ cm/min انجام گرفته است. سیستم اسکن قادر به تشخیص اکتیویته ای در حدود ۲۶ KBq/g است که مربوط به تراکم ^{131}I /۰.۶۳ درصد اکتیویته تجویز شده است. تشخیص بافت باقیمانده در هر اسکن بطور مستقل بوسیله دو پرشرک متخصص پاژشگی هسته ای و به صورت مشاهده ای انجام گرفته است.

در بررسی اندازه های سطح باقیمانده بافت تیروئید پس از جراحی (Total Thyroidectomy) و همچنین اندازه گیری سطح اشکارسازی پس از تجویز دوز انهدامی یک دستگاه پلاسی متر Compensating Polar Planimeter 620022 (K+Z) و با دقت تقریبی ۵ درصد بکار گرفته شده است. فاصله تاریخ اسکن پس از جراحی تیروئید و اسکن پس از تجویز دوز ریشه کنی برای بیماران زن برای یک نفر کمتر از ۶ ماه و برای ۷ نفر بیش از یکسال و بقیه میان ۶ تا ۱۲ ماه بوده است. این فاصله زمانی برای بیماران مرد کمتر از ۶ ماه دو نفر بیشتر از یکسال و یکنفر و بقیه میان ۶ تا ۱۲ ماه دو نفر بیشتر از یکسال و یکنفر و بقیه میان ۶ تا ۱۲ ماه بوده است. در هیجیک از بیماران متاستازی تشخیص داده نشده است.


نتایج

توزیع نوع سرطان در یکصد نفر بیمار زن و مرد مورد بررسی در جدول شماره (۱) نشان داده شده است.

اندازه گیری پلاسی متری برش سطح متوسط بافت باقیمانده تیروئید پس از جراحی در زنان ۷/۶۳ و در مردان ۶/۰۷ سانتیمتر مربع است. سطح متوسط بافت باقیمانده تیروئید پس از دوز انهدامی ۱۳۱-۱۳۱-۱ در زنان ۱/۹۵ و در مردان ۱/۴۴ سانتیمتر مربع را نشان می دهد.




نمودار (۳) اندازه های Tg پس از تجویز دوز ریشه کنی MBq ۲۶۶۰ بد - ۱۳۱ در بیماران مورد بررسی



نمودار (۴) اندازه های هورمونی T.S.H پس از ریشه کنی بافت باقیمانده تیروئید با استفاده از اکتیویته MBq ۲۶۶۰ بد - ۱۳۱ در بیماران مورد بررسی

جدول شماره (۴) سطح متوسط بافت باقیمانده تیروئید پیش از تجویز دوز ریشه کنی MBq ۲۶۶۰ بد - ۱۳۱	
سطح بافت باقیمانده تیروئید	سطح بافت باقیمانده تیروئید
پیش از تجویز بد ریشه کنی زنان	۷/۶۳
مردان	۷/۰۶۳

همانگونه که دیده می شود جدول (۴) برای بیماران زن کاهش متوسط ۷/۴/۵ درصد و در بیماران مرد کاهش متوسط ۷۵/۵ درصد را نشان می دهد سطح باقیمانده پس از درمان تفاوت معنی داری را میان دو سطح متوسط باقیمانده برای جمعیت زنان و مردان نشان نمی دهد ($P < ۰/۰۵$).



نمودار شماره (۴) چگونگی تغیرات باقیمانده تیروئید پیش از درمان و پس از درمان با تجویز MBq ۲۶۶۰ بد - ۱۳۱ در بیماران مورد بررسی

جدول شماره (۳) اندازه های Tg پس از تجویز دوز ریشه کنی ۱۳۱- بد ۲۶۶۰ MBq

تعداد	درصد	بیماران زن	تعداد	درصد	بیماران مرد	Tg.ng/ml
۱۰/۲	۲	۲۱/۸	۱۲	۱-۲		
۱۰/۳	۲	۷/۳	۴	۲-۴		
-	-	-	۸	۴-۶		
۲۴/۱	۷	۲۷/۳	۱۶	۴-۵		
۳/۴	۴	۱۰/۹	۶	۵-۱۰		
۱۷/۲	۶	۱۴/۰	۸	۱۰-۵۰		
۲۰/۶	۶	۷/۳	۴	۵۰-۱۰۰		
۱۳/۸	۴	۹	۰	>۱۰۰		
۲۱/۰	۲۹	۲۱/۰	۵۵	جمع		

بحث

اگرچه سؤال اساسی اینکه آیا دوز انهدامی ۱۳۱- بد باعث افزایش زمان زنده ماندن و کاهش بیماری در بیماران با سرطان تیروئید می شود بی جواب مانده است (۱۰۷۳) ولی اختلاف سلیقه روی چگونگی تعریف ریشه کنی و اندازه اکتیویته برای رسیدن به ریشه کنی کامل وجود دارد.

در بررسیهای کلینیکی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اگر اندازه هورمون T.S.H در بیمار پس از تجویز اکتیویته ریشه کنی از ۲۰ IU/ml تیروگلوبلین (Tg) کر چکتر از ۵ ng/ml باشد و سطح باقیمانده تیروئید به صفر میل کند ریشه کنی کامل تصور می شود. بررسی سطوح بافت باقیمانده پیش از تجویز بد ریشه کنی و پس از آن در زنان و مردان رقمهای جدول (۴) بدست

مهمی میان دو جمعیت مشاهده نمی شود ($p < 0.01$).

نتیجه گیری

با در نظر گرفتن آمار ارائه شده و عدم وجود یک آستانه دوز برای ریشه کنی کامل بافت باقیمانده تیروئید (۱۱۰، ۴۳، ۲۱، ۱۱۰) و تفاوت گزارشها برای این دوز (۱۲۷، ۶، ۵) و با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که تا بررسی دقیق تر و دریافت گزارش های معتبر، از اکتیویته $MBq < 3660$ برای ریشه کنی بافت باقیمانده تیروئید استفاده شود.

سپاسگزاری

لازم می دانم از استادان مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشکده پزشکی تهران و همچنین از خانمها حلیمه توحیدی مقدم کارشناس بهداشت و خانم نادیا جوکار ادريس کارشناس علوم آزمایشگاهی و خانم معصومه سید انتظار بخاراط همکاری های صمیمانه شان سپاسگزار باشم.

مراجع

- 1) MC. Cowen KD, Adler RA, etal: Low dose radioiodide thyroid in post. surgical patients with thyroid cancer. Am.J.Med. 1976; 61:52-58.
- 2) Degroot J, Reilly M: Comparison of 30 and 50 mci doses of iodine -131 fo,thyroid ablation. Ann In Med. 1982; 96: 51.
- 3) Silva. F, Flores. C.etal Low dose-rate-I-131 therapy for thyroid cancer The J.Nuc. Med. 1994; 35. No. 5.
- 4) Becker DV, Hurley JR, Motazedia, etal: Ablation of post-surgical thyroid rem nants in Patients with differentiated thyroid cancer can be achieved with less whole body radition J.Nucl.Med. 1982; 23:P43, (abst).
- 5) Nemec J,Rohling S, Zamrazil V, etal. Comparision of the distribution of diagnostic and thyroablative I-131 in the evaluation of differentiated thyroid cancer. J.Nucl.Med. 1979; 20:92-97.
- 6) Comtois R, Theriault C, and Delvecchio P: Assessment of the efficacy of Iodine-131 fir tgcroid ablation J.Nucl. Med. 1930-1993 1972; 34.
- 7) Snyder J, Garman C, Scanlon P: Thyroid Remnant Ablation: Questionable Pursuit of on ill-defined gold. J.Nucl. Med. 1983; 24, 659-655.
- 8) Maxon HR, Thomas SR, Cheniwen: The role of nuclear medicine in the treatment of hyperthyroidism and well-differentiated thyroid adeocarcinomia. Clin. Nucl. Med. 1981; 6:P87.
- 9) Beier Waltes, W.H and widman.J.How harmful to others are Iodine -131 treated patients The J. Nucl. Med. 1992; 33. No.12. Dec.
- 10) Gottschalk.A.Hoffer.P.B and Potchen.E.J Ablation of thyroid Diagnostic Nuclear Medicine 1988; 2.P.798-802.
- 11) Waxman A, Ramana L, Chapman. etal: The significance of I-131 Scavdose in patient with thyroid cancer.1981; J.Nucl.Med 22: 861-865,
- 12) Beier waltes W H, Nishiyama RH. etal: Survival time and cure in papillary and follicular thyroid carcinoma with distant metastasis J.Nucl. 1982; Med. 23:561-568.

در بررسی آماری داده های T.S.H برابری واریانس محقق است و اختلافات معنی داری میان متوسط T.S.H در بیماران زن و بیماران مرد مشاهده نمی گردد.

در بررسی آماری مقادیر Tg پس از تجویز ید انهدامی در گروه مردان و زنان اختلاف معنی داری میان دو گروه دیده نمی شود. همانگونه که اعداد نشان می دهند با دو ریشه کنی ۳۶۶۰ مگابکرل سطح بافت باقیمانده تیروئید به صفر نمی رسد و در ۸۰ درصد بیماران سطح باقیمانده از یک سانتیمتر مریع بیشتر است. تعداد بیماران زن با $Iu/ml > 20$ درصد $73/9$ و بیماران مرد با $Iu/ml > 5$ درصد $72/2$ در صورتی که ملاک عدم تأثیر در درمان $Iu/ml < 5$ در T.S.H در نظر باشد.

۱۶/۵ درصد بیماران زن و ۱۶/۱ درصد بیماران مرد به درمان پاسخ مقتضی نمی دهند. در بررسی Tg در این بیماران اگر ملاک موقوفیت $Tg < 58/1$ باشد $58/1$ درصد بیماران زن و $44/8$ درصد بیماران مرد به الا اختلاف آماری در مورد بیماران مرد این رقم به $72/2$ درصد می رسد. در صورتی که ملاک عدم تأثیر در درمان $Iu/ml < 5$ در T.S.H در نظر باشد.