

## شکل لیپوزومی لوامیزول هیدروکلراید

دکتر محمود دوستی، دانشیار تزویه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

دکتر سید محمد جواد صدیقی، دکترای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

### LIPOSOMAL LEVAMIZOLE HYDROCHLORIDE

#### ABSTRACT

Levamizole hydrochloride ( $C_{11}H_{12}N_2S \cdot HCl$ ) is a drug capable of being rapidly absorbed from the gastrointestinal tract and is also rapidly eliminated from plasma. It has a modulating effect on the immune system, and may be used in treatment of parasitic diseases and infections. Because of its toxicity to liver and its rapid clearance from plasma, this drug must be formulated in such a way so as to decrease its necessary dosage and thus its toxic effect on the liver while improving or at least maintaining its present tolerance to desintegrating factors in the surrounding and its ability to efficiently reach its target tissues (the immune system).

Therefore, the liposomal form of levamizole hydrochloride can be helpful in achieving the stated goals.

In this study, first a preparation of a multilayer liposome with hydrophilic coating was done. For this purpose, a mixture of phosphate buffer (sodium and potassium phosphate 1,4 mmol, pH=7,4) ethanol and lipid (100 mg phosphatidyl choline, extracted from soya) was used (buffer 200 mg, ethanol 80 mg, lipid 100 mg). Also levamizole hydrochloride with half a solubility in water was used. The above solutions from levamizole containing liposomes under a few cycles of freeze-thawing method (20-60 °C). Ultracentrifugation (45 min, 60.000 rpm) was used to determining the extent of drug encapsulation; in this method we can calculate the percent encapsuation using a control. In our method this percentage was calculated to be 92.7%.


#### چکیده

گرم فسفاتیدیل کولین یا لستین حاصل از سویا) مورد استفاده قرار گرفت (بافر ۲۰۰ میلی گرم، اتانال ۸۰ میلی گرم، لیپید ۱۰۰ میلی گرم) و ثانیاً از داروی لوامیزول هیدروکلراید با حلایت ۱ در آب استفاده گردید. داروی لوامیزول هیدروکلراید به همراه محلول فوق در روش برودتی و حرارتی (۲۰°-۶۰°) به یک لیپوزوم حاوی دارو تبدیل می شود. برای تعیین میزان محصور سازی دارو از دستگاه اولتراسانتریفوج (۴۵ دقیقه، ۶۰۰۰ rpm) استفاده شد که می توان به وسیله یک شاهد درصد محصور سازی دارو را بدین وسیله به دست آورد. در این روش درصد محصور سازی (%EF) لوامیزول هیدروکلراید ۹۲/۷ درصد بود.

لوامیزول هیدروکلراید ( $C_{11}H_{12}N_2S \cdot HCl$ ) دارویی است که سریعاً از دستگاه گوارش جذب شده و با سرعت از پلاسمای حذف می گردد. این دارو به عنوان اصلاح کننده (modulating) سیستم ایمنی، جهت درمان بیماریهای انگلی و عفونتهای انگلی مورد استفاده قرار می گیرد. به علت سمیت بالقوه این دارو برای کبد و نیز پاکسازی سریع آن از پلاسمای تهیه فرمی که علاوه بر آزاد سازی آهسته دارو که آن را به طور مؤثرتری به بافت هدف (سلولهای سیستم ایمنی) برساند، ضروری بنتظر می رسد.

در این مطالعه، در ابتدا ساخت لیپوزوم چند لایه با محصور سازی هیدروفیلیک انجام گرفت. برای تهیه و ساخت لیپوزوم، محلولی از بافر فسفات (نمکهای فسفات سدیم و بتاپیم ۱/۴ میلی مول، pH = ۷/۴)، اتانال و لیپید (۱۰۰ میلی

(۹۷۷۷)، میکروسکوپ الکترونی و دستگاه چرخاننده استفاده شده است.



شکل شماره ۱- اساس ساختارهای لیپوزومی

### روش کار

به منظور تهیه لیپوزومهای MLV و ۸۰ میلی‌گرم اتانال را به یک لوله پلاستیکی درب دار منتقل می‌کنیم سپس ۱۰۰ میلی‌گرم لستین سویا افزوده می‌شود. به لستین حل شده در اتانال، به ۲۰۰ میلی‌گرم از بافر فسفات با  $\text{pH} = ۷/۴$  که حاوی  $۷/۷۷$  میلی‌گرم کرومات پتاسیم است اضافه می‌شود. محلول فوق الذکر در درجه حرارت  $۶۰^{\circ}\text{C}$  برای مدت چند دقیقه قرار می‌گیرد و سپس در دوره‌های اتحدام مختلف  $۲۰^{\circ}\text{C}-۰^{\circ}\text{C}$  و  $۰^{\circ}\text{C}-۲۰^{\circ}\text{C}$  سرد می‌شود. به محلول پرولیپوزوم تهیه شده، قطره قطره از بافر PBS با سرعت ۵-۱۰ قطره در دقیقه افزوده می‌گردد. تا حجم نهائی محلول به ۱۰ میلی لیتر رسانده شود. ۱ میلی لیتر از نمونه لیپوزومی تشکیل شده در کیسه دیالیز قرار داده با ۱۵۰ برابر حجم آن از بافر PBS دیالیز می‌کنیم. نمونه لیپوزومی دیالیز شده را به وسیله دترئنت تریتون لیز نموده به حجم نهائی میلی لیتر ۱۰ می‌رسانیم. میزان جذب کرومات موجود در لیپوزومها با دستگاه اسپکتروفتومتر UV اندازه‌گیری می‌شود و میزان کرومات محصور شده محاسبه می‌گردد. این روش قبلاً با - کربوکسی فلوروسین انجام شده است (۳). به منظور تهیه لیپوزومهای MLV حاوی داروی لوامیزول دو تسبیت ( $۸۰/۲۰۰$ ) و ( $۱۰۰/۴۰۰$ ) از بافر حاوی دارو، اتانال و لیپید: در محلول پرولیپوزومی به کار گرفته شد. غلظت وزنی لوامیزول هیدروکلراید  $۶۰$  میلی‌گرم دارو در  $۲۰۰$  میلی‌گرم بافر در نظر گرفته شد. در روش ساخت تنها از یک دوره برودتی  $-۲۰^{\circ}\text{C}$ - استفاده گردید. به منظور محاسبه میزان داروی محصور شده، میلی لیتر ۱۰ از نمونه لیپوزومی فوق در سه لوله مخصوص دستگاه اولتراسانتریفیو $\ddot{\text{o}}$  تقسیم می‌گردد و برای مدت ۴۵ دقیقه در  $۲۰^{\circ}\text{C}$  و در  $100,000\text{ rpm}$  می‌شود. یک نمونه لیپوزومی نیز به عنوان شاهد بدون دارو تحت اولتراسانتریفیو $\ddot{\text{o}}$  با شرایط فوق فرار گرفت. با استفاده از محلول

### مقدمه

مولکولهای آمفی پاتیک در سطح روغن - آب با گروههای قطبی خود در فاز مائی و با گروههای غیر قطبی در فاز روغنی شکل گیری خواهند داشت.

یکنوع از پراکنده‌های مولکولهای آمفی پاتیک ساختمانهای دو لایه (bilayer) سفید. چنانچه پراکنده‌های دو لایه را در فاز مائی با روشهای مناسب به اشکال کروی تبدیل کنیم، بخشی از فاز مائی در داخل محفظه کروی محصور می‌شود. این نوع پراکنده‌ی از ترکیبات آمفی پاتیک در فاز مائی لیپوزوم نامیده می‌شود (شکل ۱). فسفاتیدیل گلیسرول و کولین (لستین)، فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل گلیسرول و کاردیولیپین مهمترین لیپیدهای به کار گرفته شده برای ساخت لیپوزومها می‌باشد. به دلیل باز جذب شدید لیپوزومها به مکروفاژها، داروی لوامیزول هیدروکلراید به منظور ارائه به عملکرد های سیستم ایمنی، بخصوص مکروفاژها (۱) و متعاقباً افزایش اثر تنظیم کننده سیستم ایمنی (immunomodulating) این دارو، به نحو مؤثری و به میزان ۹۰ درصد با استفاده از دو نوع لیپید مختلف محصورسازی شد.

Bangham و همکارانش برای اولین بار این ساختارهای لیپیدی را مطرح کردند (۲). لیپوزومها در انواع تک دو لایه (multi lamellar) و چند دو لایه (uni lamellar) (۳) اندازه‌های میکروسکوپی چند دهم میکرون تا چند ده میکرون در تحقیقات زیست شناسی به عنوان مدل غشاء سلولی در مهندسی ژنتیک به عنوان حامل ارائه دهنده ژنها و در داروسازی با اهداف مختلف ذیل مورد استفاده واقع شده‌اند:

الف) افزایش فراهم‌زیستی داروها به منظور کاهش دوز مورد نیاز برای ایجاد اثر درمانی مطلوب  
ب) کاهش سمیت دارو از طریق کاهش غلظت داروی آزاد و با متابولیت آن در خون و بافت‌های بدن  
ج) رساندن دارو به بافت‌های خاصی همانند کبد، طحال، بافت‌های سرطانی و در نتیجه اختصاصی نمودن اثر دارو

د) محافظت دارو در برابر عوامل مخرب  
در این بررسی انجام شده، محصور سازی هیدروفیلیک (برای داروهای کاملاً محلول در آب) به وسیله کرومات پتاسیم که دارای حلالیت بالایی در آب می‌باشد مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخش دیگر کارهای لوامیزول هیدروکلراید با حلالیت ۱ به ۲ در آب به میزان بیش از ۹۰ درصد در لیپوزومهای MLV محصور شده‌اند.


### مواد و وسایل

در کارهای انجام شده از لستین سویا و لستین تخم مرغ (Merck - ۵۳۳۱)، اتانال  $۹۹^{\circ}$ ، کرومات پتاسیم، لوامیزول هیدروکلراید (کارخانه پورسینتا)، تریتون  $۱۰۰-X$ ، بافر فسفات (PBS)، اولتراسانتریفیو $\ddot{\text{o}}$  (Beckman TL - TL)، کیسه دیالیز


جدول شماره (۲): درصد محصورسازی لوامیزول هیدروکلراید برای دو نوع لستین سویا و تخم مرغ

| پافر حاوی دارو: اتاقل-لستین | %EF   |
|-----------------------------|-------|
| ۱۰۰٪:۴۰۰                    | ٪۹۲/۷ |
| ۲۰۰٪:۱۶۰٪:۴۰۰               | ٪۹۳   |
| ۱۰۰٪:۲۰۰                    | ٪۹۲/۲ |
| ۲۰۰٪:۱۶۰٪:۴۰۰               | ٪۹۲/۹ |

از نظر خصوصیات فیزیکی، سوپسانسون لیپوزومی تهیه شده دارای چگالی متوسط  $1/02$  می باشد. پدیده رسوب گذاری در مورد لیپوزومها به خوبی دیده شد. شودرسوب ایجاد شده در ته لوله به راحتی قابلیت پراکندگی را نشان می دهد. به وسیله اولتراسانتریفیوژ در  $60,000 \text{ rpm}$  و به مدت زمان ۱ ساعت و  $20^{\circ}\text{C}$  دو دسته متفاوت لیپوزومها از نظر اندازه جدا شدند. نمودار ۲ توزیع اندازه ذرهای لیپوزومها را برای لیپوزومها بیشترین فراوانی اندازه ذرهای میکرومتر  $1/50$  می باشد.



شکل ۲ تصویر این لیپوزومها را که به وسیله میکروسکوپ الکترونی یا بزرگ نمایی  $15700$  گرفته شده است، نشان می دهد.



روبوی میزان داروی محصور شده در لیپوزوم اندازه گیری شد و با استفاده از آن میزان داروی محصور شده محاسبه گردید.


## نتایج

با اندازه گیری میزان محصورسازی (%EF) کرومات پتانسیم برای لیپوزومهای MLV در دوره های برودتی  $-20^{\circ}\text{C}, 0^{\circ}\text{C}, 20^{\circ}\text{C}$  و استفاده از تنها یک دوره حرارتی  $60^{\circ}\text{C}$  مطابق جدول ۱، برای کرومات بهترین میزان محصورسازی مربوط به دوره حرارتی  $60^{\circ}\text{C}$  و برودتی  $-20^{\circ}\text{C}$  می باشد. افزایش تعداد دوره ها از ۱ دوره به ۳ دوره تغییری در میزان محصورسازی به دنبال نخواهد داشت.

جدول شماره (۱): مقادیر میانگین محصورسازی برای دوره های برودتی حرارتی مختلف

| انحراف معیار میانگین محصورسازی | دوره | انجامده درجه حرارتی   | ذوب درجه حرارتی | نام |
|--------------------------------|------|-----------------------|-----------------|-----|
| $\pm 6$                        | ۱    | $20^{\circ}\text{C}$  | ۶۰              | الف |
| $\pm 7$                        | ۱    | $20^{\circ}\text{C}$  | ۶۰              | ب   |
| $\pm 4/9$                      | ۱    | $-20^{\circ}\text{C}$ | ۶۰              | ج   |
| $\pm 4/9$                      | ۲    | $20^{\circ}\text{C}$  | ۶۰              | د   |

نمودار ۱ تغییرات میانگین محصورسازی کرومات در لیپوزومهای MLV را با درجه حرارت نشان می دهد.



در تهیه لیپوزومهای دارویی از دو نوع لستین سویا و لستین سحمدمن و در دو نسبت متفاوت استفاده شده است. میزان محصورسازی (%EF) داروی لوامیزول هیدروکلراید بسیار بالا و بیش از ۹۰ درصد برای نسبت های متفاوت و انواع مختلف می باشد (جدول ۲).

## بحث و نتیجه گیری

توانایی محصورسازی چندان افزوده نمی شود. لوامیزول هیدروکلراید در لیپوزومی MLV با روش پرولیپوزومی به میزان بالاتر از ۹۰ درصد با استفاده از دو نوع لستین با منبع سویا و تخم مرغ در دو غلظت متفاوت از لیپید (۲۰۰، ۱۰۰ میلیگرم) محصورسازی شد. لوامیزول هیدروکلراید دارای حلالیت ۲۱ در آب می باشد و لیکن در اتanol به مراتب حلالیت بهتری دارد.

علیرغم اینکه در روش ساخت در مقایسه با لیپوزوم حاوی کرومات تغییری داده نشده است، علت این افزایش محصورسازی را می توان به امتزاج مناسب مولکولهای دارو و در لستین نسبت دهیم. به حال استفاده هایی که از اثر تنظیم کننده سیستم اینمنی این دارو در کمک درمانی سلطانها (۴)، آرتربیت روماتوئید (۵)، مسلولین ریوی (۶)... می شود، ما را بر آن داشت تا فرم لیپوزومی لوامیزول هیدروکلراید را به منظور ارائه به ماکروفازها تهیه کنیم. به امید اینکه ادامه این راه و انجام آزمایشات *in vivo* و بالیتی نتایج مؤثرتری را به دنبال داشته باشد.

انجام محاسبه آماری، اختلاف میانگینهای به دست آمده را از نظر معنی دار بودن مورد بررسی قراردادیم (آزمون t)، میانگینهای محصور سازی ب، ج، د (جدول ۱) به ترتیب مربوط به نقاط  $20^{\circ}\text{C}$ - $20^{\circ}\text{C}$ - $20^{\circ}\text{C}$ - $20^{\circ}\text{C}$ - $20^{\circ}\text{C}$ - $20^{\circ}\text{C}$  در سه دوره، هیچ کدام با یکدیگر اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد و لیکن میانگین محصورسازی مورد الف مربوط به نقطه برودتی  $20^{\circ}\text{C}$  با همه

واره دیگر اختلاف معنی داری را نشان می دهد.

از آنجاکه دمای تغییر فاز soy-lecitin در محدوده صفر تا  $10^{\circ}\text{C}$  تغیین زده می شود هنگامی که مخلوط پرولیپوزوم سرمای ۲۰°C را می گذراند، لستین مذکور هنوز به دمای تغییر فاز خود ترسیده است و لذا انقباض لیپید به متوجه محصورسازی کافی نیست. حدمت زده می شود نیروی ایجاد شده به وسیله مرحله اتحاد که باعث انقباض لیپید می شود باعث محصورسازی است. هنگامی که درجه حرارت  $20^{\circ}\text{C}$  انتخاب می گردد، دما را زدیک به دمای تغییر فاز قرار داده ایم. در نتیجه انقباض لیپید کاملاً و محصورسازی نیز میزان بالاتری را نشان می دهد. با عبور کردن درجه حرارت اتحدام از محدوده دمای تغییر فاز (ج، د)

## مراجع

- Allen T.M. et al. Biochimica et biophysica Acta. 1991; 1061: 56-64.
- Bangham et al. J.Mol.Biol. 1965; 13: 238-62.
- Perrett S et al.J.Pharm.pharmacol. 1991; 43 3: 154-60.
- Spreafico F;Drugs. 1980; 20 (2): 105-116 (29 ref).
- Huskisson E.C et al. Drugs.1980; 20(2): 100-149 (a review).
- Singh A.N et al.J.Ass. Phynsn India. 1983; 31: 405.

\* \* \*