

لایپروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره

دکتر هرمز دبیراشرافی^۱ - دکتر بحیی بجهت نیا^۲ - دکتر نسرین مقدمی تبریزی^۳

مقدمه

اشاره "تحت عمل قرار گرفتند". سن بیماران بین ۱۶-۴۴ سال، وزن آنها در حد ۴۱-۹۲ کیلوگرم بود. شایع ترین دلیل عمل لایپروسکوپی در بیماران نازاعی بوده است. برای انجام عمل از متدهای Grundsell^۱ استفاده گردید که طرح شماتیک آن در شکل های (۱ و ۲) نشان داده شده است. بطور خلاصه شکافی عرضی در زیر ناف بطورهای ۱/۱ سانتیمتر ایجاد کرده (شکل ۳) و سپس با انگشت اشاره تا روی فاسیا پیش میرویم (شکل ۴). در مرحله بعد به کمک تیغ بیستوری شکافی طولی باندازه غلاف لایپروسکوپ بر روی فاسیا بوجود می آوریم (شکل ۵). سپس انگشت اشاره را از راه این شکاف و صفاق عبور داده وارد حفره شکم مینماییم (شکل ۶). در این حال، با همان انگشت به بررسی محل انسزیون می پردازیم. در صورتیکه مانعی وجود نداشته باشد، غلاف لایپروسکوپ را وارد نموده و از طریق آن گازباداخل شکم تزریق میکنیم. برای جلوگیری از خروج گاز، از یک بخیه X در کنار زخم استفاده گردید. برای این منظور Grundsell¹ از دو پنس آلیس در دو طرف زخم استفاده میگرد.

نتایج Results

از ۴۰ بیمار مورد مطالعه، در یک مورد امکان عمل "لایپروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره" محدود نشد، و

لایپروسکوپی، اگر بطور صحیح مورد عمل قرار گیرد، روش تحقیقی سالمی است. بطور کلی، عوارض این عمل کمتر از ۱٪ است^۱. میزان عوارض عمده این روش (Major Complication) ۰/۳-۵٪ میباشد^۲. مرگ و میر ناشی از این متدها را ۸-۴ درصد هزار لایپروسکوپی برآورد کرده‌اند^۲. البته عامل این مرگ‌ها علاوه بر عمل لایپروسکوپی ناشی از بیهوشی نیز بوده است. حتی، با اجرای تکنیک صحیح در عمل، دو مرحله اولیه این روش بطور چشم بسته انجام می‌پذیرد:

- ۱- وارد کردن سوزن مخصوص برای تزریق CO₂.
- ۲- وارد کردن تروکار نوک تیز برای قرار دادن لایپروسکوپ در حفره شکم.

"ندرتا"، امکان دارد عبور سوزن و تروکار منجر به سوارخ شدن روده‌ها و یا عروق بزرگ گردد. برای حل این مشکل راه حل هایی ارائه شده است. یکی از این پیشنهادات بکارگیری روش "لایپروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره" است. نتایج حاصله از این عمل در ۴۰ بیمار مورد بررسی قرار میگیرد.

بیماران مورد مطالعه و روش کار

Materials and Methods



۴۰ بیمار به روش "لایپروسکوپی با استفاده از انگشت



روش معمول لاپاروسکوپی برگشته و با کاربرد سوزن و تروکار، عمل لاپاروسکوپی را بفرم معمول انجام دادیم . علت عدم موفقیت دراین ۷ بیمار آن بود که پس از باز کردن فاسیا متوجه شدیم که لایه روی صفاق ضخیم تراز معمول بوده (Subperitoneal fascia) و در نتیجه بکم انگشت اشاره قادر به باز کردن آن نیستیم ، بدین ترتیب ، میزان موفقیت ما در عمل "لاپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره" ۴۰ بیمار در (جدول ۱) نشان داده شده است.



علت آن چسبندگی زیرناحیه عمل لاپاروسکوپی بود . این بیمار بعداً "لاپاروتومی گردید، در زیر محل لاپاروسکوپی قبلی چسبندگی شدیدی وجود داشت . بدین ترتیب ، روش لاپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره " توانست موردی از چسبندگی داخل شکمی را مشخص سازد . اگر از روش معمول لاپاروسکوپی استفاده کرده بودیم مسلم " در این ناحیه به تسویج چسبیده به جدار، صدمه وارد میشد . در ۳۹ بیمار دیگر عمل لاپاروسکوپی انجام گرفت ، از طرفی ، در ۷ بیمار با استفاده از روش "لاپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره " موفق به باز کردن صفاق نشدیم و بناچار به

بیماران با اسکار لاپاروسکوپی قبلی	سن بیماران (سال)	وزن بیماران (Kg)	امکان عمل لاپاروسکوپی	عدم امکان لاپاروسکوپی	عدم امکان بامتد F	عدم امکان One. F	تعداد بیماران
۱۶-۴۴	۳ (%۷/۵)	۴۱-۹۲	۲ (%۲/۵)	۲۲ (%۸۲/۰۵)	۱ (%۱۷/۹۵)	۱ (%۲/۵)	۴۰

جدول ۱—مشخصات ۴۰ بیمار که با روش "لاپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره " تحت عمل قرار گرفتند .








دکترد بیراشراقی و همکاران: لایپروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره

۵۲



بیمار بعداً "به مؤلف مراجعت ننموده‌اند، ولی، با همان تعداد کم مراجعته کننده نیز میتوانیم بگوئیم که احتمال عفونت محل انزیبیون در این طریقه بیشتر از روش لپاروسکوپی معمولی است.

۳- گاهی فاسیای روی صفاق (Subperitoneal fascia) ضخیم تراز آنست که بوسیله انگشت باز شود. در سه مورد ما برای بار دوم از بیستوری برای باز کردن فاسیای روی صفاق استفاده کردیم. با وجودیکه اشکالی بوجود نیامد، ولی کاربرد بیستوری در این فضای تنگ و بدون دید کافی را در واقع نقص فواید این روش داشته و توصیه نمیکنیم. بعقیده ما بهتر است بیستوری یک بار و برای باز کردن فاسیای رکتوس بکار رود. در ۷ مورد (۱۷/۹۵%) بجهت ضخامت فاسیای روی صفاق موفق به تکمیل تکنیک لپاروسکوپی با استفاده ازانگشت اشاره نشدمیم و به ناچار به روش نمکی لپاروسکوپی بازگشته و عمل را ادامه دادیم. بدین ترتیب موفقیت عمل لپاروسکوپی با استفاده ازانگشت اشاره در دست ما (۸۲/۵۰%) بوده است، در حالیکه در مقاله Grundse11 به رقم ۱۰۰% اشاره شده است.

۴- خروج گاز از کنار غلاف لپاروسکوپ یک مشکل مهم و اساسی در این تکنیک میباشد. بنظر ما، اهمیت این اشکال بیش از آنست که Grundsell بیان نموده است. این دانشمند برای حل این مشکل از اتصال دو پنس آلسیدر کنار زخم استفاده میکرد. ولی بنظر ما این کار نمیتواند بخوبی از خروج گاز جلوگیری نماید. ما ابتدا از بخیه بر روی زخم پوست در کنار غلاف استفاده میکردیم، ولی بجهت آنکه این عمل چندان موثر نبود وسائل اضافی Hasson را باتغییراتی بکار برده و مشکل فوق را حل نمودیم (شکل ۲). توضیحات بیشتر درباره این وسائل در مقاله دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مزایای روش "لپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره" بشرح زیر میباشد:

۱- در موارد وجود اسکار قبلی بر روی شکم، این روش یک طریقه منتخب محسوب میگردد. در ۴۰ بیمار مورد مطالعه ما سه نفر اسکار قبلی بر روی شکم داشتند. یک بیمار دوبار فتق نافی عمل کرده بود. در این بیمار در محل ورود انگشت احساس چسبندگی نمودیم (بعداً "در ضمن لپاروسکوپی تائے بیند گردید")، ولی با جستجو توانستیم راهی برای ورود

بحث در شروع عمل لپاروسکوپی، حتی اشخاص باتجریه، از خطرسوراخ شدن روده و یا صدهم به عروق بزرگ بینناکند. این نگرانی مخصوصاً وقتی افزایش می‌یابد که بیمار سابقه عمل جراحی قبلی بر روی شکم داشته باشد. برای رفع این اشکال روش لپاروسکوپی باز (Open Laparoscopy) Hasson^۴ در سال ۱۹۷۱ ارائه گردید. طریقه بوسیله Hasson در واقع یک مینی لپاروتومی Hasson (Mini Laparotomy) محسوب میگردد. در وسائل لپاروسکوپی تغییراتی ایجاد کرد. بدین ترتیب که بجای تروکار تیز از تروکار کند استفاده نمود و ببروی غلاف تروکار یک مخروط فلزی اضافه کرد تا از خروج گاز جلوگیری گردد. به عقیده Hasson مزایای روش لپاروسکوپی باز، که وی آنرا در ۱۴ بیمار بکار گرفت، بشرح زیراند:

۱- عدم استفاده از سوزن تزریق گاز CO_2 و تروکار تیز.

۲- اطمینان از ورود گاز CO_2 به حفره شکم.
۳- ترمیم لایه‌ها بصورت آناتومیک در انتهای عمل.
۴- Grimes در سال ۱۹۸۱ روش Hasson را بکار برده. از طرفی، وی برای جلوگیری از خروج گاز، از یک بخیه مخصوص (Purse string suture) دریافت چربی و در اطراف تروکار استفاده میکرد. در سال ۱۹۸۲ روش ساده‌تری را پیشنهاد نمود که بنام روش لپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره "موسوم گردید. روش پیشنهادی وی، در واقع حد واسطه روش Hasson (مینی لپاروتومی) و روش معمول لپاروسکوپی قرار دارد. او این روش را در ۲۶ بیمار بکار برده، و در تمام موارد موفق به انجام عمل لپاروسکوپی گردید. بطور کلی، در ۴۵ بیمار مورد مطالعه ما اشکالات عمل "لپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره" بشرح زیر بوده‌اند:

۱- کاربرد بیستوری در شروع عمل و در فضای تنگ ایجاد شده خود یک عمل چشم بسته میباشد.

۲- تشریع بافتی در این طریقه بیشتر از روش معمول لپاروسکوپی است، و بالطبع انتظار می‌رود که عوارض محل زخم نیز بیشتر باشد. مدت ورود به حفره شکم در روش "لپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره" طولانی تراز روش معمول لپاروسکوپی است. از طرفی، اگرچه تمام این ۴۰

حذف شده است، بدین ترتیب، لپاروسکوپی از یک عمل تخصصی خارج شده و بصورت یک روش مورد استفاده عاممه متخصصین زنان درمی‌آید.

۳- در این طریقه، گاز CO_2 حتماً در حفره شکم وارد می‌شود.

۴- در طریقه "لپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره" مرحله ورود سوزن و تروکار تیز حذف می‌گردد،

۵- پس از عمل، فاسیابسته می‌شود. در مقاله اصلی، Grundsell

موارد با یک بخیه X فاسیا را مسدود نمودیم و سپس پوست را ترمیم کردیم. به تصور ما همین امر تکنیک "لپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره" را آناتومیک تر می‌سازد.

به حفره شکم پیدا کنیم. مسلماً، در این بیمار هیچگاه روش معمول لپاروسکوپی توصیه نمی‌گردید. در بیمار دیگری که اسکاربر روی شکم داشت، انگشت اشاره نقطه‌ای را برای ورود به حفره شکم پیدا نکرد. این بیمار بعداً "لپاروتومی شد و معلوم گشت در محل لپاروسکوپی چسبندگی شدیدی وجود داشته است. مسلماً در صورت استفاده از لپاروسکوپی بطریق معمول صدمه زیادی برای بیمار وارد می‌گردد. در بیمار سوم عمل لپاروسکوپی بدون اشکال انجام گرفت. این بیمار چسبندگی داخل شکمی نداشت.

۲- این روش یک طریقه مناسب برای اشخاص کسی تجربه می‌باشد، زیرا مرحله ورود سوزن و تروکار تیز در آن

REFERENCES

- 1) Samuelsson,S., Sjovall, A.: Complications and the prophylaxis against complications in gynaecological Laparoscopy. LaKartidningen. 70:2570, 1973.
- 2) Phillips, J.M., Hulka, J., B., et al : American association of Gynecologic Laparoscopist's 1976 membership survey. J. Reprod Med. 21:3, 1978.
- 3) Grundsell, H., Larsson, G. A modified laparoscopy entry technique using a finger. Obstet. Gynecol. 59:509, 1982.
- 4) Hasson, H.M.: Open laparoscopy: A modified instrument and method for laparoscopy. Am. J. Obstet. Gynecol. 110: 886, 1971.
- 5) Grimes, E.M.: Open laparoscopy with conventional instrumentation. Obstet. Gynecol. 57:375, 1981.