

معرفی یک بیمار مبتلا به مارگزیدگی با گانگرن انگشتان دست ها و پاهای

دکتر سید حسن عارفی * و دکتر داریوش کمال هدایت *

اینکه حیوانی وی را گزیده است لباس های خود را بیرون آورده و در ناحیه قفسه سینه احساس تورم و سوزش می نماید که بدنبال آن علائم تب، تهوع و استفراغ در وی ظاهر می شود. بیمار در حالیکه ۱۵۰ کیلومتر با اهواز فاصله داشته است به بیمارستانی در اهواز منتقل می شود و در طول راه علاوه بر سرد شدن و گزگر انگشتان پاها متوجه گزگزو سردی در انگشتان دستها نیز می شود. پس از یک هفته درمان های مقدماتی جهت بررسی و اقدام درمانی به بیمارستان دکتر شریعتی تهران اعزام می شود.

بیمار سابقه هیچ بیماری مهمی درگذشته نمی داد، در بررسی سیستم ها از کاهش بینایی در چشم راست شاکی بود رنگ ادرار بیمار تغییر پیدا کرده بود و درانتهاها در چهار اندام گانگرن انگشتان همراه با ضایعات بولوز در پاها، دست ها، آرنج ها و زانوها مشاهده می شد (شکل شماره یک) در معاینات نکته مثبتی جز یافته های فوق در اندام ها وجود نداشت نبض های محیطی اندام فوقانی و تحتانی جز در ناحیه خلف درشت نی و پشت پا در بقیه نقاط طبیعی لمس می شدند. فشار خون بیمار در حد طبیعی

مارگزیدگی یکی از مسائل وخیم و بغرنج در زندگی روستایی و عشاپری مملکت ما میباشد که تشخیص و درمان بموقع آن میتواند در نجات جان مارگزیده بسیار مؤثر باشد. بطور کلی در اثر گزش های حیوانات گزنده مثل مار، عقرب، عنکبوت، زنبور و حیوانات سمی دریائی دو نوع ضایعه ایجاد می شود: (۱)

- ۱- اثرات مستقیم سم بر روی بدن.
- ۲- اثرات غیر مستقیم ناشی از واکنش های افزایش حساسیت.

بیماری که معرفی می شود نمونه نادری از عوارض بسیار شدید مارگزیدگی بصورت گانگرن اندامها و توکسودرمی می باشد.

معرفی بیمار:
آقای الف - ط - ۷۵ ساله نگهبان خط آهن شوشترا - اهواز در زمستان سال ۱۳۶۴، ۲۰ هفته قبل از مراجعة به بیمارستان در حالیکه در اتاق نگهبانی خوابیده بوده است ناگهان بعلت سرد شدن و گزگر انگشتان پای راست و سپس پای چپ از خواب بیدار می شود بیمار بلا فاصله بفکر

* - دانشیار گروه بیماریهای داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران - بیمارستان دکتر شریعتی، بخش قلب.

پلاکت‌ها، افزایش غلظت فیبرینوزن، کوتاه شدن عمر پلاکتی و مصرف موضعی پلاکت‌ها در محل گزش باشد (۲).

در مطالعه‌ای تجریبی بر روی سگ‌ها، ضمن تزریق سم مار به حیوان مشاهده شده است که سرد کردن اندام مبتلا نه تنها سبب بهبود علائم مارگزیدگی نمی‌شود بلکه کاهش قدرت نبض و شروع سیانوز در اندام پدیدار می‌گردد (۳).

بیمار معرفی شده در بالا ضمن داشتن علائم عمومی مارگزیدگی در شروع بیماری (تب، تهوع، استفراغ) علائم کواکولوپاتی، وازوکسیریکسیون و اکنشی و ترومیوز در عروق انتهای را نشان می‌دهد که منجر به گانگرن اندام‌ها شده است. شاید بعد مسافت از محل کار بیمار ضمن انتقال به اهواز و سرد شدن هوای جاده در هنگام شب، آترواسکلروز ناشی از سن در تشدید علائم عروقی بیمار مؤثر بوده باشد.

معرفی این بیمار از دو جهت جالب توجه می‌باشد:
۱- نادر بودن گانگرن اندام‌ها در جریان مار-گزیدگی.

۲- اقدام زودرس در درمان بیمار مارگزیده و آموزش و آمادگی پزشکی و بهداشتی در مناطقی که مارهای سمی زیاد دیده می‌شود.

خلاصه

در این گزارش یک بیمار مبتلا به مارگزیدگی با علائم گانگرن انتهایی هر چهار اندام معرفی شد و علائم بالینی مارگزیدگی و مکانیسم ایجاد این ضایعات بحث گردید در مورد شناخت علائم مارگزیدگی و اقدام سریع درمانی و آموزش‌های پزشکی و بهداشتی در نواحی زندگی مارهای سمی تأکید گردید.

بود و هیپوتانسیون وضعیتی وجود نداشت.

آزمایشات:

فرمول شمارش، هموگلوبین و هماتوکریت، پلاکت، رتیکولوسیت طبیعی بود، زمان سدیماتاتسیون ۸۸ میلی متر در ساعت اول بروش و سترگرن نشان می‌داد، تست های انعقادی زمان پروتوموبین و زمان تروموبولاستین پارسیل

در حد طبیعی بودند، تست‌های بیوشیمیائی اندازه گیری قند، اوره، کراتینین، اسید اوریک، الکترولیت‌ها، کلسیم، فسفر، الکالن فسفاتاز و تست‌های کبدی همگی در حد طبیعی بودند. آزمایشات کومبیس مستقیم و غیر مستقیم، سلول جستجوی آنتی‌بادی ضد هسته سلول منفی بودند آزمایش کامل ادرار طبیعی بود، جستجوی خون میکروسکوپیک در مدفوع منفی بود.

بیمار تحت درمان آنتی‌بیوتیک جهت عفونت‌های ثانوی زخمی‌ای اندام‌ها، و آنتی کواکولاسیون بروش انفوزیون ۲۴ ساعته هپارین و کپسول نیفیدیپین قرار گرفت و پس از چند هفته درمان و مشخص شدن حدود نسوج گانگرن از نسج سالم ابتداقطع پاها از ناحیه مچ و سپس قطع انگشتان دست‌ها از ناحیه بندهای پروگسیمال انجام شد. بیمار با حال عمومی خوب جهت معرفی به مرآکر توان بخشی از بیمارستان مرخص گردید. آسیب شناسی نمونه‌های آمپوته شده غیر از تغییرات آترواسکلروز ناشی از افزایش سن، ترومیوز داخل عروقی را نیز نشان داد.

بحث:

بدنبال گزش مارهای سمی پس از چند دقیقه سوزش شدیدی شخص مارگزیده حس میکند و بدنبال آن ورم موضعی و انتشار یابنده در تمام جهات ایجاد می‌شود که همراه آن اکیموز و ضایعات بولوز در نواحی گرفتار ایجاد می‌شود سپس گانگرن پوست و نسج زیر جلدی بوجود می‌آید. ضمن پیدایش این علائم تب، تهوع و استفراغ و علائم شدید قلبی عروقی و عصبی ممکن است مشاهده گردد که ناشی از جذب سرم در گردش خون بدن می‌باشد (۱).

در بعضی بیماران کواکولوپاتی همراه با خونریزی و نکروز نسج بوجود می‌آید که ممکن است با افزایش تعداد



شكل ۱- گانگر انتهای را در بیمار نشان می‌دهد . تغییرات ایسکمیک در پوست ناحیه زانو نیز دیده می‌شد .

