

نامه دانشکده پزشکی تهران

شماره هشتم از سال بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶

جستجو با و گردآوری علمی

دکتر منوچهر رهبر

دکتر حمید اعتبار

آمار ۱۰ ساله کیست هیداتیک ریه و بررسی نتایج عمل جراحی آن

از کارهای بخش جراحی قفسه سینه بیمارستان پهلوی

ما در این مختصر بدون اینکه ذکرى از علائم و سایر خصوصیات کیست هیداتیک ریه
بمیان آوریم بارائه آماری از اعمال جراحی کیست هیداتیک ریه طی سالهای ۱۳۴۵-۱۳۳۶
در بخش جراحی قفسه صدری بیمارستان پهلوی قناعت میکنیم.

مسئله ای را که باید خاطر نشان نمود اینست که در حالیکه مذهب اسلام سگ را نجس
دانسته و در ایران کمتر افرادی با این حیوان که میزبان اصلی انگل این بیماری است مستقیماً
سروکار دارند مع هذا شیوع این بیماری در ایران بهیچوجه با میزان این کسالت در اروپا و
آسریکا قابل مقایسه نیست در صورتیکه در کشورهای اخیرالذکر تعداد بسیار زیادی از مردم

*رئیس بخش جراحی قفسه سینه

*استادیار » » »

در منازل خود ازیگ مانند عضوی از خانواده نگهداری میکنند.
 طی ۱۰ سال اخیر تا این تاریخ تعداد ۸۱ بیمار مبتلا به کیست هیداتیک ریه در بخش جراحی سینه بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند. از این عده (طبق جدول زیر) ۴۷ نفر مرد (۵۹٪) و ۳۴ نفر زن (۴۱٪) بوده‌اند:

تعداد و نسبت درصد بر حسب جنس

جنس	تعداد	نسبت درصد
مرد	۴۷	۵۹٪
زن	۳۴	۴۱٪
تعداد کل	۸۱	۱۰۰٪

از این عده اعمال جراحی فقط ۳ مورد (۴٪) مرگ و میر بعلی از قبیل اورسی - شوک پس از عمل و غیره پیش آمده و بقیه با نتیجه بسیار خوب از بیمارستان مرخص شده‌اند.
 کوچکترین بیمار ۴ ساله و سنین ترین آنها ۵۰ ساله بوده است.
 تعداد ۵ نفر از این بیماران (۶٪) کیست هیداتیک هردو ریه توأماً داشته‌اند که در دو مرحله جداگانه تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند. از این عده اخیر دو بیمار مبتلا به هیداتیدوز بوده که سراسر هردو ریه آنها سملو از کیستهای متعدد و بیشمار بود که تخلیه و خارج کردن تمام آنها غیر مقدور بوده است.
 سه مورد از بیماران (۴٪) کیست هیداتیک ریه راست همراه با کیست هیداتیک کبد داشته‌اند که پس از عمل جراحی ریه کیست کبد آنها نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
 در سه مورد (۴٪) از این بیماران بعلت اشکال افتراق بین کیست هیداتیک و تومور رزکسیون بعمل آمد و در پاتولوژی نوع ضایعه مشخص گردیده است.
 در ۸۰٪ بیماران ما کازونی مثبت بوده و در ۲۰٪ بقیه شاید بعلت تخلیه کیست و یا عفونت ثانوی آن آزمایش کازونی منفی بوده است.
 هیچیک از بیماران عمل شده مابعد کسالت تابحال به مراجعه ننموده‌اند

خلاصه و نتیجه

۱- تعداد ۸۱ بیمار مبتلا به کیست هیداتیک ریه در مدت ۱۰ سال (۱۳۴۶ - ۱۳۳۶)

در بخش جراحی سینه بیمارستان پهلوی تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند.

۲- ۵۹٪ بیماران مرد و ۴۱٪ زن بوده‌اند.

۳- جوانترین بیماران ۶ ساله و مسن‌ترین آنها ۵۰ ساله بوده‌اند.

۴- مرگ و میر در این بیماران بعد از عمل جراحی ۴٪ بوده است.

۵- در این مدت هیچ‌یک از بیماران عمل شده با عود بیماری بامراجعه نکرده‌اند.

۶- ۶٪ این بیماران کیست هیداتیک دوطرفه ریه داشته‌اند.

۷- ۴٪ این بیماران کیست هیداتیک ریه همراه با کیست هیداتیک کبد داشته‌اند.

۸- فقط در سه مورد رزکسیون بعمل آمد و پاتولوژی نوع ضایعه را مشخص نمود.

۹- ماکیسکتومی را ترجیح می‌دهیم و در صورت اسکان تمامی کیست را بدون پاره‌شدن

آن برمی‌داریم.

۱۰- در ۸۰٪ موارد که کیست تخلیه نشده بود و یا عفونت پیدا نکرده بود کازونی

مثبت داشته‌ایم.

۱۱- نسبت شیوع این بیماری بسایر بیماریهای ریه در ایران قابل توجه است.