

پنجمین پژوهش نشانه‌های تراخم

نکارش

دکتر محمود شروان
چشم‌پزشک بهداری آموزشگاهها

پروفسور شهرسی
استاد کرسی چشم‌پزشکی
دانش‌بخش چشم‌پزشکی بیمارستان فارابی

بطور کلی تراخم دارای روش پنهانی بوده و ممکن است مدتها از آغاز آن بگذرد و بیمار متوجه نباشد تا آنکه بعلت دیگری مانند اورام ملتجمه به پزشک مراجعه نموده و از بیماری اصلی خود آگاه شود.

بازرسی در آموزشگاهها کاملاً این موضوع را تایید کرده است زیرا بسیاری از دانش آموزان مدتها به تراخم دچار بوده‌اند و خود و خانواده آنها ابدآ توجه نداشته و بلکه تشخیص پزشک بازرس آنها را بی‌نهایت در شکفت گزارده است.

ما برای شرح علائم بیماری عقیده ماک‌کالن^(۱) را پیروی نموده و نشانه‌های تراخم را در چهار دوره آن شرح میدهیم:

۱ - دوره ابتدائی

شکایت بیمار - در این مرحله تنها مختصر سنگینی پلک‌ها موضوع شکایت بیمار می‌باشد و هر بامداد هنگام پیدارشدن پلک‌های او بزحمت از هم باز می‌شود.

معاینه چشم‌پزشکی - ۱ در روی پلک - پس از برگرداندن پلک دانه‌هایی در روی ملتجمه آن مشاهده می‌شود این دانه‌ها کروی و بانداره ۴ - ۸ دهم میلیمتر و نیمه از آنها در ملتجمه پلکی فرو رفته‌اند. شباهت آنها به دانه خاویار زیاد است - این دانه‌ها از هم جدا بوده و در قسمت داخلی یعنی قسمت انفی پلک‌ها ممکن است بهم نزدیک شده و توده تشکیل دهند - حد دانه‌ها به بالائی تارس است وضع دانه‌ها نسبت به آوندهای ملتجمه بدین قسم است که هر دانه در فضای بین دو شاخه سرخ رگهای کوچک قرار گرفته‌اند و بهمین جهت است که در موقع رسیدن دانه‌ها فشار پنبه بر روی آنها سبب پارگی سرخ رک کوچکی شده ورنک پنبه را نارنجی قرمز می‌کند.

۲ - در روی ملتجمه گره چشی - با چشم غیر مسلح سالم بمنظار میرسد ولی با بیومیکروسکوپ^(۲) عروق ملتجمه بیش از حد طبیعی دیده می‌شود.

۴ - در روی قرنیه - با چشم غیر مسلح ممکن است در روی قرنیه نشانه‌ای دیده نشود ولی با ذره بین خواهیم دید که عروق در قسمت بالای قرنیه ظاهر گردیده است و این را پانوس مینامند - سابق براین خیال می‌کردند که پانوس از دوره دوم بیماری ظاهر می‌شود ولی امروز وسائل ذره بینی ثابت نموده که پانوس از آغاز تراخم وجود دارد.

دوره دوم

شکایت زیمار - در این دوره علاوه بر آنکه سنگینی پلک زیادتر گردیده و با آن حالت افتادگی و خفته‌گی میدهد ممکن است اشک ریزش و قی و ترشح چرک و ختصری بیمار را ناراحت کند در این حالت تراخم به شکل مارپیچی^(۱) نامیده می‌شود و در این هنگام پلک کمی کلفت تراز حالت طبیعی آنست.

معاینه چشم پزشکی ۱ - در روی پلک - در این حالت دانه‌های تراخم بعضی ها رسیده و شکل واقعی تراخم را بخود می‌گیرد و مانند دانه‌های خاویار زرد نارنجی بوده و در این دوره است که فشار پنهان بر روی آنها سبب رنگین شدن پنهان (زرد نارنجی) می‌شود ولی در همین حال بعضی از دانه‌ها هنوز کوچک و نارس می‌باشند و در پاره از نقاط پلک بخصوص قسمت داخلی این دانه‌ها بهم نزدیک شده و بشکل توده در می‌آیند

۵ - **ملتحمه کرده چشمی** - عروق در این قسمت زیاد شده و وقتی به محل اتصال صلبیه و قرنیه^(۲) میرسد با هم پیوند می‌شوند.

۶ - **در روی قرنیه** - شکل اصلی پانوس در این مرحله بخوبی دیده می‌شود عروق در روی قرنیه سرازیر و تا ثلث بالائی قرنیه کشیده می‌شود و رنگ چشم را تغییر داده و قرم و می‌کنند.

اصولاً سبل یا پانوس یعنی پیدایش عروق سطحی باریکی در قسمت بالای قرنیه و شکل آن بی شباهت به ریزش باران و یا ریختن آب از سر آب پاش نیست و میدان ظهور آن بین ساعت ۱۰ و ۱۴ می‌باشد و چنین بنظر میرسد که عروق در امتداد مستقیم یعنی در دنباله عروق ملتحمه بصلی چشم باشند معهداً بعضی از انها در بالای قرنیه و در خط فاصل بین صلبیه و قرنیه باهم پیوند نشده و بشکل شبکه می‌شوند که کاسی ان بطرف لمب^(۲) می‌باشد و از همین پیوند است که عروق باریکی بروی قرنیه کشیده می‌شود این عروق در روی قرنیه بفاصله معینی از هم قرار گرفته و هر یک بنوبه خود منظمآ به شاخه و شاخه‌های کوچکتر تقسیم می‌شوند بعلاوه هر گاه تراخم شدید باشد دانه‌های

شفافی در روی قرنیه خواهیم یافت این دانه‌ها ترکیبیه و تولید زخم‌های کوچکی در روی قرنیه می‌کند که تمام نشانه‌های یک زخم قرنیه را دارا هستند و در حقیقت دانه‌های مزبور همان پوشش جلد قرنیه است ولی در پاره از موقع این دانه‌ها همان جوش‌های تراخم‌اند که در روی قرنیه جای گرفته‌اند و در همین حال است که چشم دردناک می‌شود.

تراخم درجه ۳

شکایت بیمار - در این مرحله از بیماری هر گاه پانوس عوارضی در روی قرنیه نداده باشد بر شکایت بیمار افزوده نمی‌شود ولی هر گاه ترشحات چربی قرنیه را آسیب رسانیده باشد بیمار از اشک ریزش و ترس از روشنائی درز حمت خواهد بود.

معاینه چشم پزشکی - در روی پلک - در این دوره دانه‌های تراخمی رو به‌النیام می‌روند و بجای انها رشته‌های سفید رنگ و با اندازه مختلف در روی ملتجمه پلک مشاهده می‌گردد و در این قسمت‌ها ملتجمه سفید صدفی و شفاف است ولی ممکن است باز دانه‌ها باقی باشد.

پانوس کم کم می‌خواهد از بین برود.

تراخم التیامی یا درجه ۴

شکایت بیمار - در این حالت عوارض تراخم سبب شکایت بیشتری برای بیمار است یعنی ممکن است اشک‌ریزش - سوزش - ترس از نور ترشحات چشم فوق العاده بیمار را ناراحت کند.

معاینه چشم پزشکی ۱ - در روی پلک: تمام ملتجمه پلکی را بافت التیامی گرفته است و این بافت رشته‌هایی باشکال مختلف تشکیل داده که از همه معروف‌تر خط آرلت^(۱) نامیده می‌شود و به موازات به آزاد پلک است.

۲ - در روی قرنیه - عروق ممکن است کمی مرتفع شده باشند ولی در قسمت ثلث بالائی آن کدورت باقی است و در ناحیه لمب خط منحنی سفیدی خواهیم یافت که بعضی‌ها از اعلاء علامت مخصوص دوره التیامی تراخم میدانند.

عوارض تراخم

هر گاه به درمان تراخم زود اقدام شود عوارضی ندارد ولی در بیمارانی که به درمان خود اقدام نکرده و یا در آن اهمال نموده و باحسن انتخاب در درمان آنها باشد

به عوارض تراخم گرفتار میشوند و در این صورت تا مدتی دچار رنج فراوان شده و حتی ممکن است بینائی خود را از دست بدهند.

تراخم دارای عوارض بسیار است که در سه قسمت به شرح آنها می‌پردازیم.

۱ - عوارض تراخم در روی پلک

۱ - افتادگی پلک‌ها که بعضی‌ها از نشانه‌های تراخم میدانند ولی میتوان آن را از عوارض بیماری دانست و در واقع یک افتادگی کاذب در نتیجه سنگینی آن بعلت تغییرات تارس وزیادی خون در آن است ولی باید این افتادگی را با فلنج ماهیچه بالا بر نده بلکه اشتباه نمود.

۲ - تنگی شکاف پلک‌ها - در اثر التیام تراخم پلک‌ها جمع شده و در گوشه خارجی دو پلک بالا و پائین بهم چسبیده و سبب تنگی شکاف پلک‌ها میشود و معاینه چشم را دشوار میسازد.

۳ - برگشته‌گی پلک به طرف داخل چشم - تغییرات حاصله در غضروف پلک حالت انکماشی در این دو تولید میکند که موجب برگشتن لبه آزاد پلک بد اخل چشم میگردد و تولید انترولپیون می‌کند.

۴ - تری کیازیس - تراخم سبب میشود که مژه‌ها کج روئیده شده و بطرف داخل چشم انحراف پیدا کنند و با نتیجه نوك مژه‌ها در روی قرنیه کشیده شده و بیمار را فوق العاده ناراحت میسازد بقسمی که ناچار میشود مژه‌ها را بکند این عارضه را تری کیازیس می‌گویند.

۵ - اکتروپیون - دسته اثر مستقیم تراخم میدانند در این حالت لبه آزاد پلک به خارج بر میگردد و چون اشک نمیتواند سیر معمولی خود را داشته باشد بنا بر این تولید اشک‌ریزش والتهاب مخاط پلک و اطراف آنرا می‌کند.

اثر تراخم در روی ملتجمه

۱ - سمبلمغارون^(۱) - این عارضه عبارت از چسبندگی ملتجمه پلکی به ملتجمه کره چشمی است که ممکن است در نتیجه درمان بد تولید گردد.

۲ - گزروزیس^(۲) - یکی دیگر از عوارض تراخم در روی ملتجمه این است که قسمی از بافت آن خراب شده و پوسته پوسته می‌شود و گاهی این پوسته

شدن در روی قرنیه رسوب نموده و دید بیمار را اختلالی میدهد و هرگاه این حالت دنباله پیدا کند منجر بکمی ترشحات چشم گردیده و حالت خشکی در ملتحمه و قسمت قدامی چشم تولید میشود و سبب میگردد که شفافیت قرنیه از دست برود و بالاخره منجر به کبدورت و نایینائی گردد. این عارضه بگزروزیس موسوم است.

عوارض تراخم در روی قرنیه

۱- پانوس. بعضی‌ها پانوس را جزو عوارض تراخم در روی قرنیه میدانند ولی این عقیده باطل است زیرا عارضه هر بیماری پس از آنکه مدتی بیماری سیر خود را نمود ظاهر میگردد و حال آنکه پانوس از اغاز تراخم وجود داشته و یکی از نشانه‌های مشخصه بیماری است و بهمین جهت ما در ضمن علائم تراخم آنرا شرح داده ایم

۲. زخم قرنیه: زخم قرنیه بردو قسم است:

۱- همانطور که در ضمن علائم تراخم درجه دو شرح داده ایم ممکن است دانه‌های شفافی در روی قرنیه پیدا شوند که پوشش قدامی و یا جوشهای واقعی تراخم باشند و بهر حال همینکه دانهای نامبرده ترکیده و باز شود تولید زخمهای می‌کند که دارای تمام علائم زخم قرنیه می‌باشند ولی باید دانست که این نوع زخم قرنیه از عوارض بیماری نبوده و بلکه از علائم آنست و بعلاوه محل آنها در قسمت بالای قرنیه است.

۲- زخم‌هایی که بعلت انتروپیون و یا تری کیازیس یعنی سائیده شدن مژه‌های کج روی قرنیه پیدا میشوند و بیمار را بسیار ناراحت کرده و هرگاه زود بدرمان جدی آنها اقدام نگردد سبب عوارض دیگر مانند فتق عنیله و یا چسبیدگی‌های آن و بالاخره در اثر شرکت عفو نتهاي دیگر چرکين شده و سبب کوری بیمار می‌شود. در اینجا محل زخمهای در قسمت پائین قرنیه می‌باشد.

۳- لک قرنیه - التیام زخم تراخم لکه‌هایی از خود بیادگار می‌گذارد. این لکه‌ها اگر در کنار باشد ممکن است بدید بیمار زیانی وارد نسازد و یا آسیب آن کم باشد ولی اگر لک مرکزی در محاذات مردمک باشد بینائی بیمار را بکلی مختل ساخته و بعلاوه سبب زشتی خواهد بود.

تراخم و هجاري اشك

بعضی‌ها عقیده دارند که تراخم بعلت تولید اکتروپیون و اثر غیر مستقیم سبب

آسیب مجاری اشک میشود ولی دسته دیگر چون تراخم را یک التهاب عمومی چشم میدانند معتقدند که ویروس تراخم در مجاری اشک سبب التهاب میگردد بهمین جهت کالت^(۱) و کاوژ^(۲) امیدوار بوده‌اند که ویروس تراخم را در مجاری اشک پیدا کنند.

تراخم و آب سبز

گرچه پاره از آمارهای بیماران تراخمی شاهدند که در بین آنها مبتلایان به آب سبز^(۳) وجود دارد و بعلاوه کوتو^(۴) و ناتاف^(۵) نیز عقیده دارند که در مبتلایان تراخم باید مرتبآ فشار داخلی چشم را اندازه گرفت ولی بنابر عقیده پروفسور شمس آب سبز هیچگونه رابطه با تراخم ندارد و بسیاری از مبتلایان به آب سبز دیده شده که ابداً اثر و سابقه در چشم آنها از تراخم نبوده است.

تراخم و سوانح

بطور کلی نظر باینکه تراخم بافت پلک و قسمت قدامی کره چشم را تغییر میدهد بنابراین مقاومت آنها در برای بیماریها و عوارض مانند سوختگی و جسم خارجی و یا اورام ملتحمه کم شده و فرصت میدهد که بیماریهای نامبرده بسرعت پیشروی وشدت خود بیافزاید.

۱— Calt ۲— Cavje ۳— glaucome ۴— Cunéot ۵— Nataf