

## ترانکسامیک اسید در خونریزی منتشر آلوئولی در بیماری واسکولیت و گنر(گزارش موردی)

### چکیده

**زمینه و هدف:** بیماری و گنر یک واسکولیت با درگیری راه هوایی فوقانی و تحتانی در ریه است که اغلب اوقات با گلومرولنفریت همراه بوده و از عوارض وخیم بیماری خونریزی منتشر داخل آلوئولی می‌باشد. در این گزارش، تشخیص و درمان اختصاصی و موفقیت‌آمیز در یک بیمار مبتلا به خونریزی منتشر داخلی آلوئولی در زمینه و گنر ارائه شده است.

**معرفی بیمار:** آقای ۳۶ ساله غیرسیگاری به‌علت ضعف، بی‌حالی، همپوپیزی و تنگی نفس مراجعه کرده بود. در آزمایشات به عمل آمده افت هموگلوبین و افزایش آنزیم لاكتات دهیدروژناز و c-ANCA داشت. در گرافی قفسه سینه ارتضاح دو طرفه داخل آلوئولی مشهود بود. بیمار با تشخیص خونریزی منتشر داخل آلوئولی (Diffuse Alveolar Hemorrhage DAH) تحت درمان با پالس متیل پردنیزولون، سیکلوفسقامید و پلاسمافرزر قرار گرفت همچنین از ترانکسامیک اسید تزریقی داخل وریدی جهت کنترل فاز حاد خونریزی استفاده شد.

**نتیجه‌گیری:** خونریزی ریوی سریعاً به درمان‌های فوق پاسخ داد و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شد و هم اکنون (شش ماه از زمان بستری) حال عمومی او کاملاً مطلوب است.

**کلمات کلیدی:** خونریزی منتشر آلوئولی، ترانکسامیک اسید، گرانولوماتوز و گنر.

محمد باقر اولیا<sup>۱\*</sup>

آیت‌الله بیاتیان<sup>۲</sup>

ابوالحسن حلوانی<sup>۳</sup>

۱. گروه داخلی - روماتولوژی

۲. دستیار بیماری‌های داخلی

۳. گروه داخلی - ریه

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی بزد

\*نویسنده مسئول

نشانی: بزد، صفاته، بیمارستان شهید صدوقی

تلفن تماس: ۰۳۵۱-۸۴۲۴۰۰۰-۹

پست الکترونیک: mbowlia2@yahoo.com

### مقدمه


Wagener's Granulomatosis است که در ۸٪ موارد و گنر اتفاق می‌افتد و در نیمی از موارد با مرگ و میر همراه خواهد شد.<sup>۱</sup> DAH ثانوی به کاپیلریت یکی از تظاهرات کاملاً شناخته شده گرانولوماتوز و گنر است.<sup>۲</sup> درمان اولیه و توصیه شده جهت DAH در زمینه گرانولوماتوز و گنر، کورتیکو استروئید با دوز بالا به علاوه سیکلوفسقامید می‌باشد.<sup>۳</sup> ایمونوگلوبولین داخل وریدی در مرحله استقراریافته بیماری مفید است. در این مقاله یک بیمار مبتلا به خونریزی منتشر داخل آلوئولی در زمینه گرانولوماتوز و گنر معرفی می‌گردد که علاوه بر درمان‌های معمول، از ترانکسامیک اسید (ترانس آمین) جهت کنترل فاز حاد خونریزی استفاده به عمل آمده است.

خونریزی منتشر داخل آلوئولی (DAH) یک وضعیت بالقوه مرگبار و کشنده است که به‌علت طیف وسیعی از بیماری‌ها ایجاد می‌شود. DAH که درواقع یک کاپیلریت ریه می‌باشد، یک اورژانس پزشکی است که اغلب اوقات باعث نارسایی حاد تنفسی می‌شود و لذا نیاز به تشخیص سریع و درمان فوری دارد. علی‌رغم پیشرفتهای فراوان در زمینه تشخیص و درمان خونریزی منتشر آلوئولی هنوز مرگ و میر و عوارض ناشی از آن بسیار زیاد می‌باشد. یکی از شایع‌ترین علل خونریزی منتشر آلوئولی کاپیلریت بیماری گرانولوماتوز و گنر

شرکت IPDIC استفاده شود. بر این اساس داروی فوق با دوز  $500\text{ mg}$  طی ده دقیقه هر هشت ساعت طی بستره در ICU برای مدت پنج روز به صورت وریدی تجویز گردید. به طور مشخص از روز دوم بستره دفع خلط خونی روشن بیمار کاهش یافت، در مدت ده روز اول بستره، افت هموگلوبین تا حد  $9\text{ gr/dl}$  و افزایش کراتینین تا مرز  $42\text{ mg/dl}$  مشاهده شد ولی حال عمومی بیمار در هفته دوم و سوم سیر ثابت و پس از آن رو به بهبودی داشت. میزان اشتعاب اکسیژن شریانی بیمار در بدترین شرایط بیشتر از  $85\%$  بود. برنامه پلاسمافرز بیمار تا سه روز اول به صورت روزانه و پس از آن سه بار در هفته و بعد از ترخیص هفته‌ای یکبار بود و جایگزینی پلاسما در طی پلاسمافرز به صورت یک در میان با FFP، آلبومین  $20\%$  و نرمال سالین انجام می‌شد. در طول بستره امکان پلاسمافرز برای یک هفته مهیا نبود که  $100\text{ gr}$  IVIG جهت بیمار تزریق گردید. نهایتاً بیمار بعد از  $17$  روز بستره در ICU و پنج روز بستره در بخش با حال عمومی خوب و قطع هموپتیزی و هموگلوبین  $11$  از بیمارستان مرخص گردید.

جدول-۱: بررسی موارد کاربرد ترانکسامیک اسید

ملاحظات	نوع بیماری	مطالعه کننده
پاسخ درمانی مناسب	Total knee replacement	Camarassa MA
پاسخ درمانی مناسب	Liver tumor resection	WU CC
پاسخ درمانی مناسب	DIC and abdominal aortal anueurysm	On tachi y



شکل-۱: گرافی قفسه صدری بیمار در هنگام پذیرش

## معرفی بیمار

بیمار مرد  $36$  ساله، غیرسیگاری و کارمند بود که از حدود  $20$  روز قبل از مراجعته دچار سرفهای خشک و تب و آرتراژی مشخصاً مهاجر شده بود، از  $3-4$  روز قبل از مراجعته تنگی نفس و سرفهای خلط‌دار همراه با رگه‌های خونی به علائم بیمار اضافه شد. تب و سرفه در این مدت  $20$  روز ادامه داشت. سابقه بیماری خاصی را ذکر نمی‌کرد. در معاينه بدو ورود، بیمار مختصر هیجان‌زده بود و از تنگی نفس شکایت داشت، رنگ پریده و ایکتریک بود، سمع قلب تاکیکارد بود (ضربان قلب  $140$  بار در دقیقه) اما سوفل قلبی نداشت، سمع ریه تاکی پنه بود ( $25$  بار در دقیقه) و کراکل خشن در قواعد هر دو ریه شنیده می‌شد. در معاينه شکم نکته‌ای نداشت در اندام‌ها، ضایعات پورپوریک مختصی در ساق و کشاله ران هر دو پا به چشم می‌خورد. در گرافی قفسه سینه ارتشاج آلوئولی منتشر در قواعد و قسمت میانی در هر دو ریه به صورت پراکنده مشاهده می‌شد. (شکل شماره  $1$ ) آزمایشات بیمار به شرح زیر بود.

WBC= $16500/\mu\text{l}$	Urine Analysis	Blood : $3+$
Hb= $12/3\text{ g/dl}$		RBC = Many
PLT= $138000/\mu\text{l}$		
ESR= $105\text{ mm/h}$		
LDH: $610\text{ u/l}$	c-ANCA : $135\text{ (0-5) IU/ml}$	
Urea= $97\text{ mg/dl}$	p-ANCA = $0/9\text{ (0-5) IU/ml}$	
Creatinin= $2\text{ mg/dl}$		
Antiphospholipid Antibody	IgG= $2/9\text{ (0-9) GPL u/ml}$	
	IgM= $1/4\text{ (0-9) MPL u/ml}$	

بیمار با تشخیص خونریزی منتشر آلوئولی (DAH) به عنوان تظاهر اولیه گرانولوماتوز و گنر در بخش مراقبت‌های ویژه بستره شد و روزانه تحت درمان با یک گرم متیل پردنیزولون استات وریدی و پروفیلاکسی با  $400/80$  میلی گرم کوتربیوموکسانازول قرار گرفت، روز چهارم بستره یک گرم سیکلوفسپامید وریدی جهت بیمار تجویز شد. براساس اینکه DAH یک وضعیت بسیار وخیم و بالقوه کشنده است، تصمیم گرفته شد بر اساس وجود خونریزی فعال و پس از رد علل ترومبوتیک برای اولین بار جهت کنترل روند فعال خونریزی تا زمان شروع اثر داروهای ایمونوساپرسیو از داروی ترانکسامیک اسید (R) ساخت

## بحث

می تواند نرمال باشد. اما گاهی اوقات کراکل‌های دمی و یا سوفل سیستولیک ناشی از تنگی میترال شنیده می‌شود. رادیوگرافی قفسه‌سینه معمولاً در DAH غیرطبیعی ولی غیراختصاصی است. ارتشاشات آلوئولی به صورت تپیک دوطرفه و منتشر می‌باشند ولی می‌توانند موضعی و غیرقیرینه باشند. یافته‌های آزمایشگاهی در اغلب بیماران DAH شامل افت هموگلوبین و لکوسیتوز می‌باشد. گرانولوماتوز و گنر یک واسکولیت سیستمیک است که اغلب در افراد میانسال مشاهده می‌شود و مشخصه آن التهاب گرانولوماتوز نکروزان است. در فرم‌های محدود بیماری (Limited Wagener) فقط درگیری راه‌های هوایی فوقانی و تحتانی دیده می‌شود و در فرم‌های منتشر درگیری کلیه به صورت گلومرولونفریت اغلب فوکال، سگمنتال نکروزان به همراه درگیری راه‌های هوایی دیده می‌شود. درگیری چشم، پوست و ارگان‌های دیگر نیز در این بیماری دیده می‌شود. تشخیص گرانولوماتوز و گنر اغلب با مثبت شدن c-ANCA تایید می‌گردد.<sup>۷</sup> خونریزی منتشر آلوئولی یک تظاهر کاملاً شناخته شده گرانولوماتوز و گنر است.<sup>۸</sup> در صورتیکه DAH به علت و گنر باشد معمولاً سدیمان ادراری فعل نشان‌دهنده گلومرولونفریت همراه می‌باشد. آتنی‌بادی‌های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) و یا مارکرهای سرمی بیماری‌های کلازن واسکولر ممکن است در خون یافت شوند و معمولاً سرعت رسوب گلوبول‌های قرمز (ESR) افزایش می‌یابد. DAH می‌تواند در یک بیمار مبتلا به گرانولوماتوز و گنر شناخته شده، اتفاق بیفتد و یا می‌تواند به صورت اولین تظاهر به یاری خود را نشان دهد. همان‌طوری که در بیماری ما نیز چنین بود. ممکن است DAH در بیماری و گنر به صورت ساب کلینیکی و عودکننده دیده شود. این الگوی عودکننده در واسکولیتهای ANCA مثبت و یا بیماری کلازن واسکولر دیده می‌شود.<sup>۸</sup> از ظرفیت انتشاری مونواکسیدکربن در پیگیری DAH عودکننده می‌توان استفاده نمود.<sup>۹</sup> ترانکسامیک اسید یک داروی آتنی فیبرینولیتیک است که مکانیسم آن مهار چسبیدن پلاسمین و پلاسمینوژن به فیبرین بوده و در نتیجه این عمل، لخته خون که در اثر عمل هموستازی بدن ایجاد می‌شود، لیز نمی‌شود و تعادل ایجاد لخته و لیز را به سمت تولید لخته پیش می‌برد و در نتیجه از ادامه خونریزی جلوگیری می‌نماید. از ترانکسامیک اسید جهت کنترل موارد مختلف خونریزی استفاده شده است. به عنوان مثال در اعمال جراحی ارتودسی مثل تعویض مفصل زانو و یا هیپ.<sup>۱۰</sup> در مطالعه

خونریزی منتشر داخل آلوئولی یک وضعیت بالقوه مرگبار و کشنده است که به علت طیف وسیعی از بیماری‌ها ایجاد شده و می‌تواند باعث نارساپی حاد تنفسی شود لذا نیاز به تشخیص سریع و درمان فوری دارد. شاید علت اصلی فوت در این بیماران به علت هیپوکسی می‌باشد. خونریزی حاد آلوئول (و کمتر پروسه فعل التهابی) باشد. بنابراین ضمن درمان اساسی پروسه التهابی، کنترل موثر خونریزی حاد (درمان ابتکاری ما) می‌تواند قویاً بر پروگنوز بیماری تاثیر مثبت داشته باشد. خونریزی منتشر آلوئول اشاره به شکل منحصر به فردی از خونریزی ریوی دارد که از میکروسیرکولاسیون ریوی (شامل مویرگها، شریانچه‌ها و وریدچه‌های آلوئولی) منشاء می‌گیرد، اگر چه خونریزی آلوئولی به صورت کانونی است ولی به علت متعدد بودن مناطق گرفتار از لغت خونریزی منتشر آلوئولی استفاده می‌شود. علل DAH را می‌توان در دو گروه بررسی کرد، ۱- علل ریوی مثل آسیب منتشر آلوئولی و عفونت ۲- علل سیستمیک مثل واسکولیت‌ها. در DAH تجمع نوتروفیلها در دیواره آلوئولها و در اطراف مویرگ‌ها و وریدچه‌های آلوئولی مشاهده می‌شود.<sup>۵</sup> التهاب مویرگ (کاپیلریت) در نتیجه اختلالات با واسطه اینمی مثلاً واسکولیتهای سیستمیک و یا بیماری‌های کلازن واسکولر ایجاد می‌شود، هیچ مطالعه آینده‌نگری در مورد شیوع DAH در واسکولیتهای سیستمیک وجود ندارد، یک مطالعه گذشته‌نگر روی ۲۴ بیمار مبتلا به DAH نشان داد که گرانولوماتوز و گنر شایع‌ترین علت DAH است و علت یک سوم (۳۲٪) بیماران مبتلا به DAH محسوب می‌گردد.<sup>۵</sup> تظاهرات کلینیکی DAH، تظاهر معمول کلینیکی DAH شامل همپیزی، ارتشاشات آلوئولی در عکس رادیوگرافی ریه و آنمی می‌باشد. شایع‌ترین علائم بالینی بیمار شامل: همپیزی، تنگی نفس و سرفه است که عموماً به صورت حاد نمایان می‌شود. اما گاهی از اوقات می‌تواند به صورت تحت حاد و یا مزمن بروز نماید. بسته به علت زمینه‌ای DAH بیمار می‌تواند تب و یا علائم و نشانه‌هایی مربوط به واسکولیتهای سیستمیک و یا بیماری‌های کلازن واسکولر را داشته باشد. معاینه بالینی در DAH عموماً غیراختصاصی است. اگرچه علائم چشمی، نازوفارنکس و یا پوستی در واسکولیتها دیده می‌شود. معاینه قلبی، ریوی حتی در صورت پرشدگی آلوئولی واضح در عکس قفسه‌سینه

آن به اثبات بررسد موجب جایگزینی آن در برنامه درمانی این بیماران خواهد شد. بر این اساس از کلیه همکاران روماتولوژیست و پولمونولوژیست دعوت می‌کنیم تا در صورت داشتن بیمار مشابه پس از رد عمل ترموبوتیک در بیمار نتایج استفاده از ترانس آمین را به عنوان درمان کمکی در بیماران خود جهت نویسنده‌گان این مقاله ارسال دارند تام‌جموئه آنها بنام کلیه همکاران به صورت Case series به ثبت برسد.

دیگری در کنترل خونریزی در رزکسیون تومور کبدی بسیار موثر بوده است.<sup>۱۱</sup> همچنین در مطالعه‌ای دیگر در درمان کمکی آنوریسم آئورت شکمی موثر بوده است.<sup>۱۲</sup> آخرین مطالعات درمانی در DAH استفاده از فاکتور هفت انعقادی فعال شده می‌باشد که با نتایج خوبی همراه بوده است لیکن ارزانی و سهل‌الوصول بودن داروی مورد استفاده در این بیمار (ترانس آمین) در صورتیکه در مطالعات مشابه نیز اثرات مثبت

## References

1. Cordier JF, Valeyre D, Guillevin L, Loire R, Brechot JM. Pulmonary Wagener's granulomatosis. A clinical and imaging study of 77 cases. *Chest* 1990; 97: 906.
2. Travis WD, Hoffman GS, Leavitt RY, Pass HI, Fauci AS. Surgical pathology of the lung in Wagener's granulomatosis. Review of 87 open lung biopsies from 67 patients. *Am J Surg Pathol* 1991; 15: 315-33.
3. Travis WD, Carpenter HA, Lie JT. Diffuse pulmonary hemorrhage. An uncommon manifestation of Wagener's granulomatosis. *Am J Surg Pathol* 1987; 11: 702-8.
4. Jayne D, Rasmussen N, Andrassy K, Bacon P, Tervaert JW, Dadoniene J, et al. A randomized trial of maintenance therapy for vasculitis associated with antineutrophil cytoplasmic autoantibodies. *N Engl J Med* 2003; 349: 36-44.
5. Travis WD, Colby TV, Lombard C, Carpenter HA. A clinicopathologic study of 34 cases of diffuse pulmonary hemorrhage with lung biopsy confirmation. *Am J Surg Pathol* 1990; 14: 1112-25.
6. Franks TJ, Koss MN. Pulmonary capillaritis. *Curr Opin Pulm Med* 2000; 6: 430-5.
7. Gross WL, Csernok E, Flesch BK. Classic anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies (CANCA), Wagener's auto - antigen and their immunopathogenic role in Wagener's granulomatosis. *J Autoimmun* 1993; 6: 171-84.
8. Schnabel A, Reuter M, Csernok E, Richter C, Gross WL. Subclinical alveolar bleeding in pulmonary vasculitides: correlation with indices of disease activity. *Eur Respir J* 1999; 14: 118-24.
9. Greening AP, Hughes JM. Serial estimations of carbon monoxide diffusing capacity in intrapulmonary haemorrhage. *Clin Sci* 1981; 60: 507-12.
10. Camarasa MA, Olle G, Serra-Prat M, Martin A, Sanchez M, Ricos P. Efficacy of aminocaproic, tranexamic acids in the control of bleeding during total knee replacement: a randomized clinical trial. *Br J Anaesth* 2006; 96: 576-82.
11. Wu CC, Ho WM, Cheng SB, Yeh DC, Wen MC, Liu TJ, Peng FK. Perioperative parenteral tranexamic acid in liver tumor resection: a prospective randomized trial toward a "blood transfusion"-free hepatectomy. *Ann Surg* 2006; 243: 173-80.
12. Ontachi Y, Asakura H, Arahata M, Kadohira Y, Maekawa M, Hayashi T, et al. Effect of combined therapy of danaparoid sodium and tranexamic acid on chronic disseminated intravascular coagulation associated with abdominal aortic aneurysm. *Circ J* 2005; 69: 1150-3.

## Tranexamic acid in diffuse alveolar hemorrhage (*case Report*)

Owlia MB<sup>1\*</sup>  
Bayatian A.<sup>1</sup>  
Halvani A.<sup>3</sup>

1- Department of Internal  
Medicine Rheumatology  
2- Assistant of Internal  
Medicine  
3- Department of internal  
Medicine Pulmonology

### Abstract

**Background:** Wagener's granulomatosis (WG) is a systemic necrotizing vasculitis characterized by upper and lower respiratory tract involvement and glomerulonephritis in most instances.

**Case Report:** We report a 36 years old man with DAH secondary to WG, as the presenting feature. He successfully treated with standard immune suppressive agents including pulse methylprednisolone and cyclophosphamide, along with tranexamic acid as adjunctive therapy for control of active bleeding. Laboratory results showed mild to moderate anemia, increased serum lactate dehydrogenase and very high c-ANCA titer. Chest radiograph showed bilateral alveolar infiltrates.

**Conclusion:** Diffuse Alveolar hemorrhage (DAH) is a dread complication of Wagener's granulomatosis. Control of acute phase of hemorrhage with tranexamic acid can improve outcome of patients.

**Keywords:** Diffuse alveolar hemorrhage (DAH), Tranexamic acid, Wagener's-granulomatosis.

\* Corresponding author  
Yazd, Safaiyeh, Shahid  
Sadooghi Hospital.  
Tel: +98-351-8224000-9  
Email: mbowlia2@yahoo.com