

مقایسه نتایج ترمیم جراحی سینوس پایلونیدال به روش "ترمیم اولیه" با "ترمیم ثانویه"

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۰۶/۱۳

چکیده

زمینه و هدف: اختلاف فاحش بین بازگشت به کار بیماران سینوس پایلونیدال عمل شده با دو روش ترمیم اولیه و ثانویه، انگیزه مطالعه بود. هدف این مطالعه بررسی نتایج جراحی سینوس پایلونیدال با دو روش «ترمیم اولیه» با «ترمیم ثانویه» می‌باشد. روش بررسی: مراجعین با سینوس پایلونیدال به بیمارستان شریعتی در سال ۱۳۸۶-۸۷ وارد مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، شدند. تخلیه بافت‌های ناسالم به علاوه ترمیم فوری زخم (ترمیم اولیه، $n=40$) یا برداشتن بافت‌ها بدون ترمیم (ترمیم ثانویه، $n=40$) صورت گرفت. بیماران با آبese از مطالعه خارج شدند. پیامدهای مهم، مدت بسترهای، مدت دوری از کار، درد پس از عمل، میزان رضایت بیماران و میزان عود بودند. **یافته‌ها:** اکثر ($50/87\%$) بیماران مذکور بودند و میانگین مدت دوری از کار در ترمیم اولیه $1/73\pm 0.85$ در برابر $11/53\pm 2.33$ روز، ($p=0.001$) و مدت بهبودی کامل 0.92 ± 0.43 در برابر 0.79 ± 0.53 روز، ($p=0.001$) به طور معنی‌داری کوتاه بودند اما اختلاف معنی‌داری در مدت بسترهای و ویزیت‌ها مشاهده نشد. در ترمیم اولیه، میانگین شدت درد در روزهای اول $0.5\pm 0.6/75$ در برابر $0.6\pm 0.5/40$ ، ($p=0.001$)، دوم $0.6\pm 0.6/66$ در برابر $0.5\pm 0.5/43$ ، ($p=0.001$)، سوم $0.5\pm 0.6/25$ در برابر $0.6\pm 0.6/27$ ، ($p=0.001$) و هفتم $0.5\pm 0.4/45$ در برابر $0.6\pm 0.6/85$ در برابر $0.5\pm 0.6/17$ ، ($p=0.001$) پس از عمل کمتر بود. فراوانی عوارض و نیاز به تکرار عمل در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشتند. میانگین میزان رضایت بیماران در گروه ترمیم اولیه 0.53 ± 0.15 در برابر $0.5\pm 0.3/3$ در برابر $0.5\pm 0.3/6$ ($p=0.001$) بیشتر بود. **نتیجه‌گیری:** تخلیه و ترمیم اولیه روش برتر است. مزایا شامل میانگین کوتاه‌تر مدت دوری از کار، بهبود سریع‌تر زخم، درد کمتر پس از عمل و رضایت بیشتر بیماران علی‌رغم عوارض و عود مساوی با روش ترمیم ثانویه.

کلمات کلیدی: سینوس پایلونیدال، ترمیم اولیه، ترمیم ثانویه.

بابک حاجی براتی*
علی غفوری

گروه جراحی عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه جلال آل احمد.
بیمارستان شریعتی، گروه جراحی
تلفن: ۰۲۱-۸۴۹۰۲۴۵۰.
email: babakhb@yahoo.com

مقدمه

کامل مسیر ایجاد شده به وسیله سینوس به پوست، بهبود کامل پوست پوشاننده و پیشگیری از عود است.^۱ زخم جراحی ممکن است باز گذاشته شود تا ترمیم صورت گیرد (Secondary intention). طرفداران این روش معتقدند که کاهش فشار بر زخم، موجب تسريع بهبود زخم بدون هیچ مشکل و جلوگیری از عود آن می‌شود.^۲ نظر دیگر آن است که زخم بسته شود تا بهبودی آن بهصورت بسته شدن اولیه صورت گیرد (Primary intention). در این روش‌ها تکنیک‌ها را می‌توان به‌مانع بستن در خط میانی و بستن زخم خارج از خط میانی طبقه‌بندی کرد. طرفداران بستن اولیه معتقدند که در آن ترمیم بافت سریع‌تر صورت می‌گیرد.^۱ بنابراین مشاهده می‌شود که هنوز در انتخاب روش درمانی ارجح جراحی در مورد درمان سینوس

سینوس پایلونیدال (Pilonidal sinus) بیماری است که اکثرآ در ناحیه دنبال‌چهای Sacrococcygeal ایجاد می‌شود. شیوع آن ۲۶ در ۱۰۰,۰۰۰ نفر است. سینوس پایلونیدال معمولاً خود را به‌شكل یک آبese یا یک مجرای تخلیه‌شونده (Sinus tract) دردناک که به‌طور مزمن ترشح دارد، نشان می‌دهد. صرف‌نظر از ظاهر، طبیعت دردناک این حالت سبب موربیدیتی چشمگیر می‌شود که اغلب با اختلال طولانی فعالیت‌های عادی همراه است. درمان ایدهآل درمانی است که به بیماران اجازه دهد سریعاً به فعالیت‌های عادی خود برگردند و با حداقل موربیدیتی و عوارض همراه باشد. درمان بیماری پایلونیدال مزمن، ضد و نقیض، متغیر و دشوار است. اصول درمان شامل رفع

نرم افزار SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL) ویراست ۱۷ استفاده شد. اطلاعات به صورت انحراف معيار \pm ميانگين يا (درصد) تعداد در هر گروه و بيان شدند. $p < 0.05$ معندي دار در نظر گرفته شد.

ما فتھا

هیچ بیماری از مطالعه خارج نشد و اطلاعات حاصل از ۸۰ بیمار تجزیه و تحلیل آماری شد. میانگین سن بیماران مورد بررسی ۲۵/۴۷±۷/۹۳ سال بود و ۸۷/۵٪ بیماران مذکور بودند. مقایسه میانگین متغیرهای دموگرافیک و بالینی پیش از عمل در بیماران عمل شده به دو روش ترمیم اولیه و ترمیم ثانویه در جدول ۱ آورده شده است. مطابق نتایج حاصل، بین هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک و بالینی، به غیر از سن در دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در جدول ۲، مقایسه میانگین متغیرهای نتایج عمل، فراوانی بروز عوارض و یا نیاز به عمل مجدد و میزان رضایت بیماران در دو گروه عمل شده به دو روش ترمیم اولیه و ثانویه آورده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در روش ترمیم اولیه طول مدت دوری از کار ۸/۶۵±۱/۷۳ در برابر ۱۱/۵۳±۲/۳۳ روز، ($p=0/001$) و طول مدت بهبودی کامل در ۳/۴۳±۰/۹۲ در برابر ۵/۳±۰/۷۹ روز، ($p=0/001$) بهمیزان معنی داری کوتاه‌تر بودند اما اختلاف معنی داری در طول مدت بستره و تعداد ویزیت‌ها مشاهده نشد. همچنین در گروه ترمیم به روش اولیه، میانگین شدت درد در روزهای اول $37/75\pm6/5$ در برابر $43/63\pm5/0$ در $43/63\pm5/0$ ، ($p=0/001$)، دوم $26/75\pm6/6$ در برابر $34/63\pm5/48$ ، ($p=0/001$).

جدول-1: مقایسه میانگین متغیرهای دموگرافیک و بالینی پیش از عمل در بیماران عمل شده به دو روش ترمیم اولیه و ترمیم ثانویه

متغیر	روش ترمیم اولیه (n=٤٠)	روش ترمیم ثانویه (n=٤٠)	p*
سن *	٢٧±٩/٩١	٢٣±٤٥/٤٧	٠/٢١
جنس (ذکر)	٥(٪١٢/٥)	٥(٪١٢/٥)	٠/٩٩
طول مدت بیماری	١/٨١±٠/٧٣	١/٦١±٠/٨٣	٠/٢٥٦
عفونت فعلی	٢(٪٥)	١(٪٢/٥٦)	٠/٥٧١
تعداد عفونت های قبلی	١/٨±٠/٩١	١/٧٤±٠/٨٥	٠/٧٧٧
آبیمه	١(٪٢/٥٦)	٢(٪٥)	٠/٥٥٦

* اختلاف معنی دار بر اساس آزمون آماری Independent samples t-test. مقادیر به صورت انچه اف معنای ± مانگانک: با (د، صد) تعداد سان شده اند. $p < 0.05$ معنی دار است.

پایلونیدال اتفاق نظر وجود ندارد.^۴ لذا بررسی یک روش سریع و ارزان که رضایت بیمار را جلب نماید، ارزشمند خواهد بود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه نتایج ترمیم جراحی سینوس پایلونیدال با دو روش «ترمیم اولیه» با «ترمیم ثانویه» می‌باشد.

روش بررسی

پس از تائید طرح توسط معاونت پژوهشی و کمیته اخلاق پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، در یک کارآزمایی بالینی تصادفی^{۸۰}
بیمار بالغ (بالای ۱۸ سال) که مبتلا به سینوس پاپیلونیدال بوده و به
درمانگاه جراحی بیمارستان دکتر شریعتی در سال ۱۳۸۶-۸۷، مراجعه
نموده‌اند، پس از توضیح کامل در مورد نحوه اجرای پژوهش و اخذ
رضایت‌نامه کتبی، به یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، وارد
شدند. بیماران با آبse پاپیلونیدال حاد به طور اورژانس عمل شده و به
مطالعه وارد نشدند. سایر بیماران به صورت تصادفی و به‌کمک
نرم‌افزار Randomization، به دو گروه ترمیم به‌روش اولیه ($n=40$) و
ثانویه ($n=40$) تقسیم شدند. در گروه ترمیم به‌روش اولیه، سینوس‌ها
و تراکت‌ها و کیست‌های موجود پس از شناسایی با بلودومتیلن، بر
اساس قضاوت جراح با حاشیه بافت سالم حدود دو تا سه ساعت متر
از هر طرف (با رعایت عدم آسیب به ناحیه آنورکتال) برداشته می‌شد
و نقص ایجاد شده به‌شکل اولیه بدون فلاپ با نخ نایلون در خط
وسط ترمیم می‌شد. ضمناً در فضای مذکور یک درن هموک تعییه
می‌شد که طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت خارج می‌گردید. در گروه ترمیم
ثانویه ($n=40$) برداشتن بافت‌ها بدون ترمیم صورت می‌گرفت و نقص
ایجاد شده با گاز آغشته به بتادین و پماد ترا سیکلین پر شده و در
روزهای آتی مکرراً شستشو شد. در هر دو گروه بیمار در روز بعد از
جراحی در صورت عدم وجود مشکل خاص مرخص می‌شد.
پیامدهای مهم شامل موارد زیر بودند: مدت بستره در بیمارستان،
مدت بهبودی کامل زخم، مدت دوری از کار، تعداد ویزیت‌ها، درد
پس از عمل در روزهای یک (حضوری)، دو و سه و هفت (تلفنی)،
میزان رضایت بیماران و عارضه و نیاز به تکرار عمل جراحی. رضایت
بیماران با مقیاس نسبی از پنج (بسیار راضی) تا یک (بسیار ناراضی)
بررسی شد. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون آماری Student's t-test
برای نمونه‌های غیر وابسته Independent samples t-test و برای
مقایسه داده‌های کمی از آزمون χ^2 یا Fisher's exact test متناسب با


بحث

نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که میانگین سن بیماران مورد بررسی $25/47 \pm 7/93$ سال بود و اکثر آنان افراد مذکور ($87/50$) بودند. در مطالعات قبلی نیز مردان دو برابر بیشتر از زنان مبتلا می شوند^۵ و بیشتر در جوانان سنین کار دیده می شود.^۱ در مطالعه Ommer میانگین سنی بیماران 32 ± 13 سال بود و عموماً مرد بودند.^۶ McCallum بیان کرد که میانه سن بیماران مبتلا به سینوس پیلونیدال در آفایان 21 سال و در خانمها 19 سال می باشد.^۴ بر اساس مطالعه حاضر، بین متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای بالینی مانند مدت بیماری، وجود عفونت فعلی و آبese، اختلاف معنی داری دیده نشد. همچنین مطابق نتایج به دست آمده از این مطالعه، اختلاف معنی داری در مدت بستری و تعداد ویزیت ها مشاهده نشد. این در حالی است که در اکثر مطالعات قبلی، مدت بستری در گروه بسته کوتاه تر است. به عنوان مثال Al-Salamah در یک مطالعه به منظور بررسی دو روش ترمیم بسته و باز اولیه نشان داد که طول مدت اقامت در بیمارستان در گروه اولیه به میزان معنی داری بیشتر است ($3/6 \pm 1/4$) روز در برابر $4 \pm 1/1$ روز.^۷ Ertan نیز به نتایج مشابهی دست یافت. اگرچه مطالعاتی، مغایر با نتایج بالا نیز موجود است که نشان می دهند طول مدت بستری در گروه بسته طولانی تر است. به عنوان مثال Fuzun نشان داد که در بیماران با Primary closure طول مدت بستری در بیمارستان به میزان معنی داری بالاتر است ولی سریع تر به کار برگشته اند.^۸ میزان عفونت و عود در دو گروه نیز اختلاف معنی داری نداشت. شاید یکی از دلایل آن استفاده از معیارهای متفاوتی برای ترتیخیص بیماران باشد. به همین دلیل مدت بستری در مطالعات مختلف، متفاوت گزارش شده است. با این وجود به نظر می رسد که مدت بستری در روش باز نسبت به روش بسته کوتاه تر باشد. اگرچه این اختلاف معنی دار نبوده است.^{۹-۱۱} در مطالعه حاضر نیز اگرچه طول مدت بستری در گروه اولیه کوتاه تر بود اما اختلاف، معنی دار نبود. در مورد دفعات ویزیت ها Perruchoud نشان داد که در گروه بستن اولیه دفعات مراجعه بعد از عمل به میزان معنی داری کمتر است (میانگین شش در برابر 40 بار).^{۱۰} یافته های این مطالعه می گوید که میانگین مدت دوری از کار و مدت بهبودی کامل زخم به میزان معنی داری در گروه ترمیم شده به روش اولیه از گروه ترمیم شده

جدول ۲: مقایسه میانگین متغیرهای نتایج عمل، فراوانی بروز عوارض و بی نیاز به عمل مجدد و میزان رضایت بیماران در دو روش ترمیم اولیه و ثانویه

متغیر	p*	روش ترمیم اولیه (n=۴۰)	روش ترمیم ثانویه (n=۴۰)	
طول مدت بستری	$0/245$	$1/23 \pm 0/42$	$1/13 \pm 0/33$	
طول مدت دوری	$0/001$	$11/53 \pm 2/33$	$8/65 \pm 1/73$	
از کار *				
تعداد ویزیت	$0/12$	$2/87 \pm 0/52$	$2/68 \pm 0/53$	
طول مدت بهبودی	$0/001$	$5/3 \pm 0/79$	$3/43 \pm 0/92$	
کامل زخم *				
عارضه	$0/396$	$2(0/5)$	$4(0/10)$	
نیاز به تکرار	$0/986$	$1(0/2/56)$	$1(0/2/5)$	
عمل جراحی				
میزان رضایت	$0/001$	$3/6 \pm 0/5$	$4/15 \pm 0/53$	
بیماران *				

* اختلاف معنی دار بر اساس آزمون آماری Independent samples t-test. مقدار به صورت انحراف معیار ± میانگین یا تعداد (درصد) بیان شده اند. $p < 0/05$ معنی دار است.



نمودار ۱: مقایسه میانگین شدت درد در روزهای اول، دوم، سوم و هفتم پس از عمل در بیماران عمل شده به دو روش ترمیم اولیه و ترمیم ثانویه * اختلاف معنی دار بر اساس آزمون آماری Independent samples t-test

سوم ($18/25 \pm 6/05$) در برابر $18/25 \pm 6/05$ در برابر $27/88 \pm 6/88$ (p= $0/001$) و هفتم ($8/45 \pm 3/85$) در برابر $17/88 \pm 6/19$ (p= $0/001$) پس از عمل به میزان معنی داری کمتر بود (نمودار ۱). فراوانی بروز عارضه و نیاز به تکرار عمل جراحی در دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند. رضایت بیماران در گروه ترمیم اولیه $4/15 \pm 0/53$ در برابر $3/6 \pm 0/5$ (p= $0/001$) بیشتر بود (جدول ۲).

درمان می‌شوند ۵۸٪ از بیماران گروه ترمیم ثانویه کمتر است. (خطر نسبی ۰/۴۲٪ با محدوده از ۰/۲۶٪ تا ۰/۶۶٪).^۱ در متانالیز مطالعاتی که صرفاً به بررسی ترمیم بهروش باز در مقایسه با روش بستن اولیه در خط وسط پرداخته‌اند نشان داده شده که میزان عود در روش باز بهمیزان معنی‌داری نسبت به گروه بسته کمتر است (۰/۳۹٪ با محدوده ۰/۲۳٪ تا ۰/۰۶٪).^۱ Ommer نشان داد که عود تنها در گروه بسته و بهمیزان ۱۸٪ بوده است و در گروه باز دیده نشد.^۲ عفونت موضع، بهعنوان یکی از عوارض پس از عمل، در گروه باز اندکی بیش از گروه بسته گزارش شده است اما این اختلاف، معنی‌دار نبوده است.^۳ Fuzun نشان داد که میزان عفونت و عود در بیماران با ترمیم بسته در مقایسه با ترمیم باز فاقد اختلاف معنی‌دار بوده است.^۴ در مطالعات دیگر نیز بر عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین دو گروه ترمیم باز و بسته صحنه گذاشته‌اند.^۵ این مورد در یک متانالیز نیز تایید شده است.^۶ میانگین میزان رضایت بیماران بهمیزان معنی‌داری در گروه ترمیم بهروش اولیه از گروه ترمیم ثانویه Ertan بیشتر است (۰/۵۳٪ در برابر ۰/۰۵٪ در برابر ۰/۰۱٪).^۷ این رضایت‌مندی را که شامل سطح سلامتی بالاتر و عملکرد اجتماعی مطلوب‌تر و درد کمتر بود را در گروه بسته گزارش کرد.^۸ McCallum با مطالعه مرور سیستماتیک نشان داد، میان میزان رضایت بیماران در دو گروه، اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.^۹ نهایتاً نتایج این مطالعه نشان داد، ترمیم اولیه با کاهش مدت دوری از کار، مدت بهبودی کامل زخم و میانگین شدت درد پس از عمل و افزایش میزان رضایت بیماران همراه است در حالی‌که فراوانی بروز عارضه و نیاز به تکرار عمل جراحی را افزایش نداده و طول مدت بستره را نیز بالا نمی‌برد. Toccaceli از ۲۰ سال تجربه ترمیم بسته، نشان داد که این روش از نظر میزان بهبودی، موربیدیتی، بازگشت سریع به کار و میزان عود و رضایت بیشتر بیماران با نتایج خوبی همراه است و می‌توان آن را به عنوان درمان انتخابی برای سینوس پیلوئیدال در نظر گرفت.^{۱۰} استفاده از این روش در صورتی که با برداشت وسیع بافت همراه نباشد، و بستن اولیه آن، از دوره نقاوت کاسته می‌شود.

در این بیماران روزهای غیبت از کار کاهش می‌یابد و بار اقتصادی ناشی از این غیبت‌ها نیز کم می‌شود. همچنین، هزینه اضافه به دلیل عود بیماری (بیش از آن‌که در کاهش دوره نقاوت از آن صرفه‌جویی می‌شود) بر بیمار تحمیل نمی‌شود.

بهروش ثانویه کوتاه‌تر است. نتایج سایر مطالعات به این نتایج نزدیک است. به عنوان مثال Ommer نشان داد که میانگین طول مدت بهبودی پس از عمل در گروه بسته ۱۵±۳ روز و در گروه باز ۶۶±۱۵ روز بود.^{۱۱} همچنین نشان داد که زمان دوری از کار، در گروه بسته ۱۹±۱۰ روز و در گروه باز ۵۲±۱۹ روز بود. همچنین Al-Salamah نشان داد که طول مدت بهبودی و مرخصی از کار نیز در گروه بسته کوتاه‌تر بود.^{۱۲} Fuzun نشان داد که در بیماران با بستن اولیه سریع‌تر به کار برگشتند.^{۱۳} همچنین مطالعات دیگر نشان می‌دهد زمان بازگشت به کار در گروه ترمیم بهروش باز بهمیزان معنی‌داری نسبت به آن‌ها که تحت روش بسته قرار گرفته‌اند طولانی‌تر است. میانگین این اختلاف حدوداً ۱۰/۴۸ روز است.^{۱۴} Fuzun نتایج مشابهی در سایر مطالعات مشاهده شده است.^{۱۵} اما در مورد بهبودی زخم، نتایج ضد و نقیضی وجود دارد. McCallum در یک مطالعه مرور سیستماتیک، نتایج فوق را تایید کرده است.^{۱۶} اما در مطالعه نیز نشان داده شده که بهبودی سریع‌تر در گروه ترمیم اولیه دیده شده اما از نظر آماری تست نشده است.^{۱۷} در برخی مطالعات نیز اختلاف معنی‌داری در بین میزان بهبود زخم در دو گروه باز و بسته گزارش نشده است.^{۱۸} بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، میانگین شدت درد در روزهای یک، دو و هفت پس از عمل بهمیزان معنی‌داری در گروه ترمیم اولیه از گروه ترمیم ثانویه کمتر است. Rao نشان داد که شدت درد پس از عمل در روز چهارم بهمیزان معنی‌داری در گروه باز نسبت به گروه بسته پایین‌تر است.^{۱۹} Ertan نیز میانگین شدت درد پس از عمل کمتری را در گروه بسته نشان داد (۶/۵±۱/۷٪ در برابر ۷/۴±۱/۴٪).^{۲۰} اما در یک مطالعه مروری توسط McCallum اختلاف معنی‌داری بین شدت درد دو گروه گزارش نشده است.^{۲۱} مطالعه حاضر همچنین نشان داد که بین فراوانی بروز عارضه و نیاز به تکرار عمل جراحی در دو گروه عمل شده به دو روش ترمیم اولیه و ثانویه اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. عود شایع‌ترین متغیری است که در مطالعاتی که به بررسی این دو روش می‌پردازند، گزارش شده است. اما به دلیل اختلاف زمان پی‌گیری بیماران در مطالعات مختلف، به صورت کمتر و بیشتر از یک سال طبقه‌بندی می‌شوند. عود بیماری نادر است و در حدود ۸٪ موارد دیده می‌شود.^{۲۲} در بسیاری از مطالعات حتی یک مورد، گزارش نشده است.^{۲۳} متانالیز مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، نشان داد که میزان عود در بیمارانی که بهروش ترمیم اولیه

References

- McCallum IJ, King PM, Bruce J. Healing by primary closure versus open healing after surgery for pilonidal sinus: systematic review and meta-analysis. *BMJ* 2008;336(7649):868-71.
- Testini M, Piccinni G, Minnello S, Di Venere B, Lissidini G, Nicolardi V, et al. Treatment of chronic pilonidal sinus with local anaesthesia: a randomized trial of closed compared with open technique. *Colorectal Dis* 2001;3(6):427-30.
- Ertan T, Koc M, Gocmen E, Aslar AK, Keskek M, Kilic M. Does technique alter quality of life after pilonidal sinus surgery? *Am J Surg* 2005;190(3):388-92.
- McCallum I, King PM, Bruce J. Healing by primary versus secondary intention after surgical treatment for pilonidal sinus. *Cochrane Database Syst Rev* 2007;(4):CD006213.
- Sondena K, Andersen E, Nesvik I, Soreide JA. Patient characteristics and symptoms in chronic pilonidal sinus disease. *Int J Colorectal Dis* 1995;10(1):39-42.
- Ommer A, Pitt C, Albrecht K, Marla B, Peitgen K, Walz MK. Pilonidal Sinus: Primary Closure also in Case of Abscess? *Zentralbl Chir* 2004;129(3):216-9.
- Al-Salamah SM, Hussain MI, Mirza SM. Excision with or without primary closure for pilonidal sinus disease. *J Pak Med Assoc* 2007;57(8):388-91.
- Fuzun M, Bakir H, Soylu M, Tansug T, Kaymak E, Harmancioglu O. Which technique for treatment of pilonidal sinus: open or closed? *Dis Colon Rectum* 1994;37(11):1148-50.
- al-Hassan HK, Francis IM, Neglen P. Primary closure or secondary granulation after excision of pilonidal sinus? *Acta Chir Scand* 1990;156(10):695-9.
- Mohamed HA, Kadry I, Adly S. Comparison between three therapeutic modalities for non-complicated pilonidal sinus disease. *Surgeon* 2005;3(2):73-7.
- Fazeli MS, Adel MG, Lebaschi AH. Comparison of outcomes in Z-plasty and delayed healing by secondary intention of the wound after excision of the sacral pilonidal sinus: results of a randomized, clinical trial. *Dis Colon Rectum* 2006;49(12):1831-6.
- Perruchoud C, Vuilleumier H, Givel JC. Pilonidal sinus: how to choose between excision and open granulation versus excision and primary closure? Study of a series of 141 patients operated on from 1991 to 1995. *Swiss Surg* 2002;8(6):255-8.
- Sondena K, Andersen E, Soreide JA. Morbidity and short term results in a randomised trial of open compared with closed treatment of chronic pilonidal sinus. *Eur J Surg* 1992;158(6-7):351-5.
- Gencosmanoglu R, Inceoglu R. Modified lay-open (incision, curettage, partial lateral wall excision and marsupialization) versus total excision with primary closure in the treatment of chronic sacrococcygeal pilonidal sinus: a prospective, randomized clinical trial with a complete two-year follow-up. *Int J Colorectal Dis* 2005;20(5):415-22.
- Hameed KK. Outcome of surgery for chronic natal cleft pilonidal sinus: A randomized trial of open compared with closed technique. *Medical Forum Monthly* 2001;12(5):20-23.
- Rao MM, Zawislak W, Kennedy R, Gilliland R. A prospective randomised study comparing two treatment modalities for chronic pilonidal sinus with a 5-year follow-up. *Int J Colorectal Dis* 2010;25(3):395-400.
- Khawaja HT, Bryan S, Weaver PC. Treatment of natal cleft sinus: a prospective clinical and economic evaluation. *BMJ* 1992;304(6837):1282-3.
- Kronborg O, Christensen K, Zimmermann-Nielsen C. Chronic pilonidal disease: a randomized trial with a complete 3-year follow-up. *Br J Surg* 1985;72(4):303-4.
- Toccaceli S, Persico Stella L, Diana M, Dandolo R, Negro P. Treatment of pilonidal sinus with primary closure. A twenty-year experience. *Chir Ital* 2008;60(3):433-8.

Surgical management of pilonidal sinus patients by primary and secondary repair methods: a comparative study

Babak Haji Barati MD.*
Ali Ghafuri MD.

Department of General Surgery
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract

Received: June 08, 2010 Accepted: September 04, 2010

Background: Gross difference in return to work exists in pilonidal sinus patients operated by primary and secondary repair. This survey was to evaluate the results of surgical management of pilonidal sinus with primary or secondary closure.

Methods: In a randomized clinical trial, patients with pilonidal sinus referring to the surgical clinic of Shariati Hospital in Tehran, Iran between March 2007 and March 2009 were underwent either excision with midline closure (primary, n=40), or excision without closure (secondary, n=40). The recorded outcomes were hospital stay, healing time, time off work, postoperative pain, patient's satisfaction and the recurrence rate.

Results: Majority of the patients were male (87.50%). There was no significant difference in the hospital stay. Time off work (8.65 ± 1.73 Vs. 11.53 ± 2.33 days, p=0.001) and healing time (3.43 ± 0.92 Vs. 5.3 ± 0.79 days, p=0.001) were shorter in primary group; but, there were no significant differences in hospital stay and number of visits. Intensity of postoperative pain in the 1st (37.75 ± 6.5 Vs. 43.63 ± 5.06 , p=0.001), 2nd (26.75 ± 6.66 Vs. 34.63 ± 5.48 , p=0.001), 3rd (18.25 ± 6.05 Vs. 27.88 ± 6.88 , p=0.001), and 7th (8.45 ± 3.85 Vs. 17.88 ± 6.19 , p=0.001) days were lower in primary closure group. There was not significant difference in complication rates in groups. Patients' satisfaction was higher in primary group (4.15 ± 0.53 Vs. 3.6 ± 0.5 , p=0.001).

Conclusion: According to this study excision and primary closure is the preferred procedure in patients with pilonidal sinus. It has the advantages of shorter time off work; earlier wound healing, lesser postoperative pain, higher patients satisfaction and comparable complication and recurrence rates with excision and open wound.

Keywords: Pilonidal sinus, primary closure, secondary closure, results, complications.

* Corresponding author: Dept. of General Surgery, Shariati Hospital, Jalal Al Ahmad Ave., Tehran, Iran.
Tel: +98-21-84902450
email: babakhb@yahoo.com