

بررسی فراوانی حضور پادتن ویروس هپاتیت نوع C در سرم اهداکنندگان خون شهرستان شهرکرد به روش ELISA

چکیده

زمینه و هدف: علی‌رغم امکان تزریق خون به عنوان تنها راه نجات برخی از بیماران، بیماری‌های متنقله از راه خون از جمله HCV یکی از معضلات انتقال خون می‌باشد که منجر به عوارض برای بیمار و صرف بودجه‌های سنگین می‌گردد. هپاتیت C یک معرض بهداشتی در دنیا بوده و در حال حاضر ۲۰۰ میلیون نفر به آن مبتلا می‌باشند. کشور ما از نظر شیوع هپاتیت C جزو مناطق با شیوع کم می‌باشد ولی میزان بروز موارد جدید این عفونت رو به افزایش است. تعداد زیادی از مبتلایان هپاتیت C دچار هپاتیت مزمن می‌شوند که به نظر می‌رسد بسیاری از این افراد در نهایت به سیروز و یا کارسیونوم هپاتوسلولار مبتلا می‌شوند. روش بررسی: با توجه به شیوع ۱-۲ درصدی عفونت هپاتیت C در اهداکنندگان خون در این تحقیق نیز به منظور تعیین میزان شیوع سرولوژیک Ab HCV در اهداکنندگان خون شهرستان شهرکرد و تعیین میزان نقش هر یک از فاکتورهای خطرساز نمونه‌های فوق با آزمایش ELISA مورد بررسی قرار گرفتند یافته‌ها: پس از انجام آزمون الیزا با استفاده از کیت Ab HCV بر روی ۱۱۴۷۲ نمونه سرم اهداکنندگان خون شهرستان شهرکرد در ۶۹ مورد (۰/۰۶٪) جواب مثبت گزارش شد. آلدگی به HCV در مردان و زنان و افراد متأهل، افراد مجرد، افرادی که سابقه خال‌کوبی، حجامت، تماس جنسی مشکوک و سابقه مسافرت به خارج از کشور داشتند به ترتیب: ۰/۰۶۱٪، ۰/۰۰۵٪، ۰/۰۴۱٪، ۰/۰۱۲۱٪، ۰/۰۱۵٪ و ۰/۰۸٪ برآورد گردید. نتیجه‌گیری: ارتباط آماری معنی‌دار بین آلدگی به HCV و وضعیت تأهل، سابقه خال‌کوبی و سابقه داشتن تماس جنسی مشکوک مشاهده گردید. همچنین بین آلدگی به HCV و جنسیت، سابقه داشتن حجامت، سابقه بیماری کبدی و سابقه داشتن مسافرت به خارج کشور مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی: هپاتیت C، الیزا، اهداکنندگان، شهرکرد

الله تاج بخش^۱

رامین یعقوبی^{۲*}

علیرضا واحدی^۳

۱- گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد

۲- مرکز تحقیقات پیوند اعضا، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیraz

۳- سازمان انتقال خون شهرستان شهرکرد

*نویسنده مسئول، نشانی: شیraz-بیمارستان نمازی-مرکز تحقیقات پیوند اعضا-دانشگاه علوم پزشکی شیraz

تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۷۶۲۱۱، فاکس: ۰۷۱۱-۶۲۷۶۲۱۱

email: rayaviro@yahoo.com

مقدمه

عفونت HCV دچار هپاتیت مزمن می‌شوند و به نظر می‌رسد که بسیاری از این افراد به سیروز نیز مبتلا شده و یا این که دچار کارسیونوم هپاتوسلولار می‌شوند.^۱ علت هپاتیت NABA بیش از یک ده ناشناخته بود تا این که در سال ۱۹۸۳ با استخراج کپی CDNA ژنوم ویروس موجود در پلاسمما شامپانزه آلدوه به ویروس هپاتیت نوع C شناخته شد. این ویروس علاوه بر تزریق خون می‌تواند از راههای دیگر نظیر داروهای وریدی توسط خود شخص انتقال یابد. مانند تماس شغلی با خون یا فرآورده‌های خونی یا دریافت فاکتورهای انعقادی و یا از طریق واحدهای همودیالیز تماس‌های غیرطبیعی مثل تماس جنسی، ارتباطات هموسکسوال و هتروسکسوال و انتقال از راه مادر به جنبین نیز می‌تواند منجر به انتقال ویروس شوند.^۲ با انجام آزمایشات اختصاصی غربالگری خون میزان ابتلا به HCV از طریق

مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک و نیز مطالعاتی که بر روی شامپانزه‌ها صورت گرفته حاکی از آن است که حداقل دو عامل برای وجود دارد که یکی از این عوامل Non A Non B Hepatitis (NANB) ویروس هپاتیت نوع C می‌باشد.^۳ حداقل ۵۰٪ بیمارانی که قبلاً به عنوان هپاتیت NANB به دنبال تزریق خون تشخیص داده شده بودند، دارای تست مثبت از لحاظ آنتی‌بادی ضد HCV بوده‌اند. با اضافه شدن آزمایش آنتی‌بادی ضد HCV برای بررسی و بیماری‌ابی افراد دهنده خون باید میزان خطر هپاتیت مربوط به تزریق خون به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. این آزمایش را می‌توان با روش‌های Radio Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) و Radio Immuno Assay (RIA) انجام داد.^۳ بیش از نیمی از بیماران مبتلا به

بود که حاوی اطلاعاتی در مورد سن، جنس، شغل، وضعیت تأهل، سابقه خال کویی، حجامت، تماس جنسی مشکوک، بیماری‌های کبدی، قلبی و عصبی، دریافت خون یا فاکتورهای خونی و سابقه اعتیاد تزریقی می‌باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم‌افزار آماری Instat و آزمون‌های χ^2 و آزمون فیشر صورت گرفت. از کیت الیزا تهیه شده توسط مؤسسه Biotech ایرلند (نسل سوم)، جهت تشخیص پادتن‌های ضد ویروس HCV در سرم اهداکنندگان خون استفاده گردید. کیت‌های نسل سوم الیزا پروتئین‌های ناحیه غیر قابل ترجمه Non Structural Sequence (NSS) را شناسایی می‌کنند که به جای پروتئین نوترکیب به کار رفته شده در نسل دوم، از پیتید صناعی استفاده می‌کنند که خیلی سریع تر Anti-HCV را شناسایی می‌کنند حساسیت و اختصاصی بودن کیت‌های الیزا نسل سوم نسبت به نسل اول و دوم بسیار بیشتر است و قادرند که Anti-HCV را خیلی زودتر تشخیص دهنند. گودهای میکروپلیت الیزا با پادگن HCV پوشانده شده‌اند. گوده A1 به عنوان بلانک، گوده B1 به عنوان کنترل مثبت و گوده C1 کنترل منفی در نظر گرفته می‌شوند. نمونه‌های سرم رقیق شده مورد آزمایش با پادگن موجود در همه گوده‌ها به استثنای C1، A1 مجاور می‌گردند که در صورت وجود پادتن‌های ضد HCV در نمونه‌های سرم این پادگن‌ها متصل شده و در اثر شستشو کنده نمی‌شوند. در مرحله بعد آنتی‌گلوبولین کونژوگه رقیق شده به همه گوده‌ها به استثنای A1 اضافه می‌گردد که در صورت وجود پادتن‌های ضد HCV در نمونه سرم به پادتن‌ها متصل شده و در اثر شستشوی مجدد کنده نمی‌شوند. در مرحله بعد کروموزن سوبسترا به همه گوده‌ها از جمله A1 اضافه می‌گردد. تغییر رنگ حاصله به علت تغییر تأثیر کونژوگه آنزیم برروی سوبسترا می‌باشد که پس از اضافه کردن اسید کلریدریک به عنوان ماده متوقف‌کننده واکنش رنگ‌های تولید شده با چشم یا قرائت کننده الیزا در طول موج 450 nm و 620 nm قابل قرائت می‌باشند. برای قرائت نتایج از دستگاه قرائت‌کننده الیزا مدل stat fax ۲۱۰۰ - ساخت امریکا استفاده گردید. این دستگاه پس از قرائت نمونه‌ها، نتایج را چاپ کرده و ارائه می‌دهد.

یافته‌ها

متعاقب انجام آزمون الیزا با استفاده از کیت تجاری HCV Ab بر روی ۱۱۴۷۲ نمونه سرم اخذ شده از اهداکنندگان خون شهرستان شهرکرد

ترانسفوزیون کاهش یافته در صورتی که انجام تست غیراختصاصی در دهنگان خون در گذشته باعث می‌گردید دهنگان خون از عوامل خطرساز ایجاد عفونت محسوب شوند. از سال ۱۹۹۱ تاکنون با انجام تست‌های اختصاصی در دهنگان خون خطر ابتلا به HCV به یک مورد در هر $10^3/1000$ تزریق رسیده است. بیشترین میزان ابتلا به HCV در معتادان تزریقی می‌باشد. در مطالعه انجام شده توسط CDC در فاصله زمانی ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ 59% افرادی که به HCV مبتلا شدند سابقه تزریق مواد مخدر تزریقی را داشته‌اند. به طور کلی هپاتیت C از حدود $1-2\%$ خون دهنگان جدا شده است. غربالگری خون‌ها برای هپاتیت C باعث کاهش انتقال این ویروس در اسپانیا از 9.6% به 1.9% شده است. در ژاپن و آمریکا نیز 73% کاهش انتقال مشاهده شده است. انتقال بیماری از راه سایر فرآورده‌های خونی $5-10\%$ می‌باشد. در افراد هموفیلی که حجم زیادی از فاکتورهای خونی و غیر استریل دریافت می‌کرند شیوع HCV تقریباً 100% بود. میزان انتقال HCV بعد از تماس با سوزن $3-10\%$ است.^۸ بررسی سطح آمینوترانسفرازهای سرمی به تشخیص بیماری تا حدودی کمک می‌کند. تست مهم دیگر جهت شناسایی HCV-RT-PCR HCV می‌باشد که حتی در مواردی که بیمار فاقد Anti-HCV می‌باشد به تشخیص بیماری کمک می‌کند. از آنجا که ویروس HCV قادر به رشد در کشت‌های سلولی نمی‌باشد با استفاده از تست‌های سرولوزی نظری ELISA می‌توان وجود آنتی‌بادی اختصاصی علیه ویروس را تشخیص داد. تا کنون سه نسل از این کیت‌ها طراحی شده که نسل سوم آن‌ها از حساسیت و اختصاصی بودن بالاتری برخوردار می‌باشد. البته در صورت مثبت بودن آنتی‌بادی ضد HCV باید با استفاده از تست‌های اختصاصی نظری Recombinant Immuno Blotting Assay (RIBA) یا PCR آن را تأیید و یا رد نمود. هدف از این تحقیق بررسی فراوانی حضور پادتن ویروس هپاتیت C در سرم اهداکنندگان خون و نیز عوامل مرتبط با بیماری می‌باشد.

روش بررسی

نمونه‌های این آزمون در فاصله زمانی تیرماه ۱۳۸۳ تا اسفندماه ۱۳۸۴ از کلیه داوطلبین اهدای خون شهرستان شهرکرد تهیه گردید. نمونه‌های اخذ شده ۱۱۴۷۲ نمونه بودند. داوطلبین بین ۱۷ تا ۶۰ سال سن داشتند. هنگام اهدای خون هر فرد موظف به تکمیل پرسشنامه‌ای

HCV در افرادی که سابقه بیماری کبدی داشتند 0.8% برآورد گردید که در تجزیه و تحلیل آماری با مریع کای با $\chi^2=1685$ درجه آزادی ۱، $P=0.0003$ odds ratio=۱/۳۴۳ و سطح اطمینان ۹۵٪ ارتباط آماری معنی داری بین میزان آلودگی و سابقه بیماری کبدی مشاهده نگردید. از تعداد ۱۱۴۷۲ نمونه مورد بررسی در ۴۰ مورد (۱۰٪) سابقه تماس جنسی مشکوک گزارش گردید که از نظر Ab HCV-Ab در آزمون الیزا دو مورد مثبت تشخیص داده شدند که آلودگی به HCV در افرادی که سابقه تماس جنسی مشکوک داشتند ۵٪ برآورد گردید که در تجزیه و تحلیل آماری با آزمون مریع کای با $\chi^2=656$ درجه آزادی ۱، $P=0.0009$ odds ratio=۸/۹۲۸ و سطح اطمینان ۹۵٪ رابطه آماری معنی دار بین میزان آلودگی و سابقه تماس جنسی مشکوک مشاهده گردید (جدول ۲). از تعداد ۱۱۴۷۲ اهدا کننده خون، ۷۰۰ نفر (۶٪) سابقه مسافرت به خارج از کشور را داشتند که در تست سرمی الیزا فقط یک مورد از آنها واکنش سرمی مثبت مشاهده شد و درصد آلودگی در افرادی که سابقه مسافرت به خارج از کشور را داشتند 0.14% درصد برآورد گردید. که در تجزیه و تحلیل ماری با آزمون χ^2 با $=1707$ درجه آزادی ۱، $P=0.1914$ و odds ratio=۰/۲۳۵۳ سطح اطمینان ۹۵٪ ارتباط معنی داری بین میزان آلودگی و سابقه مسافرت به خارج مشاهده نگردید.

بحث

علی‌رغم امکان تزریق خون به عنوان تنها راه نجات برخی از بیماران، بیماری‌های منتقله از راه خون از جمله HCV یکی از معضلات بهداشتی در علم انتقال خون می‌باشد که موجب عوارض و صرف بودجه‌های سنگین می‌گردد. هپاتیت C یک مفصل بهداشتی در جهان است و در حال حاضر ۲۰۰ میلیون نفر مبتلا به آن می‌باشد که شور ما از نظر شیوع هپاتیت C جزء مناطق با شیوع کم می‌باشد ولی میزان بروز موارد جدید در حال افزایش است.^۲ تحقیقات انجام شده در سایر کشورها شیوع بالای HCV را در اهداکنندگان خون نشان می‌دهد ولی خوشبختانه در کشور ما HCV در اهداکنندگان خون از شیوع خیلی بالایی برخوردار نمی‌باشد و این سلامت خون‌های اهدایی را نشان می‌دهد. در این مطالعه ضمن برآورد شیوع HCV در اهداکنندگان خون شهرستان شهرکرد، آنالیزهای آماری جهت یافتن ارتباط معنی دار بین فاکتورهایی نظیر سن، جنس، وضعیت تأهل،

تعداد ۶۹ نمونه در آزمون الیزا واکنش سرمی مثبت نشان دادند که میزان آلودگی 0.16% درصد برآورد گردید. از تعداد ۱۱۴۷۲ اهدا کننده خون 96.2% (۶۹/۸۳٪) نفر مرد و 18.7% (۱۸۷/۳۰٪) نفر زن بودند که ۱۰ نفر از زنان تست الیزا واکنش سرمی مثبت نشان دادند که درصد آلودگی 0.05% درصد برآورد گردید. در حالی که در ۵۹ نفر از مردان تست سرمی الیزا مثبت گردید که درصد آلودگی 0.61% درصد برآورد گردید که در تجزیه و تحلیل آماری با آزمون χ^2 درجه آزادی ۱، $P=0.0415$ odds ratio=۰/۷۶۴۶ و سطح اطمینان ۹۵٪ ارتباط معنی داری بین میزان آلودگی به HCV و جنسیت مشاهده نگردید. از ۱۱۴۷۲ نمونه مورد بررسی 88.49% مورد (۷۷/۱۳٪) متاهل و 26.23% مورد (۲۲/۸۶٪) مجرد بودند که ۳۲ نفر از افراد مجرد و ۳۷ نفر متأهل در آزمون الیزا واکنش سرمی مثبت داشتند که در تجزیه و تحلیل آماری با آزمون χ^2 با $=20.439$ درجه آزادی ۱، $P=0.0001$ odds ratio=۰/۳۴۰۰ و سطح اطمینان ۹۵ درصد ارتباط آماری معنی دار بین میزان آلودگی و وضعیت تأهل مشاهده گردید. از فاکتورهای خطر ساز مورد بررسی در این تحقیق سابقه خالکوبی بود که از تعداد ۱۱۴۷۲ نمونه مورد بررسی 40.0% نمونه دارای سابقه خالکوبی بودند (۳/۸۴٪) که از این تعداد شش نمونه در تست الیزا واکنش سرمی مثبت نشان دادند. درصد آلودگی به HCV در افرادی که سابقه خالکوبی داشتند $1/5$ درصد برآورد گردید. همچنین از ۱۱۰۷۲ نفری که سابقه خالکوبی نداشتند نیز در 63% نفر نتیجه آزمایش الیزا مثبت گردید. که در تجزیه و تحلیل آماری با آزمون χ^2 با $=4148$ درجه آزادی ۱، $P=0.0417$ odds ratio=۲/۶۶۱ و سطح اطمینان ۹۵٪ ارتباط معنی دار بین میزان آلودگی و سابقه خالکوبی مشاهده گردید. از ۱۱۴۷۲ نمونه مورد بررسی 200 مورد دارای سابقه حجامت بودند که تنها در دو مورد از آنها آلودگی به HCV گزارش گردید که درصد آلودگی در افرادی که سابقه حجامت نداشتند 1% برآورد گردید. در افرادی که سابقه حجامت نداشتند (۱۱۲۷۲ نفر) در 67 نفر از آنها آزمایش الیزا مثبت گزارش گردید که در تجزیه و تحلیل آماری با آزمون χ^2 با $=7512$ درجه آزادی 0.17840 odds ratio=۱/۶۸۹ و سطح اطمینان ۹۵٪ ارتباط آماری معنی دار بین میزان آلودگی و سابقه حجامت مشاهده نگردید. از ۱۱۴۷۲ نمونه مورد بررسی تعداد 250 مورد سابقه بیماری کبدی داشتند (۰.۲/۱۷٪) که تنها دو مورد در آزمون الیزا واکنش سرمی مثبت نشان دادند. که درصد آلودگی به

مشخص کرد که شیوع HCV ۳/۹٪ می‌باشد.^{۱۳} میزان و شیوع ویروس‌های منتقله از راه خون در بانک خون ملی کلیمیا در سال ۱۹۹۵ مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ۳۷۰۸۱۵ واحد خون از ۱۹۹۵ مورد بررسی قرار گرفت که شیوع HCV، ۱٪ گزارش شد.^{۱۴} در آمریکای مرکزی و جنوبی در سال ۱۹۹۳ همه اهداکنندگان خون از نظر HIV، HBV، HCV، تریپانوژم کروزی و سفلیس کنترل شدند.^{۱۵} در بولیویا از هر ۱۰۰۰ مورد ۲۳۳ مورد HCV مثبت تشخیص داده شدند (۲۳/۳٪)، در هاندورا از هر ۱۰۰۰ مورد ۹ مورد HCV مثبت گزارش شد (۰/۹٪ درصد)، در اکوآدور از هر ۱۰۰۰ مورد، ۱۶ مورد HCV مثبت گزارش شد (۱/۶٪) و در پاراگوئه از هر ۱۰۰۰ اهداکننده ۱۹ مورد HCV مثبت تشخیص داده شد.^{۱۶} در این تحقیق باتوجه به پایین بودن سن افراد و هم چنین پایین بودن سن آلوودگی با انجام اقدامات کنترلی مناسب می‌توان از پیشرفت آلوودگی جلوگیری به عمل آورد.

References

- Alter MJ, Hadler SC. Risk factors for acute nonA, nonB hepatitis: frequency and epidemiology in an urban United States population. *J Infect Dis* 1982; 145: 886-93.
- He LF, Alling D, Popkin T, Shapiro M, Alter HJ, Purcell RH. Determining the size of non-A, non-B hepatitis virus by filtration. *J Infect Dis* 1987; 156: 636-40.
- مالک نژاد پروین. میکروبیولوژی جاوتز. چاپ اول. تهران: انتشارات ارجمند. ۱۳۸۱.
- Ishida C, Matsumoto K, Fukada K, Matsushita K, Shiraki H, Maeda Y. Detection of antibodies to hepatitis C virus (HCV) structural proteins in anti-HCV-positive sera by an enzyme-linked immunosorbent assay using synthetic peptides as antigens. *J Clin Microbiol* 1993; 31: 936-40.
- Löve A, Sigurdsson JR, Stanzeit B, Briem H, Rikardsdottir H, Widell A. Characteristics of hepatitis C virus among intravenous drug users in Iceland. *Am J Epidemiol* 1996; 143: 631-6.
- Hollinger FB, Purcell RH, Gerin JL. Viral Hepatitis. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins: 2002.
- Garflein RS, Vlahov D, Galai N, Doherty MC, Nelson KE. Viral infections in short-term injection drug users: the prevalence of the hepatitis C, hepatitis B, human immunodeficiency, and human T-lymphotropic viruses. *Am J Public Health* 1996; 86: 655-61.
- Sherlock S, Dooley J. Disease of the Liver and Biliary System. 10th ed. Oxford: Blackwell Science: 1997.
- امام سید جلال، عصاره زادگان محمد علی. بررسی شیوع هپاتیت C، B در داوطلبان اهدای خون شهرستان اهواز. دومن کنگره ویروس شناسی ایران. ۱۳۸۲.
- شریفی شهین، خانلری زهراء، علیان سید مولید. بررسی میزان شیوع هپاتیت C در اهدا کنندگان شهر تهران. دومن کنگره ویروس شناسی ایران. ۱۳۸۲.
- کشوری مریم، حجاری زاده بهزاد، علیان سید مولید. بررسی میزان شیوع هپاتیت C و B عوامل خطر ساز ابتلا در بیماران HIV مثبت همراه کننده به مرکز مشاوره هپاتیت و ایدز سازمان انتقال خون پایگاه تهران. دومن کنگره ویروس شناسی ایران. ۱۳۸۲.
- Related Articles, LinksGangaidzo IT, Moyo VM, Khumalo H, Saungweme T, Gomo Z, Rouault T, et al. Hepatitis C virus in Zimbabwe. *Cent Afr J Med* 1997; 43: 122-5.
- Akbar N, Basuki B, Mulyantoro, Garabrant DH, Sulaiman A, Noer HM. Ethnicity, socioeconomic status, transfusions and risk of hepatitis B and hepatitis C infection. *J Gastroenterol Hepatol* 1997; 12: 752-7.
- Beltron M, Red J. Screening for infections disease in blood banks in Colombia. *Biomedica* 1997; 17: 137-42.
- Halim AB, Garry RF, Dash S, Gerber MA. Effect of schistosomiasis and hepatitis on liver disease. *Am J Trop Med Hyg* 1999; 60: 915-20.
- López-Vélez R, Turrientes C, Gutierrez C, Mateos M. Prevalence of hepatitis B, C, and D markers in sub-Saharan African immigrants. *J Clin Gastroenterol* 1997; 25: 650-2.

سابقه خالکوبی، حجامت، بیماری‌های کبدی، مسافرت به خارج، اعتیاد تزریقی و دریافت خون و فاکتورهای خونی مورد بررسی قرار گرفتند. در مطالعه انجام شده بر روی ۴۵۰۰ اهداکننده خون شهرستان اهواز که با روش الیزا صورت گرفت شیوع HCV ۰/۷٪ گزارش گردید.^۹ در تحقیق دیگر انجام شده بر روی ۲۱۷۲۶۸ نفر اهدا کننده خون شهر تهران، شیوع HCV با استفاده از آزمون الیزا ۱/۳٪ گزارش شد.^{۱۰} در مطالعه دیگر انجام شده در ۴۹ فرد HIV مثبت مراجعه کننده به پایگاه خون تهران ۴۰ نفر (۸۲/۷٪) از نظر HCV مثبت تشخیص داده شدند.^{۱۱} در تحقیقات انجام شده در زیباده مشخص گردید که شیوع HCV در داوطلبین اهدای خون ۷/۷٪ می‌باشد.^{۱۲} در مطالعه دیگر انجام شده بر روی ۲۹۹ نفر از افراد بدون علامت در آفریقا مشخص گردید که شیوع HCV در افراد بدون علامت ۰/۸٪ می‌باشد. مطالعات انجام شده بر روی ۹۸۵ نمونه سرمی در جمعیت جاکارتا

A serological survey on hepatitis C virus Antibody in blood donors with an ELISA method

Tajbakhsh E¹
Yaghobi R^{2*}
Vahedi AR.³

1-Department of microbiology-
Azad Islamic University -
Sharekord-Iran
2- Shiraz Transplant Research
Center-Shiraz University of
Medical Sciences-Shiraz- Iran.
3- Blood Transfusion
Organization-Shahrekord-Iran.

Abstract

Background: Hepatitis type C virus (HCV) is one of the important threatened infectious blood born viruses in different populations. More than 300 million people were suffered from different HCV clinical complications all around the world. It is estimated that only 20% of HCV infected individuals will recover from this viral infection, while the rest become chronically infected. The majority of chronically infected individuals never exhibit symptoms, but approximately 10- 30% of these patients will eventually develop severe liver complications. In this research the prevalence of HCV Ab and the role of some demographic data in HCV incidence and clinical outcomes were determined.

Methods: In this retrospective study 11472 blood samples from, Iranian blood donors, Shahrekord city were collected for one year. The frequency of HCV Ab was analyzed with a third generation EIA method. The statistical relationships of different possible risk factors of HCV infection were analyzed by Instat software.

Results: The HCV Ab was diagnosed in 69 of 11472 (0.6%) serum samples. Significant correlations were detected between the history of HCV infection with marriage, tattooing, and doubtful sexual contact. Significant relationships were not defined between HCV infection with age, history of liver disease, and record of travel to abroad.

Conclusions: Significant relationships were find between HCV infection with marital status, history of tattooing and sexual contact, but significant correlations were not find between HCV infections with sex, history of liver disease and traveling to other countries.

Keywords: HCV infection, HCV Ab, demographic data, and EIA.

Corresponding author: Shiraz
Transplant Research Center -
Namazee Hospital, Shiraz
University of Medical Sciences,
Shiraz.
Tel: +98 -711-6276211
Fax: +98-711-6276211
email: rayaviro@yahoo.com